

Dist.: Côte d'Ivoire (I. Bolívar, 1893c) - Gambie (I. Bolívar, 1893c • Burr, 1902 • Karny, 1907) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953) - AO (Fishpool & Popov, 1984 • Palisot de Beauvois, 1805)

ACRIDARACHNEA I. Bolívar, 1908

Acridinae

Acridarachnea I. Bolívar, 1908b, p. 418-419

Espèce-type : *Acridarachnea ophthalmica* I. Bolívar, 1908b, p. 419-420

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Acridarachnea ophthalmica*** I. Bolívar, 1908

Acridarachnea ophthalmica I. Bolívar, 1908b, p. 419-420

Holotype mâle, Sénégal, Dakar, dépositaire ? (MNCN Madrid ?)

Cit. : *Acridarachnea ophthalmica*

I. Bolívar, 1908b, p. 419 • Davey *et al.*, 1959b, p. 596 • Descamps, 1965b, p. 1293 ~ 1968, p. 575, 584 • Dirsh, 1951a, p. 145-149 ~ 1956c, p. 281, pl. 60 ~ 1965, p. 505-506 • Fishpool & Popov, 1984, p. 372 • Johnston, 1956, p. 742 ~ 1968, p. 362 • Kirby, 1910, p. 580 • Lecoq, 1980b, p. 578-579 • Medler, 1980, p. 37 (*A. ophthalmica* !) • Mestre, 1988, p. 246-247 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 246 • Popov, 1989, p. 146-147 • Roy, 1964c, p. 123



Dist.: "French Sudan" (Dirsh, 1965) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1951a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964c) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Dirsh, 1951a, 1965 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (I. Bolívar, 1908b • Dirsh, 1951a, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Tchad (Descamps, 1968 • Dirsh, 1951a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1980b • Popov, 1989)

Hormis les pays de notre zone d'étude, cette espèce, rarement citée, n'a été signalée que du Soudan.

ACRIDODERES I. Bolívar, 1889

Cyrtacanthacridinae

Acridoderes I. Bolívar, 1889b, p. 163

Espèce-type : *Acridoderes crassus* I. Bolívar, 1889b, p. 163

Syn.: *Phyxacra* Karny, 1907, p. 307-308 [Dirsh, 1966, p. 310, avec *Acridoderes*]

Anacridoderes Uvarov, 1923a, p. 139 [Dirsh, 1958c, p. 56, avec *Acridoderes*]

Genre afrotropical comprenant sept espèces dont deux signalées dans notre zone d'étude.

⊃ ***Acridoderes coeruleans*** (Karny, 1907) (? , présence à confirmer)

Phyxacra coeruleans Karny, 1907, p. 308

Holotype femelle, Soudan, Gondokoro, NM Vienne

Cit.: *Acridoderes coeruleans*


Davey *et al.*, 1959a, p. 93

Phyxacra coeruleans

Johnston, 1956, p. 348 • Kirby, 1910, p. 469 (par erreur *P. coeruleus*)

Dist.: Mali (Davey *et al.*, 1959a)

C'est la seule citation pour notre zone d'étude. Il pourrait s'agir en fait de spécimens d'*A. strenuus* avec une pigmentation particulière, cette espèce présentant une grande variabilité chromatique. L'espèce est citée par ailleurs uniquement du Soudan.



⊂ ***Acridoderes strenuus*** (Walker, 1870)

Caloptenus strenuus Walker, 1870b, p. 699-700
Holotype femelle, Gambie, NHM Londres

Syn.: *Acridium cribrifrons* Walker, 1871, p. 60-61. Holotype mâle, Gambie, perdu selon Uvarov (1924b)

[Uvarov, 1924b, p. 110, avec *Phyxacra strenua*]

Le type d'*Acridium cribrifrons* étant perdu, mais provenant du même matériel de Gambie (coll. Rendall) que *A. strenuus*, Uvarov a considéré qu'il s'agissait probablement d'un mâle de cette dernière espèce.

Coptacra variolosa Krauss, 1877, p. 73. Type femelle, Sénégal, NM Vienne

[Uvarov, 1923b, p. 474, avec *Phyxacra strenua*]

Cyrtacanthacris scrobiculatus Karsch, 1893, p. 89-90. Syntypes mâles, femelles, Togo, MNHU Berlin (DORSA : 2 syntypes, 1 mâle et 1 femelle)

[Uvarov, 1923b, p. 474, avec *Phyxacra strenua*]

Cyrtacanthacris validiceps Karsch, 1896, p. 296. Syntypes mâle(s), femelle(s), Zaïre ou Centrafrique ?, MNHU Berlin (DORSA : 2 syntypes, 1 mâle et 1 femelle)

[Dirsh, 1970, p. 342, avec *Acridoderes strenuus*]

Cit.: *Acridium cribrifrons*

Finot, 1907, p. 332 • Walker, 1871, p. 60-61

Acridoderes strenuus

Amatobi *et al.*, 1986, p. 101 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • COPR, 1982, p. 291-292 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclauss-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1968, p. 558-559 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 116 • Dirsh, 1966, p. 313-314 ~ 1970, p. 342-344 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 346 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 147-148 ~ 1974b, p. 485-486, 522-523 ~ 1983, p. 300 • Johnsen, 1981a, p. 89 • Kirby, 1910, p. 470 • Launois, 1978b, p. 160-161 • Launois-Luong, 1978a, p. 577, 582 ~ 1978b, p. 237-240 ~ 1980b, p. 781, 791, 805-809 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 55 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 614, 616-617, 666 ~ 1978b, p. 241-258 ~ 1980b, p. 559, 561-563 ~ 1984 ~ 1988, p. 88-89 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 160-161 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Phipps, 1970, p. 333 • Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 17, 36-37 ~ 1989, p. 74-75 • Roy, 1967, p. 1559 ~ 1969a, p. 212 ~ 2003, p. 349, 380, 387

Caloptenus strenuus

Walker, 1870b, p. 690, 699

Coptacra variolosa

Krauss, 1877, p. 141 ~ 1878, p. 33-34

Cyrtacanthacris scrobiculatus


Karsch, 1893, p. 88 (clé), 89-90 • Kirby, 1910, p. 453

Phyxacra strenua

Chapman, 1962, p. 29, 57 • Chopard, 1958a, p. 133 • Davey *et al.*, 1959a, p. 93-94 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 960-961 ~ 1965b, p. 1309 • Dirsh, 1963b, p. 215 ~ 1964, p. 65 ~ 1965, p. 376 • Gillon, 1974b, p. 521 • Golding, 1934a, p. 292 ~ 1948, p. 558-559, 578-584 • Jago, 1967b, p. 262 ~ 1968, p. 270-271 • Johnsen, 1970, p. 143 • Johnston, 1956, p. 349 ~ 1968, p. 270 • Oyidi, 1976, p. 87 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1971, p. 71-97 • Risbec, 1950a, p. 424 • Roy, 1962, p. 110, 113, 128 ~ 1965, p. 623 • Sjöstedt, 1931b, p. 4 • Uvarov, 1923a, p. 138-139 ~ 1923b, p. 473-474 ~ 1926a, p. 445

Phyxacra variolosa

Karny, 1907, p. 308 ~ 1915, p. 139



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "**French Sudan**" (Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948) - **Gambie** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Finot, 1907 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1924b • Walker, 1870b, 1871) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Chopard, 1958a • Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1923b) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Dirsh, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Launois-Luong, 1978a, 1978b, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Amatobi *et al.*, 1986 • Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Risbec, 1950a • Roy, 1962, 1965, 1967, 1969a • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970, 1971) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1970 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Popov, 1985c, 1988, 1989)

L'espèce est citée vers l'est du sud Soudan et, vers le sud, via le Zaïre, jusqu'au nord de l'Angola et de la Tanzanie.

ACROTYLUS Fieber, 1853

Oedipodinae

Acrotylus Fieber, 1853, p. 125

Espèce-type : *Gryllus insubricus* Scopoli, 1786, p. 64 [Kirby, 1910, p. 263, 264]

Genre comprenant plus d'une quarantaine d'espèces principalement afrotropicales mais aussi holarctiques, orientales et australiennes. Il est à ce jour dans un état certain de confusion et nécessite une révision. Si les cinq espèces présentes en Afrique de l'Ouest sont relativement simples à distinguer, le statut exact de certaines d'entre elles (*A. insubricus* et *A. patruelis*) est à préciser.

⊂ *Acrotylus blondeli* Saussure, 1884

Acrotylus blondeli Saussure, 1884, p. 191

Syntypes mâle(s) et femelle(s), Sénégal, MHN Genève. Lectotype mâle indiqué par Dirsh (1970, p. 515)

Syn.: *Acrotylus variegatus* Brancsik, 1893, p. 188. Type mâle, Mozambique, MTM Budapest ?

[Dirsh, 1970, p. 515, avec *Acrotylus blondeli*]

Acrotylus gilletteae Kirby, 1902b, p. 237. Holotype mâle Nyasaland (Uvarov, 1925d), NHM Londres

[Uvarov, 1925d, p. 280, avec *Acrotylus variegatus*]

Acrotylus coeruleans Karny, 1907, p. 356-357. Type femelle, Soudan, NM Vienne


[Uvarov, 1925d, p. 280, avec *Acrotylus variegatus*]

Acrotylus hyalinus I. Bolívar, 1908c, p. 104-105. Syntypes femelles, Zaïre et/ou Congo, ? MHN Genève

[Dirsh, 1970, p. 515, avec *Acrotylus blondeli*]

Acrotylus blondeli ab. *rosescens* Uvarov, 1926a, p. 439. Holotype femelle, Nigeria, NHM Londres

[Dirsh, 1970, p. 515, avec *Acrotylus blondeli*]



Cit.: *Acrotylus blondeli*

Amatobi *et al.*, 1986, p. 100-101 ~ 1987, p. 43 ~ 1988, p. 174 • Baccetti, 2004, p. 32 • I. Bolívar, 1893b, p.175 • Chapman, 1962, p. 14, 39, 61 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1991a, p. 2-3 ~ 1992, p. 331 • Chopard, 1941, p. 49 ~ 1950, p. 141 ~ 1952, p. 475 ~ 1963, p. 570 • Chopard & Villiers, 1950, p. 23 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • COPR, 1982, p. 501-503 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959b, p. 578-579 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 105, 206 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953,