

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948) - Gambie (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Finot, 1907 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1924b • Walker, 1870b, 1871) - Ghana (Chapman, 1962 • Chopard, 1958a • Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Liberia (COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1923b) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Dirsh, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Launois-Luong, 1978a, 1978b, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Amatobi *et al.*, 1986 • Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Risbec, 1950a • Roy, 1962, 1965, 1967, 1969a • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970, 1971) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1970 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Popov, 1985c, 1988, 1989)

L'espèce est citée vers l'est du sud Soudan et, vers le sud, via le Zaïre, jusqu'au nord de l'Angola et de la Tanzanie.

ACROTYLUS Fieber, 1853

Oedipodinae

Acrotylus Fieber, 1853, p. 125

Espèce-type : *Gryllus insubricus* Scopoli, 1786, p. 64 [Kirby, 1910, p. 263, 264]

Genre comprenant plus d'une quarantaine d'espèces principalement afrotropicales mais aussi holarctiques, orientales et australiennes. Il est à ce jour dans un état certain de confusion et nécessite une révision. Si les cinq espèces présentes en Afrique de l'Ouest sont relativement simples à distinguer, le statut exact de certaines d'entre elles (*A. insubricus* et *A. patruelis*) est à préciser.

⊃ *Acrotylus blondeli* Saussure, 1884

Acrotylus blondeli Saussure, 1884, p. 191

Syntypes mâle(s) et femelle(s), Sénégal, MHN Genève. Lectotype mâle indiqué par Dirsh (1970, p. 515)

Syn.: *Acrotylus variegatus* Brancsik, 1893, p. 188. Type mâle, Mozambique, MTM Budapest ?

[Dirsh, 1970, p. 515, avec *Acrotylus blondeli*]

Acrotylus gilletteae Kirby, 1902b, p. 237. Holotype mâle Nyasaland (Uvarov, 1925d), NHM Londres

[Uvarov, 1925d, p. 280, avec *Acrotylus variegatus*]

Acrotylus coeruleans Karny, 1907, p. 356-357. Type femelle, Soudan, NM Vienne


[Uvarov, 1925d, p. 280, avec *Acrotylus variegatus*]

Acrotylus hyalinus I. Bolívar, 1908c, p. 104-105. Syntypes femelles, Zaïre et/ou Congo, ? MHN Genève

[Dirsh, 1970, p. 515, avec *Acrotylus blondeli*]

Acrotylus blondeli ab. *rosescens* Uvarov, 1926a, p. 439. Holotype femelle, Nigeria, NHM Londres


[Dirsh, 1970, p. 515, avec *Acrotylus blondeli*]



Cit.: *Acrotylus blondeli*

Amatobi *et al.*, 1986, p. 100-101 ~ 1987, p. 43 ~ 1988, p. 174 • Baccetti, 2004, p. 32 • I. Bolívar, 1893b, p. 175 • Chapman, 1962, p. 14, 39, 61 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1991a, p. 2-3 ~ 1992, p. 331 • Chopard, 1941, p. 49 ~ 1950, p. 141 ~ 1952, p. 475 ~ 1963, p. 570 • Chopard & Villiers, 1950, p. 23 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • COPR, 1982, p. 501-503 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959b, p. 578-579 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 105, 206 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953,

- p. 604 ~ 1954, p. 178 ~ 1965b, p. 1260, 1276, 1309 ~ 1968, p. 561, 569-570 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 122 • Diop, 1987, p. 28, 68-69 • Dirsh, 1964, p. 75 ~ 1965, p. 493-495 ~ 1970, p. 515-516 • Duranton *et al.*, 1982, p. 344 • Fishpool & Popov, 1984, p. 369 • Golding, 1934a, p. 278-282, 287, 294 ~ 1946, p. 12, 34 ~ 1948, p. 546-547, 578-584 • Hergert, 1975, p. 91 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 254 ~ 1968, p. 296 • Johnsen, 1981a, p. 94-95 ~ 1981b, p. 156 • Johnston, 1956, p. 532 ~ 1968, p. 354 • Kirby, 1910, p. 267 • Launois, 1978b, p. 196-197 • Launois-Luong, 1978b, p. 237-240 ~ 1979, p. 209-226 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 79 • Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978b, p. 241-258 ~ 1980b, p. 571, 577-578 ~ 1988, p. 100-101 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 212-213 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 321 • Nzekwu, 1994, p. 148-149, 152 • Otte, 1995b, p. 316 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 84, 92 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 342-343 ~ 1971, p. 80 • Popov, 1989, p. 136-137 • Reynolds & Riley, 1988, p. 256 • Risbec, 1950a, p. 363 ~ 1950b, p. 424 • Roy, 1962, p. 111, 114, 130 ~ 1964b, p. 1180, 1193 ~ 1965, p. 624-625 ~ 1967, p. 1564 ~ 1969a, p. 219 ~ 1970, p. 702 ~ 1971, p. 407 • Saussure, 1884, p. 187, 191 • Sjöstedt, 1931b, p. 3 • Uvarov, 1926a, p. 439
- Acrotylus blondeli blondeli*
Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Duranton *et al.*, 1982, p. 1184 • Launois-Luong, 1978a, p. 578, 582, 584 ~ 1978b, p. 237-240 ~ 1979, p. 209-226 ~ 1980b, p. 774-814 • Lecoq, 1978a, p. 631-634, 667 ~ 1984
- Acrotylus blondeli ab. rosescens*
Davey *et al.*, 1959b, p. 579 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1276 ~ 1968, p. 561, 570 • Johnston, 1956, p. 532 ~ 1968, p. 354 • Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 68 ~ 1980b, p. 571, 577 • Uvarov, 1926a, p. 439
- Acrotylus coeruleans*
Karny, 1907, p. 356, 357, pl. 3 ~ 1915, p. 137
- Acrotylus variegatus*
Descamps, 1953, p. 604 • Johnston, 1956, p. 546 ~ 1968, p. 360



Dist.: Bénin (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Golding, 1948) - Gambie (I. Bolívar, 1893c • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1926a • *mat. exam.*) - Guinée (Karny, 1915) • Liberia (Johnsen, 1981a) • Mali (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Reynolds & Riley, 1988 • *mat. exam.*) - Mauritanie (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971 • *mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1991a, 1992 • Chopard, 1941, 1950, 1952 • Chopard & Villiers, 1950 • COPR, 1982 • Duranton *et al.*, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Launois-Luong, 1978a, 1978b, 1979, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Amatobi *et al.*, 1986, 1987, 1988 • COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1946, 1948 • Hergert, 1975 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Nzekwu, 1994 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953, 1954 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Sénégal (I. Bolívar, 1893b • Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950a • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1967, 1969a, 1970 • Saussure, 1884 • *mat. exam.*) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970, 1971) - "Soudan" (Chopard, 1952) - Tchad (Chopard, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Duranton *et al.*, 1982 • Jago, 1964a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1989 • Risbec, 1950b)

Cette espèce, très commune dans les zones sahélienne et nord-soudanienne, a la base des ailes postérieures légèrement bleutées. On peut trouver aussi, en très faible proportion, des individus à ailes rosées (*ab. rosescens*). Elle est répandue vers l'est jusqu'en Somalie et, via le Zaïre, s'étend vers le sud jusqu'au Mozambique et au Zimbabwe.

⊔ ***Acrotylus daveyi* Mason, 1959**

Acrotylus daveyi Mason, 1959, p. 77-78, fig. 1-4
Holotype mâle, Mali, Kodaga, NHM Londres

Syn.: *Acrotylus daveyi hyalinus* Descamps, 1965b, p. 1277. Holotype mâle, Niger, MNHN Paris
[Mestre, 2001, p. 492, avec *A. daveyi*]

Cit. : *Acrotylus daveyi*


Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1276, 1277 • Dirsh, 1965, p. 493-495 • Fishpool & Popov, 1984, p. 370 • Johnston, 1968, p. 355 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Mason, 1959, p. 77 • Mestre, 1988, p. 210 ~ 2001, p. 492-494 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 317 • Popov, 1989, p. 140-141 • Roy, 1964b, p. 1180, 1193

Acrotylus daveyi daveyi

Lecoq, 1980b, p. 571, 577 • Mestre *et al.*, 2001, p. 322

Acrotylus daveyi hyalinus

Descamps, 1965b, p. 1260, 1277 ~ 1968, p. 561, 570 • Johnsen, 1981a, p. 95 • Johnston, 1968, p. 355 • Lecoq, 1980b, p. 571, 577 • Mestre, 2001, p. 492 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 124 • Otte, 1995b, p. 317



Dist.: Bénin (Mestre, 1988, 2001 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1965) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Mason, 1959 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nord-Cameroun (Mestre, 2001 • *mat. exam.*) - Sénégal (Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964b • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊔ ***Acrotylus insubricus* (Scopoli, 1786)** (voir aussi *A. patruelis*)

Gryllus insubricus Scopoli, 1786, p. 64, pl. 24 : f. D

Type Italie du Nord, "Insubria" (= Lombardie, nord de l'Italie), perdu (DORSA : spécimen indiqué néotype mâle, France, présent au MNHU Berlin et désigné par Schmidt en 1980, publié ?)

A. insubricus et *A. patruelis*, espèces similaires ayant en commun des ailes postérieures rouges avec une fascie noire, ont été très souvent confondues et de nombreuses citations sont donc incertaines. S'il y a bien deux espèces distinctes en Afrique de l'Ouest (voir Chiffaud & Mestre, 1992), leur statut exact reste à préciser par rapport à celles identifiées sous les mêmes noms au Maghreb et en Europe de l'Ouest ; en l'attente, nous conservons ces noms classiques. Le statut des différentes espèces ou sous-espèces, notamment celui de *A. insubricus inficitus*, devra donc être soigneusement réexaminé et les synonymies confirmées.

Compte-tenu de la répartition géographique et de la fréquence relative de ces deux espèces, la plupart des citations font certainement référence à ce qui est appelé ici *A. patruelis*.

Syn.: *Acrydium maculatum* Olivier, 1791, p. 224. Type France méridionale, dépositaire ? (MNHN Paris ?), perdu selon La Greca (1993)

[Audinet-Serville, 1838, p. 731-732, avec *Oedipoda insubrica*]

Gryllus fasciatus Fabricius, 1793, p. 58. Type Gallia, dépositaire ?

[Rambur, 1838, p. 86, avec *Gryllus insubricus*]

Oedipoda maderae Audinet-Serville, 1838, p. 730. Syntypes mâle(s), femelle(s), Madère, dépositaire ? (MNHN Paris ?)

[Burr, 1912, p. 31, avec *Acrotylus insubricus*, "probably"]

Oedipoda inficita Walker, 1870b, p. 742. Lectotype femelle (Uvarov, 1925d), Égypte, NHM Londres

[Uvarov, 1925d, p. 279, avec *Acrotylus insubricus*]

[Uvarov, 1933a, p. 267, avec *Acrotylus insubricus inficitus*, sous-espèce conservée valide par divers auteurs récents]

Oedipoda variegata Walker, 1870c, p. 2301. Type Égypte, dépositaire ?

[Innes, 1929, p. 47, 49, avec *Acrotylus insubricus*]


Acrotylus versicolor Burr, 1898, p. 46, 50-51. Type femelle, Roumanie, UMNH Oxford

[Krauss, 1909, p. 106, avec *Acrotylus insubricus*]

De même que l'ont fait Johnsen (1991) et La Greca (1993), nous n'acceptons pas la mise en synonymie de *A. patruelis* faite avec cette espèce par Baccetti & Capra (1988)(voir aussi Chiffaud & Mestre, 1992).

Cit.: *Acrotylus insubricus*

- Baccetti, 2004, p. 32 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331-334 • Chopard, 1954, p. 6 • COPR, 1982, p. 503-504 • Descamps, 1968, p. 561, 570 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 122 • Dirsh, 1956c, p. 280 ~ 1965, p. 493-495 • Golding, 1948, p. 547 • Johnsen, 1970, p. 159 ~ 1981a, p. 95 • Johnston, 1956, p. 536-538 ~ 1968, p. 356 • Kirby, 1910, p. 264 • Lecoq, 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 68 ~ 1980b, p. 571, 577 • Mestre, 1988, p. 292 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124
Acrotylus insubricus inficitus (-a)
 Johnston, 1956, p. 539 • Lecoq, 1977, p. 7
Acrotylus insubricus insubricus
 Otte, 1995b, p. 318-319



- Dist.:** ? Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1978a, 1980a) - Cap-Vert (Chopard, 1954 • COPR, 1982 • Johnsen, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004) - ? Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (*mat. exam.*) - Mauritanie (*mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - ? Nigeria (Golding, 1948 • Mestre, 1988) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1965 • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

Nous n'avons cartographié que le matériel que nous avons examiné. A cette occasion, les identifications de Descamps pour le Sénégal et le Tchad (matériel au MNHN de Paris) ont été confirmées. Nous avons cartographié également (symbole ?) les signalisations de Johnsen (Gambie), de Lecoq (Burkina Faso) et de Golding (Nigeria) car ces auteurs listent aussi *A. patruelis* dans leurs inventaires, mais ces identifications d'*A. insubricus* sont à confirmer.

Cette espèce est moins fréquente que *A. patruelis* et limitée aux régions nord-soudanienne à prédésertique. Elle est présente vers l'est jusqu'en Somalie et, via l'Arabie, jusqu'en Inde, ainsi que dans tous les pays du pourtour méditerranéen.

⊍ ***Acrotylus longipes longipes*** (Charpentier, 1843)


Oedipoda longipes Charpentier, 1843, pl. 54

Types mâle et femelle, Sicile, Turcia, perdus. Néotypes mâle, femelle désignés par Harz (1975, p. 549), Grienchenland, Epidaurus, collection personnelle, invalides en regard du Code.

- Syn.:** *Acrotylus longipes* var. *rosea* I. Bolívar, 1908a, p. 325. Type Maroc, MNCN Madrid [Kirby, 1910, p. 582, avec *Acrotylus longipes*]
Oedipoda aurifera Walker, 1870a, p. 735. Holotype mâle, Îles du Cap-Vert, NHM Londres [Kirby, 1910, p. 267, avec *Acrotylus longipes*]
Epacromia collecta Walker, 1871, p. 85. Holotype mâle, Îles du Cap-Vert, NHM Londres [Kirby, 1910, p. 267, avec *Acrotylus longipes*]

Cit.: *Acrotylus longipes*

- Burr, 1927, p. 92 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331-332, 335 • Chopard, 1931, p. 628 ~ 1936c, p. 94 ~ 1941, p. 48 ~ 1943c, p. 301-302 ~ 1950, p. 140 ~ 1952, p. 474 ~ 1954, p. 6 ~ 1958c, p. 15 ~ 1963, p. 570 • Chopard & Villiers, 1950, p. 23 • COPR, 1982, p. 504-506 • Davey *et al.*, 1959b, p. 579 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 105, 144, 185, 202 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1277 ~ 1968, p. 561, 571 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 122-123 • Diop, 1987, p. 22, 28, 34, 41-42, 69, 71-72 • Dirsh, 1959a, p. 64 ~ 1965, p. 493-495 • Duranton *et al.*, 1982, p. 344 ~ 1983, p. 197-207, 217 ~ 1984, p. 40-41 ~ 1988, p. 179-188 • Fishpool & Popov, 1984, p. 370 • Harz, 1982, p. 154 • Jago, 1968, p. 297 ~ 1983a, p. 181, 189 • Johnsen, 1970, p. 159 • Johnston, 1956, p. 540-542 ~ 1968, p. 357-358 • Karsch, 1893, p. 80 • Kirby, 1910, p. 267 • Launois *et al.*, 1988, p. 158 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 80 • Lecoq, 1988, p. 106-107 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 212-213 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Morales Agacino, 1947, p. 265-266 ~ 1948, p. 288 • Popov, 1985c, p. 45, 57 ~ 1988, p. 36-37 ~ 1989, p. 138-139 • Reynolds & Riley, 1988, p. 253, 256-257 • Popov, 1985c, p. 45, 57 ~ 1989, p. 138-139 • Roy, 1971, p. 407 • Saussure, 1884, p. 187, 191 • Veiga, 1967, p. 492
Acrotylus longipes incarnatus (Err. dét., *A. incarnatus* est une espèce d'Afrique de l'Est)
 Launois, 1978b, p. 198-199
Acrotylus longipes longipes
 Otte, 1995b, p. 320-321
Oedipoda aurifera
 Butler, 1881, p. 85



Dist.: **Burkina Faso** (*mat. exam.*) - **Cap-Vert** (Burr, 1927 • Butler, 1881 • Chopard, 1936c, 1943c, 1952, 1954, 1958c • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1959a, 1965 • Duranton *et al.*, 1983, 1984, 1988 • Harz, 1982, p. 154 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Veiga, 1967 • *mat. exam.*) - **Mali** (Chopard, 1931, 1943c • COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968, 1983a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Reynolds & Riley, 1988 • *mat. exam.*) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1943c, 1950, 1952 • Chopard & Villiers, 1950 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Duranton *et al.*, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Medler, 1980) - "**Rio de Oro**" (Morales Agacino, 1947, 1948) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saussure, 1884 • *mat. exam.*) - "**Soudan**" (Chopard, 1952) - **Tchad** (Chopard, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - ? **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1985c, 1988, 1989)

Cette espèce xérophile est très commune dans les zones sableuses des régions sahélienne et prédésertique. Si la coloration alaire typique est jaunâtre à jaune, on peut observer certains individus (var. *rosea*), peu communs, à ailes rosées.

La signalisation du Togo (Karsch, 1893, repris par les autres auteurs), très méridionale, est exceptionnelle ou douteuse. D'autant plus que cet auteur ne cite aucune des autres espèces potentiellement présentes à savoir ni *A. patruelis*, ni, surtout, *A. blondeli*. *A. longipes* s'étend vers l'est jusqu'en Somalie, et, via le Proche-Orient et l'Arabie, jusqu'en Inde. Au nord, elle est présente dans tous les pays du pourtour méditerranéen. L'autre sous-espèce, *A. longipes subfasciatus*, a été décrite d'Iran.

u *Acrotylus patruelis* (Herrich-Schäffer, 1838) (voir aussi *A. insubricus*)

Gryllus patruelis Herrich-Schäffer, 1838, heft 157, pl. 18

Type, pas d'information, perdu, (? Dalmatie, en Croatie, selon Fischer, 1853). Harz (1975, p. 548) a désigné malencontreusement, et de manière invalide, un néotype d'Espagne.


Ainsi que l'indique le commentaire précédent pour *Acrotylus insubricus*, il y a eu confusion entre ces deux espèces et de nombreuses signalisations sont donc incertaines. Par ailleurs, leur statut exact doit être précisé par rapport aux autres espèces du genre du pourtour méditerranéen.

Cit. : *Acrotylus patruelis*

Chapman, 1961, p. 272, 277 ~ 1962, p. 14, 39-40, 61 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331-334 • Chopard, 1941, p. 48 ~ 1943c, p. 303 ~ 1950, p. 141 ~ 1952, p. 475 ~ 1954, p. 6 ~ 1958a, p. 143 ~ 1958c, p. 15 • COPR, 1982, p. 507-509 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959b, p. 579 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1954, p. 178 ~ 1965b, p. 1260, 1277, 1309 ~ 1968, p. 561, 571 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 123 • Diop, 1987, p. 22, 28, 34, 38, 42, 71-73 • Dirsh, 1964, p. 75 ~ 1965, p. 493-495 ~ 1966, p. 445-446 ~ 1970, p. 517-519 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Duranton *et al.*, 1982, p. 344 ~ 1983, p. 197-207, 217 ~ 1984, p. 40-41 ~ 1988, p. 179-188 • Fishpool & Popov, 1984, p. 371 • Gillon, 1974a, p. 160 ~ 1974b, p. 506-507, 529 • Golding, 1934a, p. 287, 294 ~ 1948, p. 546-547, 578-584 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 255 ~ 1968, p. 296-297 • Johnsen, 1970, p. 159 ~ 1981a, p. 95 ~ 1981b, p. 156 • Johnston, 1956, p. 537-538, 543-545 ~ 1968, p. 356, 358-359 • Karny, 1907, p. 358 • Kirby, 1910, p. 266 • Launois, 1978b, p. 200-201 • Launois *et al.*, 1988, p. 158 • Launois-Luong, 1978a, p. 574, 578, 582, 584 ~ 1979, p. 209-226 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 81 • Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 636-637, 667 ~ 1978b, p. 245, 247 ~ 1980b, p. 571, 577 ~ 1984 ~ 1988, p. 68-69 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 210-211 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 322 • Nzekwu, 1994, p. 148-149, 152 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 84 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1971 • Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 15, 36-37 ~ 1989, p. 142-143 • Popov *et al.*, 1990, p. 104-105 • Risbec, 1950a, p. 120 • Roy, 1962, p. 111, 130 ~ 1965, p. 625 ~ 1967, p. 1564 ~ 1969a, p. 219 ~ 1970, p. 702 ~ 1971, p. 408 ~ 2003, p. 369, 388 • Saraiva, 1961, p. 143 • Sjöstedt, 1931b, p. 3 • Uvarov, 1926a, p. 439 • Veiga, 1967

Acrotylus patruelis var. *inficita*

I. Bolívar, 1894, p. clxi • Saussure, 1888a, p. 68-69



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjøstedt, 1931b • *mat. exam.*) - Cap-Vert (Chopard, 1954, 1958c • COPR, 1982 • Duranton *et al.*, 1983, 1984 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saraiva, 1961 • Veiga, 1967 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Golding, 1948) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a, 1958c • COPR, 1982 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a • *mat. exam.*) - Mauritanie (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971 • *mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1950, 1952 • COPR, 1982 • Duranton *et al.* 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Launois-Luong, 1978a, 1979, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Nzekwu, 1994 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953, 1954 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Sénégal (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1965, 1967, 1969a, 1970 • Saussure, 1888a • *mat. exam.*) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "Soudan" (Chopard, 1952) - Tchad (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (I. Bolívar, 1894 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • *mat. exam.*) - AO (Chopard, 1943c • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1964a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Mestre *et al.*, 2001 • Popov, 1985c, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a)

L'essentiel des données cartographiées provient du matériel que nous avons examiné. Pour le Sénégal et le Tchad, l'examen du matériel au MNHN de Paris a confirmé les identifications de Descamps. Nous avons cependant ajouté les signalisations de Johnsen pour la Gambie et de Golding pour le Nigeria, ces auteurs ayant également listé *A. insubricus* dans leurs inventaires. C'est une espèce commune que l'on trouve depuis les savanes guinéennes jusqu'aux pseudo-steppes du domaine prédésertique. Elle a une répartition qui couvre toute l'Afrique et les îles proches, ainsi que les pays du pourtour méditerranéen.

ADELOTHERICLES Descamps, 1977

Afromastacinae

Adelothericles Descamps, 1977, p. 133-135

Espèce-type : *Adelothericles nigeriae* Descamps, 1977, p. 134 (fig. 36), 135-136

Genre afrotropical monospécifique.

U *Adelothericles nigeriae* Descamps, 1977

Adelothericles nigeriae Descamps, 1977, p. 134 (fig. 36), 135-136, fig. 402-407

Holotype mâle, Nord-Nigeria, 77,3 km de Gombe sur la piste de Gombe à Bajoga, NHM Londres

Cit.: *Adelothericles nigeriae*

Descamps, 1977, p. 135-136 • Otte, 1994a, p. 89

