

Apoboleus ludius

Chapman, 1962, p. 24 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1965, p. 330, 331 ~ 1970, p. 240-241 • Jago, 1962, p. 141-143 ~ 1967b, p. 246, 247 ~ 1968, p. 251-252 • Johnston, 1968, p. 233 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Otte, 1995a, p. 208 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 329 • Roy, 2003, p. 341, 380, 387

Ptemoblax ludius

Chopard, 1958a, p. 136 • Johnston, 1956, p. 284 • Karsch, 1896, p. 311 • Kirby, 1910, p. 474 • Ramme, 1929, p. 372, 484

Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1970 • Jago, 1962, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - Togo (Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Karsch, 1896 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Cette espèce forestière a été également signalée du Zaïre.

ATRACTOMORPHA Saussure, 1862

Pyrgomorphinae

Atractomorpha Saussure, 1862, p. 474

Espèce-type : *Truxalis crenulatus* Fabricius, 1793 [Kirby, 1910, p. 331]

Syn.: *Perena* Walker, 1870a, p. 506 [I. Bolívar, 1905, p. 197, avec *Atractomorpha*]

Ce genre comprend une quinzaine d'espèces des régions afrotropicale, orientale et australienne. L'année 1861 est généralement citée pour la description du genre, mais la parution de l'article serait en fait de 1862 (voir notamment Kevan & Chen, 1969) Quatre espèces seraient présentes dans notre zone selon Kevan (1977) mais une grande confusion a longtemps régné dans ce genre. En particulier, selon le travail de Kevan & Chen (1969), *A. occidentalis* et *A. rufopunctata* ont été longtemps confondues et mal déterminées comme des *A. aberrans*. De nombreuses signalisations de la Sierra Leone jusqu'à l'ouest du Ghana (zone de sympatrie) sont donc à préciser. De l'est du Ghana à l'ouest du Nigeria, seule *A. rufopunctata* serait présente, remplacée plus à l'est par le véritable *A. aberrans*, espèce d'Afrique centrale, signalée jusqu'ici pour notre zone d'étude uniquement de l'est du Nigeria. Les signalisations, sous le nom *A. aberrans*, où la distinction de ces trois espèces n'était pas faite sont regroupées ci-après sous *A. "aberrans"*.


⊔ ***Atractomorpha aberrans*** Karsch, 1888

Atractomorpha aberrans Karsch, 1888a, p. 333-334

Holotype femelle, Angola, St. Salvador, MNHU Berlin (DORSA : holotype)

Cit.: *Atractomorpha aberrans*

Kevan, 1977, p. 360-361 • Kevan & Chen, 1969, p. 166-170 • Kirby, 1910, p. 331 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994b, p. 31



Dist.: Nigeria (Kevan, 1977 • Kevan & Chen, 1969 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette espèce est signalée du Cameroun, Centrafrique, Gabon, Congo, Guinée équatoriale, Zaïre, Angola et Zambie.

⊔ ***Atractomorpha acutipennis gerstaeckeri*** I. Bolívar, 1884

Atractomorpha gerstaeckeri I. Bolívar, 1884a, p. 66

Syntypes mâle(s), femelle(s), Gabon, Fernando Poo (= Bioco), Zanzibar. Lectotype femelle, Gabon, Victoria, MNCN Madrid, désigné par Kevan (1963a, p. 87)

Banerjee & Kevan (1960, p. 182-184) ont reconnu quatre sous-espèces, la sous-espèce nominative étant présente uniquement à Madagascar, ainsi qu'aux Comores (Kevan, 1971a). Dirsh (1963c, p. 98-99 ~ 1966, 1970) ne reconnaît pas ces sous-espèces, et d'autres auteurs l'ont suivi. Kevan (1977), dans son *Catalogus* des Pyrgomorphidae, maintient ces sous-espèces et nous conservons ici cette opinion sous toutes réserves.

Syn.: *Atractomorpha aurivillii* I. Bolívar, 1884a, p. 64, 67. Lectotype femelle (Kevan, 1963a), Afrique du Sud, NR Stockholm [Banerjee & Kevan, 1960, p. 182, 183, avec *Atractomorpha acutipennis*]

Cit.: *Atractomorpha acutipennis*

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330, 336 • Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1968, p. 539, 542 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 109 • Dirsh, 1964, p. 51 ~ 1965, p. 150-152 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 328 • Gillon, 1974a, p. 133 ~ 1974b, p. 460, 520,

522 • Johnsen, 1981a, p. 83 • Johnston, 1968, p. 123-124 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p.11 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1984 ~ 1988, p. 48-49 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 46, 60 • Oyidi, 1975b, p. 97 ~ 1976, p. 83 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 322 ~ 1971 • Popov, 1989, p. 24-25 • Roy, 1964b, p. 1179, 1189 ~ 1965, p. 618 ~ 1969a, p. 196-207, 209, 221-232 ~ 1969b, p. 54 ~ 1970, p. 697

Atractomorpha acutipennis gerstaeckeri


COPR, 1982, p. 64-66 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1965a, p. 937-938 ~ 1965b, p. 1308 • Dirsh, 1963b, p. 208 • Jago, 1967b, p. 243 ~ 1968, p. 228-229 • Johnsen, 1970, p. 130 • Kevan, 1971a, p. 271, 274-283 ~ 1977, p. 365-368 • Kevan & Roy, 1971, p. 263 • Launois, 1978b, p. 60-61 • Lecoq, 1977, p. 4 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 51 ~ 1980b, p. 535, 537 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 50-51 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310 • Otte, 1994b, p. 365-368 • Roy, 1962, p. 112, 119 ~ 2003, p. 321-322, 379, 386

Atractomorpha aurivillii

Chopard, 1958a, p. 143 • Davey *et al.*, 1959a, p. 85 • Descamps, 1953, p. 605 • Golding, 1948, p. 553-554, 578-584 • Johnston, 1956, p. 195-196

Atractomorpha gerstaeckeri

Chapman, 1961, p. 265 ~ 1962, p. 11, 19, 60 ~ 1964, p. 110, 120 • Golding, 1940b, p. 130 ~ 1946, p. 21, 34 ~ 1948, p. 554, 578-584 • Johnston, 1956, p. 196-197 • Kary, 1907, p. 293 • Kirby, 1910, p. 332 • Phipps, 1962, p. 13-21 • Sjöstedt, 1931b, p. 3



Dist.: Bénin (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dahdoh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Kevan, 1971a • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Kevan, 1971a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b • *mat. exam.*) - Gambie (COPR, 1982 • Johnsen, 1981a • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1961, 1962, 1964 • Jago, 1967b, 1968 • Kary, 1907 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Johnsen, 1970 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Guinée-Bissau (COPR, 1982 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Liberia (COPR, 1982 • Johnsen, 1970 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1940b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Kevan, 1971a • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Jago, 1968 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1969a, 1970) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kary, 1907 • Kevan, 1971a • Kevan & Roy, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971) - Tchad (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Kevan, 1971a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1964, 1965 • Kevan, 1977 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Popov, 1989)

C'est la sous-espèce sub-saharienne, présente sur tout le sous-continent.

U *Atractomorpha occidentalis* Kevan & Chen, 1969


Atractomorpha occidentalis Kevan & Chen, 1969, p. 170, fig. 7, 8, 38, 42, pl. 1 : f. a-d
Holotype mâle, Liberia, Bomi Hills, LEM Québec

Cit.: *Atractomorpha occidentalis*

Johnsen, 1970, p. 130 • Kevan, 1977, p. 385 • Kevan & Chen, 1969, p. 148, 149, 154, 163, 165, 166, 170-175 • Kevan & Roy, 1971, p. 263 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 46-47, 60 • Mestre, 1988, p. 50-51 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Roy, 1969b, p. 54

Dist.: Côte d'Ivoire (Kevan & Chen, 1969 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b • *mat. exam.*) - Ghana (Kevan, 1977 • Kevan & Chen, 1969 • Roy, 1969b) - Guinée (Johnsen, 1970 • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Liberia (Johnsen, 1970 • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Kevan,

1977 • Kevan & Chen, 1969 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b) - **AO** (Kevan, 1977 • Mestre, 1988)



Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊂ ***Atractomorpha rufopunctata*** I. Bolívar, 1894

Atractomorpha rufopunctata I. Bolívar, 1894, p. clxi-clxii

Syntype(s) mâle(s), femelle(s), Togoland, sans localité, MNCN Madrid. Lectotype femelle, MNCN Madrid, désigné par Kevan & Chen (1969, p. 182)


Syn.: *Atractomorpha rufopunctata* var. *ashantica* I. Bolívar, 1905c, p. 197, 200. Lectotype mâle (Kevan & Chen, 1969), Ashanti, MNCN Madrid
[Kevan & Chen 1969, p. 181, avec *Atractomorpha rufopunctata*]

Cit.: *Atractomorpha rufopunctata*

I. Bolívar, 1894, p. clxi-clxii ~ 1909a, p. 40 • Chopard, 1958a, p. 142 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Fishpool & Popov, 1984, p. 387 • Johnsen, 1970, p. 130 ~ 1981b, p. 152 • Kirby, 1910, p. 331 • Kevan, 1977, p. 392-393 • Kevan & Chen, 1969, p. 154, 181-184 • Kevan & Roy, 1971, p. 263 • Kirby, 1910, p. 331 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 50-51 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310

Atractomorpha rufopunctata var. *ashantica*

I. Bolívar, 1905c, p. 197, 200



Dist.: Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (I. Bolívar, 1905c • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Johnsen, 1970, 1981b • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Liberia (Johnsen, 1970, 1981b • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Kevan & Chen, 1969 • Kevan, 1977 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Kevan, 1977 • Kevan & Chen, 1969 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (I. Bolívar, 1894, 1909a • Chopard, 1958a • Fishpool & Popov, 1984 • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001) - **AO** (Kevan, 1977 • Mestre, 1988)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊂ ***Atractomorpha "aberrans"*** (= *A. aberrans*, *occidentalis* ou *rufopunctata*)

Diverses signalisations sous le nom *A. aberrans* ont été faites pour l'Afrique de l'Ouest avant la mise en évidence par Kevan qu'elles se rapportaient essentiellement à *A. rufopunctata* et *A. occidentalis*. Pour l'est-Nigeria, il pourrait s'agir du véritable *A. aberrans*.

Cit.: *Atractomorpha aberrans*

Chapman, 1962, p. 11, 19 • Chopard, 1958a, p. 142 • Dirsh, 1963b, p. 208 ~ 1965, p. 150-152 • Gillon, 1974a, p. 133 ~ 1974b, p. 459-460, 522 • Jago, 1967b, p. 243 ~ 1968, p. 227-228 • Johnston, 1956, p. 195-197 ~ 1968, p. 123 • Karsch, 1891, p. 179 ~ 1893, p. 82 • Phipps, 1962, p. 14 ~ 1970, p. 322, 345

Dist.: Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a,b) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968) - Liberia (Jago, 1968) - Nigeria (Jago, 1968 • Karsch, 1891) - Sierra Leone (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Phipps, 1962, 1970) - Togo (Jago, 1968 • Karsch, 1893) - **AO** (Dirsh, 1965)

AULOCABOTHRUS I. Bolívar, 1902

Gomphocerinae

Aulacobothrus I. Bolívar, 1902b, p. 597

Espèce-type : *Aulacobothrus strictus* I. Bolívar, 1902b, p. 598 [Kirby, 1910, p. 189]

Syn.: *Phonerula* I. Bolívar, 1909b, p. 296 [Uvarov, 1926a, p. 430, avec *Aulacobothrus*]