

, 1977 • Kevan & Chen, 1969 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b) - AO (Kevan, 1977 • Mestre, 1988)



Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊔ *Atractomorpha rufopunctata* I. Bolívar, 1894

Atractomorpha rufopunctata I. Bolívar, 1894, p. clxi-clxii

Syntype(s) mâle(s), femelle(s), Togoland, sans localité, MNCN Madrid. Lectotype femelle, MNCN Madrid, désigné par Kevan & Chen (1969, p. 182)

Syn.: *Atractomorpha rufopunctata* var. *ashantica* I. Bolívar, 1905c, p. 197, 200. Lectotype mâle (Kevan & Chen, 1969), Ashanti, MNCN Madrid [Kevan & Chen 1969, p. 181, avec *Atractomorpha rufopunctata*]

Cit.: *Atractomorpha rufopunctata*

I. Bolívar, 1894, p. clxi-clxii ~ 1909a, p. 40 • Chopard, 1958a, p. 142 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Fishpool & Popov, 1984, p. 387 • Johnsen, 1970, p. 130 ~ 1981b, p. 152 • Kirby, 1910, p. 331 • Kevan, 1977, p. 392-393 • Kevan & Chen, 1969, p. 154, 181-184 • Kevan & Roy, 1971, p. 263 • Kirby, 1910, p. 331 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 50-51 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 310

Atractomorpha rufopunctata var. *ashantica*

I. Bolívar, 1905c, p. 197, 200



Dist.: Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (I. Bolívar, 1905c • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Johnsen, 1970, 1981b • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Liberia (Johnsen, 1970, 1981b • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Kevan & Chen, 1969 • Kevan, 1977 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Kevan, 1977 • Kevan & Chen, 1969 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (I. Bolívar, 1894, 1909a • Chopard, 1958a • Fishpool & Popov, 1984 • Kevan & Chen, 1969 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001) - AO (Kevan, 1977 • Mestre, 1988)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊔ *Atractomorpha "aberrans"* (= *A. aberrans*, *occidentalis* ou *rufopunctata*)

Diverses signalisations sous le nom *A. aberrans* ont été faites pour l'Afrique de l'Ouest avant la mise en évidence par Kevan qu'elles se rapportaient essentiellement à *A. rufopunctata* et *A. occidentalis*. Pour l'est-Nigeria, il pourrait s'agir du véritable *A. aberrans*.

Cit.: *Atractomorpha aberrans*

Chapman, 1962, p. 11, 19 • Chopard, 1958a, p. 142 • Dirsh, 1963b, p. 208 ~ 1965, p. 150-152 • Gillon, 1974a, p. 133 ~ 1974b, p. 459-460, 522 • Jago, 1967b, p. 243 ~ 1968, p. 227-228 • Johnston, 1956, p. 195-197 ~ 1968, p. 123 • Karsch, 1891, p. 179 ~ 1893, p. 82 • Phipps, 1962, p. 14 ~ 1970, p. 322, 345

Dist.: Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a,b) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968) - Liberia (Jago, 1968) - Nigeria (Jago, 1968 • Karsch, 1891) - Sierra Leone (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Phipps, 1962, 1970) - Togo (Jago, 1968 • Karsch, 1893) - AO (Dirsh, 1965)

AULOCABOTHRUS I. Bolívar, 1902

Gomphocerinae

Aulacobothrus I. Bolívar, 1902b, p. 597

Espèce-type : *Aulacobothrus strictus* I. Bolívar, 1902b, p. 598 [Kirby, 1910, p. 189]

Syn.: *Phonerula* I. Bolívar, 1909b, p. 296 [Uvarov, 1926a, p. 430, avec *Aulacobothrus*]

Les espèces d'Afrique appartenant à ce genre avaient été incluses par Hollis (1966) dans le genre *Dnopherula* qui considérait le genre *Aulacobothrus* comme non présent en Afrique. Jago (1996) a revu les espèces afrotropicales du genre *Dnopherula* et transféré un certain nombre d'entre elles dans d'autres genres comme ici *Aulacobothrus*.

Il s'agit d'un genre présent de l'Afrique sub-saharienne à l'Inde et l'Asie centrale, qui comprend quatre espèces africaines.

⊔ *Aulacobothrus invenustus* (Karsch, 1893)

Phorisa invenusta Karsch, 1893, p. 65-66

Syntypes mâle(s) et femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 4 syntypes, 2 mâles et 2 femelles)

Syn.: *Chorthippus (Stauroderus) ypsilon* Kamy, 1907, p. 363, 364. Syntypes mâle(s), femelle(s), Soudan, NM Vienne [Uvarov, 1926a, p. 431, avec *Aulacobothrus invenustus*]

Cit.: *Aulacobothrus invenustus*

Golding, 1948, p. 537 • Jago, 1996a, p. 72 • Johnston, 1956, p. 665 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Uvarov, 1926a, p. 431

Dnopherula invenusta

Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-280 • Fishpool & Popov, 1984, p. 409 • Hollis, 1966, p. 275, 318-320 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 334 • Johnston, 1968, p. 387 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 581, 588-589 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 282-283, 289 • Otte, 1995b, p. 149 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Roy, 1969a, p. 220

Phonerula invenusta (-us)


Chapman, 1962, p. 51 • Davey *et al.*, 1959b, p. 586 • Descamps, 1965b, p. 1292-1293 • Dirsh, 1965, p. 541-542

Phonerula sp. 1 (= *Dnopherula invenusta* d'après Roy, 1969a, p. 198)

Roy, 1962, p. 111, 113, 134

Phorisa invenusta

Karsch, 1893, p. 65-66 • Kirby, 1910, p. 151



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Hollis, 1966 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Hollis, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Jago, 1996a • Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce est également citée du Soudan et de Centrafrique.

⊔ *Aulacobothrus obscurus* (Chopard, 1947)

Stenohippus obscurus Chopard, 1947, p. 153

Syntypes mâle(s), femelle(s), Guinée, Mont Nimba, MNHN Paris

Cit.: *Aulacobothrus obscurus*

Jago, 1996a, p. 72 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Roy, 2003, p. 375-376, 381, 389, fig. 29

Dnopherula obliquifrons (partie) (= *Phonerula sp. B* selon Jago, 1966b = *D. obscura* selon Jago, 1968)

Johnston, 1968, p. 387 (citation du *Phonerula obliquifrons* de Chapman, 1962)

Dnopherula obscura

Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 409 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 167-170, 173-174 ~ 1974b, p. 514-515, 529 ~ 1976, p. 5-85 • Hollis, 1966, p. 275 (clé), 292-293 • Jago, 1966b, p. 361-364 ~ 1967b, p. 258-259 ~ 1968, p. 336 • Johnston, 1968, p. 388 • Lecoq, 1977, addenda ~ 1980b, p. 581, 588 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62 • Mestre, 1988, p. 278-279, 289 • Otte, 1995b, p. 146

Phonerula obliquifrons (Err. dét. selon Jago, 1968, p. 363)

Chapman, 1962, p. 52

Phonerula obscura


Dirsh, 1963b, p. 219

Phonerula sp. B (= *Dnopherula obscura* selon Jago, 1967b, p. 258, et 1968, p. 336)

Chapman, 1961, p. 279 ~ 1962, p. 53-54, 62

Stenohippus obscurus

Chopard, 1947, p. 153-154 ~ 1958a, p. 150 • Dirsh, 1965, p. 534 • Johnston, 1956, p. 689 ~ 1968, p. 381



Dist.: **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1984) - **Côte d'Ivoire** (Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Hollis, 1966 • Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1947, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (Jago, 1968) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Jago, 1996a • Lecoq, 1980b)

L'espèce n'est citée que de notre zone d'étude.

⊔ ***Aulacobothrus sp.***

Cit.: *Dnopherula sp.* (1) à *D. sp.* (5)
Davey *et al.*, 1959b, p. 586

Dist.: **Mali** (Davey *et al.*, 1959b)

AULOCAROIDES Werner, 1913

Oedipodinae

Aulocaroides Werner, 1913, p. 218

Espèce-type : *Aulocaroides leroii* Werner, 1913, p. 218

Genre afrotropical comprenant trois espèces.

⊔ ***Aulocaroides nigericus*** Dirsh, 1949

Aulocaroides nigericus Dirsh, 1949b, p. 765-767, fig. 3-4

Holotype femelle, Nigeria, Kalkala, NHM Londres



Cit.: *Aulocaroides leroii* (Err. dét. pour *Aulocaroides nigericus* selon Dirsh, 1949b)
Golding, 1948, p. 540, 578-584

Aulocaroides nigericus

Cornes & Riley, 1972, p. 12 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959b, p. 574 • Descamps, 1965b, p. 1260 ~ 1968, p.