

• Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Ramme, 1929)



**BAIDOCERACRIS** Chopard, 1947

Gomphocerinae

*Baidoceracris* Chopard, 1947, p. 152

Espèce-type : *Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947, p. 152

Genre afrotropical monospécifique.


⊃ ***Baidoceracris zolotarewskyi*** Chopard, 1947

*Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947, p. 152

Holotype mâle, Mali, Dia-Diafarabé, MNHN Paris

**Cit.:** *Baidoceracris zolotarewskyi*

Chapman, 1962, p. 55 • Chopard, 1947, p. 152 • Davey *et al.*, 1959b, p. 591-592 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1958c, p. 62-63 ~ 1965, p. 512-513 • Fishpool & Popov, 1984, p. 406 • Jago, 1967b, p. 250 ~ 1968, p. 342 • Johnston, 1956, p. 720 ~ 1968, p. 368 • Lecoq, 1978b, 243 ~ 1980b, p. 580, 582 • Mestre, 1988, p. 258-259 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 109



**Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "**French Sudan**" (Dirsh, 1965) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Mali** (Chopard, 1947 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone.

**BERENGUERIA** I. Bolívar, 1909

Gomphocerinae

*Berengueria* I. Bolívar, 1909b, p. 296

Espèce-type : *Berengueria rotundifrons* I. Bolívar, 1912b, p. 83 [Uvarov, 1953b, p. 176]

Ce genre afrotropical, qui avait été mis en synonymie avec *Dnopherula* par Dirsh (1958a), a été réhabilité par Jago (1996) qui y inclut trois espèces.

Cet auteur a par ailleurs décrit comme espèce nouvelle *B. cryptica*, très voisine de *B. bifoveolata*, avec qui elle coexiste fréquemment et avait été jusqu'ici confondue. La répartition respective de ces deux espèces devra donc être revue.

⊃ ***Berengueria bifoveolata*** (Karsch, 1893)

*Pnorisa bifoveolata* Karsch, 1893, p. 65

Syntypes mâles et femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin ?. Lectotype mâle désigné par Hollis (1966, p. 281) et déposé au NHM Londres. Cependant, Jago (1996, p. 74) désigne également comme lectotype le seul spécimen