


• Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Ramme, 1929)



**BAIDOCERACRIS** Chopard, 1947

Gomphocerinae

*Baidoceracris* Chopard, 1947, p. 152

Espèce-type : *Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947, p. 152

Genre afrotropical monospécifique.


⊃ *Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947

*Baidoceracris zolotarewskyi* Chopard, 1947, p. 152

Holotype mâle, Mali, Dia-Diafarabé, MNHN Paris

Cit.: *Baidoceracris zolotarewskyi*

Chapman, 1962, p. 55 • Chopard, 1947, p. 152 • Davey *et al.*, 1959b, p. 591-592 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1958c, p. 62-63 ~ 1965, p. 512-513 • Fishpool & Popov, 1984, p. 406 • Jago, 1967b, p. 250 ~ 1968, p. 342 • Johnston, 1956, p. 720 ~ 1968, p. 368 • Lecoq, 1978b, 243 ~ 1980b, p. 580, 582 • Mestre, 1988, p. 258-259 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 109



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "**French Sudan**" (Dirsh, 1965) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Mali** (Chopard, 1947 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone.

**BERENGUERIA** I. Bolívar, 1909

Gomphocerinae

*Berengueria* I. Bolívar, 1909b, p. 296

Espèce-type : *Berengueria rotundifrons* I. Bolívar, 1912b, p. 83 [Uvarov, 1953b, p. 176]

Ce genre afrotropical, qui avait été mis en synonymie avec *Dnopherula* par Dirsh (1958a), a été réhabilité par Jago (1996) qui y inclut trois espèces.

Cet auteur a par ailleurs décrit comme espèce nouvelle *B. cryptica*, très voisine de *B. bifoveolata*, avec qui elle coexiste fréquemment et avait été jusqu'ici confondue. La répartition respective de ces deux espèces devra donc être revue.


⊃ *Berengueria bifoveolata* (Karsch, 1893)

*Phorisa bifoveolata* Karsch, 1893, p. 65

Syntypes mâles et femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin ?. Lectotype mâle désigné par Hollis (1966, p. 281) et déposé au NHM Londres. Cependant, Jago (1996, p. 74) désigne également comme lectotype le seul spécimen

mâle, selon lui, de la série-type du MNHU Berlin ; Karsch indiquait pourtant dans sa description plusieurs mâles et femelles (DORSA : aucun spécimen recensé).

- Cit.:** *Berengueria bifoveolata*  
 Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 62 • Golding, 1948, p. 537 • Jago, 1996a, p. 74-75 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Phipps, 1962, p. 13-21 • Uvarov, 1953b, p. 177  
*Dnopherula sp.* (= *Dnopherula bifoveolata* d'après Roy, 1969a, p. 198)  
 Roy, 1962, p. 111, 113, 134  
*Dnopherula bifoveolata*  
 Chapman, 1962, p. 54 • Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Dirsh, 1965, p. 542 ~ 1970, p. 565-566 • Fishpool & Popov, 1984, p. 408 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 165-167, 169-170, 173-174 ~ 1974b, p. 513-515, 529-530 ~ 1976, p. 5-85 ~ 1983, p. 301 • Hollis, 1966, p. 272 (clé), 281-283 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 333-334 • Johnston, 1956, p. 667 ~ 1968, p. 385 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 581, 588 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 278-279, 289 • Otte, 1995b, p. 145 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 344 • Roy, 1969a, p. 220  
*Phonerula bifoveolata*  
 Davey *et al.*, 1959b, p. 586 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1293 • Dirsh, 1958a, p. 29 ~ 1964, p. 80 • Dirsh, 1965, p. 541-542  
*Pnorisa bifoveolata*  
 Karsch, 1893, p. 65 • Kirby, 1910, p. 151




- Dist.:** Bénin (Dirsh, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1970 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976, 1983 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • *mat. exam.*) - **Togo** (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Kirby, 1910 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **AO** (Jago, 1996a • Lecoq, 1978b, 1980b)

Comme indiqué plus haut, la confusion éventuelle avec *B. cryptica* rend la plupart de ces signalisations à confirmer. L'espèce est également citée du sud-Soudan, du Cameroun, de Centrafrique et d'Ouganda.

#### U *Berengueria cryptica* Jago, 1996

*Berengueria cryptica* Jago, 1996a, p. 74-76  
 Holotype mâle, Togo, Katchanke, NHM Londres

- Cit.:** *Berengueria cryptica*  
 Jago, 1996a, p. 74-76 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324



- Dist.:** Bénin (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997)

La signalisation du Togo de Mestre *et al.* (2001) est en fait à rapporter au Bénin. L'espèce est également citée du Cameroun et de Centrafrique.

⊔ **Berengueria sp.**

- Cit.:** *Dnopherula sp. nov. near rotundifrons*  
Fishpool & Popov, 1984, p. 409-410  
*Dnopherula rotundifrons* (Err. dét., espèce d'Afrique centrale)  
Medler, 1980, p. 39 • Otte, 1995b, p. 147 • Oyidi, 1977 ~ 1978

**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984) - Nigeria (Medler, 1980 • Oyidi, 1977, 1978) - Togo (Fishpool & Popov, 1984)

**BOCAGELLA** I. Bolívar, 1889

Coptacrinae

*Bocagella* I. Bolívar, 1889b, p. 161-162  
Espèce-type : *Bocagella lanuginosa* I. Bolívar, 1889b, p. 162

Genre afrotropical comprenant trois espèces.

⊔ ***Bocagella acutipennis acutipennis* Miller, 1932**

*Bocagella acutipennis* Miller, 1932, p. 44-45, fig. 25.  
Holotype femelle, Nigeria, Mama District, Akwanga Division, NHM Londres

*B. acutipennis* est considérée ici comme la seule espèce du genre en Afrique de l'Ouest. Les signalisations de *B. lanuginosa*, qui est en fait une espèce d'Angola et de Tanzanie, faites par Karsch et Ramme, sont antérieures à la description de Miller ce qui explique l'erreur de détermination. Le statut de la sous-espèce *B. acutipennis hirsuta* Kevan, 1956, citée à l'origine d'Ouganda, est à préciser, et les signalisations d'Afrique de l'Ouest sont considérées ici comme des erreurs et rapportées à la sous-espèce nominative.

**Syn.:** *Bocagella bolivari* Miller, 1932, p. 43-44. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres  
[Dirsh, 1970, p. 150, avec *Bocagella acutipennis*]

**Cit.:** *Bocagella acutipennis*  
Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Descamps, 1965a, p. 944, 948 • Dirsh, 1963b, p. 211 ~ 1964, p. 57 ~ 1965, p. 248-249 ~ 1970, p. 150-151 • Fishpool & Popov, 1984, p. 391 • Gillon, 1983, p. 301 • Jago, 1967b, p. 253 ~ 1968, p. 250-251 • Johnston, 1956, p. 277 ~ 1968, p. 182 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 544 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 104-105 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 313 • Miller, 1932, p. 44 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Otte, 1995a, p. 132

*Bocagella acutipennis acutipennis*  
Roy, 2003, p. 333-334, 386, 380, fig. 11

? *Bocagella acutipennis hirsuta*  
Duviard, 1970a, p. 69 ~ 1970b, p. 90-92 • Gillon, 1971, p. 433, 462, 469 ~ 1974a, p. 139, 169-170 ~ 1974b, p. 471, 473, 517, 523 ~ 1983, p. 293 • Otte, 1995a, p. 132

*Bocagella bolivari*


Phipps, 1970, p. 326

*Bocagella lanuginosa* (Err. dét., espèce d'Afrique centrale)

Dirsh, 1965, p. 248-249 • Jago, 1968, p. 250 • Karsch, 1893, p. 93 • Ramme, 1929, p. 343, 482

*Bocagella sp.*

Golding, 1948, p. 566



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Duviard, 1970a,b • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1983 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Miller, 1932 • Oyidi, 1977, 1978) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Tchad (*mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce, très caractéristique, est également signalée du Zaïre et de la Tanzanie.