

"French Sudan" (Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1932b • *mat. exam.*) - **Guinée** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karny, 1915) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a, 1932b) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1932b) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • Uvarov, 1932b) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Dirsh, 1966, 1970 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce a été citée de nombreux pays d'Afrique sub-saharienne. Au-delà, outre la Sicile (et les îles Liparies), elle n'est citée que de l'Espagne mais n'a cependant jamais été signalée d'Afrique du Nord.

U *Brachycrotaphus* sp.

Cit.: *Brachycrotaphus* sp.
Descamps & Le Breton, 1973, p. 127 • Phipps, 1970, p. 344

Dist.: Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973) - Sierra Leone (Phipps, 1970)

BRYOPHYMA Uvarov, 1923

Cyrtacanthacridinae

Bryophyma Uvarov, 1923a, p. 141

Espèce-type : *Cyrtacanthacris debilis* Karsch, 1896, p. 300

Syn.: *Rhytidacris* Uvarov, 1923a, p. 141 [Dirsh, 1966, p. 314, avec *Bryophyma*]


Genre afrotropical comprenant deux espèces. Il a de grandes affinités avec *Acridoderes* si tant est que leur séparation soit fondée.

U *Bryophyma decipiens* (Karsch, 1896)

Cyrtacanthacris decipiens Karsch, 1896, p. 298-299, fig. 23

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle désigné par Mestre (2001) (DORSA : 2 syntypes, un mâle et une femelle).

Cette espèce n'avait été longtemps citée que par le matériel type du Togo. Même si elle paraît peu commune ou localisée, cette apparente rareté résulte également du fait qu'elle avait été jusqu'ici mal identifiée sous le nom de *Bryophyma debilis*, espèce d'Afrique centrale (Mestre, 2001).



Cit.: *Acridium decipiens*

Finot, 1907, p. 330

Bryophyma decipiens

Mestre, 2001, p. 487-488

Bryophyma debilis (Err. dét. selon Mestre, 2001, p. 487-488)

Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Dirsh, 1965, p. 378, 379 ~ 1966, p. 315-316 ~ 1970, p. 345-347 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 397 • Launois-Luong *et al.*, 1999, p. 344-347 • Lecoq, 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 560, 562 ~ 1984 • Luong-Skovmand & Balança, 2000, p. 110-118 • Luong-Skovmand & Foucart, 2000, p. 103-109 • Mestre, 1988, p. 162-163 • Mestre, 2001, p. 487-488 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Uvarov, 1923a, p. 136

Bryophyma debilis picta (Err. dét. selon Mestre, 2001, p. 487-488)


Forsyth, 1966, p. 96 • Johnston, 1968, p. 271

Rhytidacris sp. 1

Lecoq, 1977, p. 6

Cyrtacanthacris decipiens

Dirsh, 1965, p. 385 ~ 1979, p. 40 • Jago, 1968, p. 277 • Johnston, 1956, p. 379 • Karsch, 1896, p. 298-299 • Kirby, 1910, p. 453 • Mestre, 2001, p. 487-488 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123



Dist.: Bénin (Mestre, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois-Luong *et al.*, 1999 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Luong-Skovmand & Balança, 2000 • Luong-Skovmand & Foucart, 2000 • Mestre, 1988 • Mestre, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Dirsh, 1966, 1970 • Forsyth, 1966 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965 • Finot, 1907 • Jago, 1968 • Karsch, 1896 • Kirby, 1910 • Mestre, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997)

⊂ ***Bryophyma tectifera*** (Karsch, 1896)

Cyrtacanthacris tectiferus Karsch, 1896, p. 299-300, fig. 24

Syntypes mâle(s), femelle(s), Togo, Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle signalé par Dirsh (1970, p. 347) (DORSA : 2 syntypes, un mâle et une femelle).

Cit.: *Acridium tectiferum*

Finot, 1907, p. 321

Bryophyma tectifera


COPR, 1982, p. 293-294 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1966, p. 316-317 ~ 1970, p. 345-347 • Fishpool & Popov, 1984, p. 397 • Gillon, 1974a, p. 148 ~ 1974b, p. 486, 520 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 162-163 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Phipps, 1970, p. 333 • Roy, 2003, p. 349-350, 380, 387, fig. 17

Cyrtacanthacris tectiferus

Karsch, 1896, p. 299-300 • Kirby, 1910, p. 453

Rhytidacris tectifera

Chapman, 1962, p. 29 • Chopard, 1958a, p. 133-134 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1954, p. 178 ~ 1965a, p. 960-961 • Dirsh, 1956c, p. 275, pl. 33 ~ 1964, p. 65 ~ 1965, p. 377, 378 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Golding, 1946, p. 21, 34 ~ 1947, p. 80 ~ 1948, p. 578-584 • Jago, 1967b, p. 262 ~ 1968, p. 271-272 • Johnsen, 1970, p. 143 • Johnston, 1956, p. 353-354 ~ 1968, p. 271 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 560, 562 ~ 1984 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1971 • Uvarov, 1923a, p. 140, 141 ~ 1923b, p. 483



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Libéria (COPR, 1982 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1946, 1947, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1923b) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953, 1954 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971) - Togo (COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Finot, 1907 • Jago, 1968 • Karsch, 1896 • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette espèce est signalée vers l'est jusqu'au Kenya et, vers le sud, jusqu'en Zambie.

CALEPHORUS Fieber, 1853

Oedipodinae

Calephorus Fieber, 1853, p. 97

Espèce-type : *Acrydium compressicornis* Latreille, 1804, p. 155 [Kirby, 1910, p. 136-137]

Syn.: *Oxycoryphus* Fischer, 1853, p. 311 [Rehn, 1902a, p. 317, avec *Calephorus*]