

**Sénégal** (I. Bolívar, 1886a • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Krauss, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965, 1970 • Vayssièrè & Mimeur, 1925, 1926) - **Sierra Leone** (I. Bolívar, 1886a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Stål, 1873b) - **Togo** (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Jago, 1964a, 1968 • Risbec, 1950a • Vayssièrè & Mimeur, 1925, 1926)



Cette espèce est signalée également du Soudan.

## **CHROMOTRUXALIS** Dirsh, 1951

Acridinae


*Chromotruxalis* Dirsh, 1951a, p. 135 (clé), 136  
Espèce-type : *Acrida cockerelli* Uvarov, 1932a, p. 172-174

Genre afrotropical comprenant trois espèces.

### ⊃ ***Chromotruxalis cockerelli*** (Uvarov, 1932) (? , présence à confirmer)

*Acrida cockerelli* Uvarov, 1932a, p. 172-174, pl. 5  
Holotype femelle, Zaïre, Katanga, NHM Londres

**Cit.:** *Chromotruxalis cockerelli*  
Davey *et al.*, 1959b, p. 596 • Descamps, 1965b, p. 1293 • Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 60 ~ • Johnston, 1956, p. 740 ~ 1968, p. 363 • Lecoq, 1980b, p. 578-579 • Mestre, 1988, p. 292 • Otte, 1995b, p. 308 • Roy, 1964c, p. 123




**Dist.:** Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Roy, 1964c) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Cette espèce n'est citée dans la révision de Dirsh (1951a) que d'Angola et du Zaïre. Sa présence en Afrique de l'Ouest est à confirmer.

### ⊃ ***Chromotruxalis liberta*** (Burr, 1902)

*Acrida liberta* Burr, 1902, p. 160  
Holotype femelle, Ghana, Hô, NM Vienne

**Cit.:** *Acrida liberta*  
Burr, 1902, p. 160  
*Chromotruxalis liberta*  
Chopard, 1958a, p. 145 • Dirsh, 1951a, p. 140 ~ 1963b, p. 220 ~ 1965, p. 507 ~ 1966, p. 453 ~ 1970, p. 527-528 • Fishpool & Popov, 1984, p. 405 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 160-161, 169-170, 173-174 ~ 1974b, p. 507-508, 524 ~ 1976, p. 5-85 ~ 1983, p. 294, 297 • Jago, 1967b, p. 248 ~ 1968, p. 348 • Johnston, 1956, p. 741 ~ 1968, p. 363 • Kirby, 1910, p. 91 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Mestre, 1988, p. 244-245, 292 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120, 124 • Otte, 1995b, p. 308 • Roy, 1964c, p. 123 ~ 2003, p. 354, 381, 388, fig. 18



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a,b, 1976, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964c, 2003 • *mat. exam.*) - Ghana (Burr, 1902 • Dirsh, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964c) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Gillon, 1983)

Cette espèce est également signalée du Soudan, Ouganda, Zaïre et Tanzanie. La signalisation du Mali (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) est à confirmer.

## CHROTOGONUS Audinet-Serville, 1838

Pyrgomorphinae

*Chrotogonus* Audinet-Serville, 1838, p. 569, 698, 702

Espèce-type : *Ommexecha lugubre* Blanchard, 1836, p. 616 [= *C. homalodemus*]

Syn.: *Chrotogonus (Obbiacris)* Kevan, 1952, p. 88, 95 [Dirsh, 1965, p. 111, avec *Chrotogonus*]

Ce genre comprend quelques espèces d'Afrique sub-saharienne présentes sur le pourtour de la mer Rouge, et, via l'Arabie, jusqu'en Inde. Kevan (1977) ne retient pas la synonymie de Dirsh et maintient les sous-genres *Obbiacris* et *Chrotogonus*.

### ⊂ *Chrotogonus homalodemus homalodemus* (Blanchard, 1836)

*Ommexecha homalodemum* Blanchard, 1836, p. 615-616, pl. 22 : f. 4

Holotype femelle, Égypte, Sennaar (= Nubie), MNHN Paris

**Syn.:** *Ommexecha lugubre* Blanchard, 1836, p. 616-618, pl. 22 : f. 5. Lectotype femelle, Égypte, MNHN Paris

[Kevan, 1957, p. 57, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Ommexecha latum* Blanchard, 1836, p. 624. Type femelle, illust. Savigny, 1826, pl. 6 : f. 2 (1), Égypte

[Kevan, 1957, p. 57, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Ommexecha savigny* Blanchard, 1836, p. 624. Type mâle, illust. Savigny, 1826, pl. 6 : f. 2 (2, 3), Égypte

[Kevan, 1957, p. 58, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Chrotogonus blanchardi* Krauss, 1890, p. 257. Type femelle (juv.), illust. Savigny, 1826, pl. 6 : f. 2 (4), Égypte

[Kevan, 1957, p. 56, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Chrotogonus scudderi* l. Bolívar, 1884a, p. 38, 43. Type femelle, Égypte, MCZ Cambridge, perdu selon Kevan (1957)

[Kevan, 1957, p. 58, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Chrotogonus savignyi* f. *brachyptera* l. Bolívar, 1904a, p. 93, 101. Type, illust. Savigny, 1826, pl. 6 : f. 2 (1) Égypte

[Kevan, 1957, p. 44, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Chrotogonus savignyi* f. *macroptera* l. Bolívar, 1904a, p. 101. Type, illust. Savigny, 1826, pl. 6 : f. 2 (2,3), Égypte

[Kevan, 1957, p. 44, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Chrotogonus concavus* Kirby, 1914, p. 162, 165. Holotype femelle, Quetta (*Balouchistan*), NHM Londres

[Kevan, 1957, p. 56, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

*Chrotogonus aethiopicus* l. Bolívar, 1922, p. 170, pl. 10<sup>2</sup>. Holotype femelle, Éthiopie, MNHN Paris

Kevan, 1959, p. 119, avec *Chrotogonus homalodemus homalodemus*]

On se reportera à Kevan (1957, 1959, 1977) pour plus de précisions sur ces synonymies. Cet auteur avait créé dans cette sous-espèce comme dans les suivantes, des groupes ("désignations techniques" : *macropterus*, *mesopterus*, *brachypterus* et *micropterus*) basés sur le développement des élytres, très variable dans ce genre, et à l'intérêt discutable.

**Cit.:** *Chrotogonus homalodemus* (-a)

l. Bolívar, 1904a, p. 102-103 • Descamps, 1968, p. 539, 540 (? Err. dét. pour *C. senegalensis*, voir ci-après) • Dirsh, 1965, p. 111-112 • Kirby, 1910, p. 300 • Launois, 1978b, p. 62-63 • Lecoq, 1980b, p. 535-536 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115

*Chrotogonus homalodemus lugubris*

Chopard, 1963, p. 569 • Johnston, 1956, p. 115-116

*Chrotogonus homalodemus homalodemus*

COPR, 1982, p. 83-84 • Johnston, 1968, p. 73-76 • Kevan, 1959, p. 119-140 ~ 1977, p. 545-551 • Mestre, 1988, p. 46, 47 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 122 • Otte, 1994b, p. 47-49

*Chrotogonus senegalensis* (Err. dét. pour *Chrotogonus homalodemus homalodemus* selon Kevan, 1959, 1977)

Chopard, 1941, p. 48 ~ 1950, p. 143

**Dist.:** ? Mauritanie ou Sénégal (l. Bolívar, 1904a • COPR, 1982 • Kevan, 1959) - Niger (Chopard, 1941, 1950 • COPR, 1982 • Kevan, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Tchad (Chopard, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 ? • Kevan, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Kevan, 1977 • Launois, 1978b • Lecoq, 1980b)