

1971) - Tchad (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Jago, 1968 • Kevan, 1959, 1968b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Kevan, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1965 • Kevan, 1954b • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Popov, 1985c, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a)

Cette espèce terricole commune est signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie et sa distribution vers le sud s'étend à l'Angola, au Zaïre et à la Tanzanie.

COMACRIS I. Bolívar, 1890

Acridinae

Comacris I. Bolívar, 1890a, p. 312

Espèce-type : *Comacris sansibaricus* I. Bolívar, 1890a, p. 313 [I. Bolívar, 1909b, p. 288]

Genre afrotropical comprenant deux espèces.


⊃ ***Comacris lamottei*** Chopard, 1947

Comacris lamottei Chopard, 1947, p. 153

Holotype mâle, Guinée, mont Nimba, MNHN Paris

Cit.: *Comacris lamottei*

Chopard, 1947, p. 153 ~ 1958a, p. 150 • Dirsh, 1963b, p. 217 ~ 1965, p. 442, 443 • Johnston, 1956, p. 623 ~ 1968, p. 311 • Lamotte & Roy, 1998, p. 121 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Otte, 1995b, p. 272-273 • Roy, 1964a, p. 1175 ~ 2003, p. 365, 381, 388, fig. 24



Dist.: Guinée (Chopard, 1947, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 2003)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

CONIPODA Saussure, 1884

Oedipodinae

Conipoda Saussure, 1884, p. 192-193

Espèce-type : *Conipoda calcarata* Saussure, 1884, p. 193-194

Syn.: *Pternoscirtus* Saussure, 1884, p. 59 [Saussure, 1884, p. 192, avec *Conipoda*]

Genre afrotropical et oriental de moins d'une dizaine d'espèces.

Il y a eu une certaine confusion dans ce genre du fait que Saussure (1884) avait créé *Pternoscirta* (p. 52), genre valide, et *Pternoscirtus* (p. 59, clé) qu'il a corrigé en *Conipoda* (p. 192), ce qu'il rappelle en 1889a (p. 95). Par la suite, Uvarov (1940b) a eu l'idée fâcheuse de réinstaurer *Pternoscirtus* d'où de nombreuses citations utilisant ce nom de genre au lieu de *Conipoda*. Whellan (1978), soulignant que cette réhabilitation n'était pas conforme aux recommandations du Code, a proposé de rejeter *Pternoscirtus* comme homonyme de *Pternoscirta*, et d'admettre *Conipoda* comme nom valide.

⊃ ***Conipoda pallida*** (Walker, 1870)

Epacromia pallida Walker, 1870b, p. 772

Holotype mâle, Afrique de l'Ouest, NHM Londres

Syn.: ? *Conipoda calcarata* Saussure, 1884, p. 193-194. Syntypes mâle(s), femelle(s), Madagascar, perdus ? (holotype mâle, perdu selon Dirsh & Descamps, 1968)

[? Whellan, 1978, avec *Conipoda pallida*]

Conipoda calcarata var. Saussure, 1884, p. 194. Type femelle, Sénégal, MHN Genève ?

[Uvarov, 1925d, p. 280, avec *Conipoda pallida*]

? *Acrotylus bicornis* Sjöstedt, 1918, p. 6-8. Holotype mâle, Madagascar, NR Stockholm

[Dirsh, 1961b, p. 397, avec *Pternoscirtus calcaratus*].

Le même auteur (1963a, p. 268) réindique la même synonymie en la citant comme nouvelle

Conipoda gracilis, Miller, 1929, p. 76-77. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh, 1970, p. 478, avec *Pternoscirtus pallidus*]