

1971) - Tchad (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Jago, 1968 • Kevan, 1959, 1968b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Kevan, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1965 • Kevan, 1954b • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Popov, 1985c, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a)

Cette espèce terricole commune est signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie et sa distribution vers le sud s'étend à l'Angola, au Zaïre et à la Tanzanie.

COMACRIS I. Bolívar, 1890

Acridinae

Comacris I. Bolívar, 1890a, p. 312

Espèce-type : *Comacris sansibaricus* I. Bolívar, 1890a, p. 313 [I. Bolívar, 1909b, p. 288]

Genre afrotropical comprenant deux espèces.

⊃ *Comacris lamottei* Chopard, 1947

Comacris lamottei Chopard, 1947, p. 153

Holotype mâle, Guinée, mont Nimba, MNHN Paris

Cit.: *Comacris lamottei*

Chopard, 1947, p. 153 ~ 1958a, p. 150 • Dirsh, 1963b, p. 217 ~ 1965, p. 442, 443 • Johnston, 1956, p. 623 ~ 1968, p. 311 • Lamotte & Roy, 1998, p. 121 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Otte, 1995b, p. 272-273 • Roy, 1964a, p. 1175 ~ 2003, p. 365, 381, 388, fig. 24



Dist.: Guinée (Chopard, 1947, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 2003)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

CONIPODA Saussure, 1884

Oedipodinae

Conipoda Saussure, 1884, p. 192-193

Espèce-type : *Conipoda calcarata* Saussure, 1884, p. 193-194

Syn.: *Pternoscirtus* Saussure, 1884, p. 59 [Saussure, 1884, p. 192, avec *Conipoda*]

Genre afrotropical et oriental de moins d'une dizaine d'espèces.

Il y a eu une certaine confusion dans ce genre du fait que Saussure (1884) avait créé *Pternoscirta* (p. 52), genre valide, et *Pternoscirtus* (p. 59, clé) qu'il a corrigé en *Conipoda* (p. 192), ce qu'il rappelle en 1889a (p. 95). Par la suite, Uvarov (1940b) a eu l'idée facheuse de réinstaurer *Pternoscirtus* d'où de nombreuses citations utilisant ce nom de genre au lieu de *Conipoda*. Whellan (1978), soulignant que cette réhabilitation n'était pas conforme aux recommandations du Code, a proposé de rejeter *Pternoscirtus* comme homonyme de *Pternoscirta*, et d'admettre *Conipoda* comme nom valide.

⊃ *Conipoda pallida* (Walker, 1870)

Epacromia pallida Walker, 1870b, p. 772

Holotype mâle, Afrique de l'Ouest, NHM Londres

Syn.: ? *Conipoda calcarata* Saussure, 1884, p. 193-194. Syntypes mâle(s), femelle(s), Madagascar, perdus ? (holotype mâle, perdu selon Dirsh & Descamps, 1968)

[? Whellan, 1978, avec *Conipoda pallida*]

Conipoda calcarata var. Saussure, 1884, p. 194. Type femelle, Sénégal, MHN Genève ?

[Uvarov, 1925d, p. 280, avec *Conipoda pallida*]

? *Acrotylus bicornis* Sjöstedt, 1918, p. 6-8. Holotype mâle, Madagascar, NR Stockholm

[Dirsh, 1961b, p. 397, avec *Pternoscirtus calcaratus*].

Le même auteur (1963a, p. 268) réindique la même synonymie en la citant comme nouvelle


Conipoda gracilis, Miller, 1929, p. 76-77. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh, 1970, p. 478, avec *Pternoscirtus pallidus*]

Acrotylus salamensis Sjöstedt, 1929a, p. 9-11, 40. Holotype mâle Tanzanie, NR Stockholm
[Johnsen & Forchhammer, 1975, p. 48, avec *Pternoscirtus pallidus*]

Si l'espèce-type du genre *Conipoda* est bien *C. calcarata* Saussure, décrite de Madagascar, comme le signale Whellan (1978), ce dernier indique aussi, sans en fournir l'origine, cette espèce comme synonyme de *C. pallida*. En fait, seule *C. calcarata* var., décrite du Sénégal, a été mise en synonymie avec *C. pallida* par Uvarov (1925d). Cependant, Saussure lui-même (1889a, p. 96) cite *C. calcarata* du Sénégal. Nous indiquons donc, sous toutes réserves, la synonymie de *C. calcarata* avec *C. pallida* (et celle de *A. bicornis*).

- Cit.:** *Chortoicetes pallida*
Kirby, 1910, p. 193
Conipoda pallida
COPR, 1982, p. 430-431 • Fishpool & Popov, 1984, p. 360 • Mestre, 1988, p. 214-215 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Mestre *et al.*, 2001, p. 322
Conipoda calcarata
Saussure, 1889a, p. 96
Conipoda calcarata var.
Saussure, 1884, p. 194
Epacromia pallida
Walker, 1870b, p. 772
Pternoscirtus calcaratus
Dirsh, 1965, p. 467, 468 • Johnston, 1956, p. 468
Pternoscirtus gracilis
Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Davey *et al.*, 1959b, p. 572 • Descamps, 1965b, p. 1260 • Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 59 ~ 1964, p. 75 ~ 1965, p. 467, 468 • Golding, 1948, p. 547 • Johnston, 1956, p. 468 ~ 1968, p. 326 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 339 ~ 1971 • Roy, 1962, p. 111, 129 ~ 1964b, p. 1178, 1180, 1187, 1192 ~ 1969a, p. 217
Pternoscirtus pallidus
Davey *et al.*, 1959b, p. 571-572 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-280 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1271 ~ 1968, p. 561, 564 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 120 • Dirsh, 1965, p. 467, 468 ~ 1970, p. 478-479 • Jago, 1967b, p. 255 ~ 1968, p. 292 • Johnsen, 1981a, p. 93 • Johnston, 1956, p. 468 ~ 1968, p. 327 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 569, 573 • Medler, 1980, p. 41 • Otte, 1995b, p. 435-436



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • *mat. exam.*) - **Nord-Cameroun** (*mat. exam.*) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1969a • Saussure, 1884 • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce, peu commune, a un aspect très similaire à *Acrotylus blondeli*, avec laquelle elle a probablement été parfois confondue. Elle est présente jusqu'en Afrique du Sud, et, si la synonymie avec *C. calcarata* est exacte, à Madagascar.

COPHOTYLUS Krauss, 1902

Oedipodinae

Cophotylus Krauss, 1902c, p. 56

Espèce-type : *Cophotylus steindachneri* Krauss, 1902c, p. 56

Syn.: *Somalella* Dirsh, 1949b, p. 771 [Popov, 1985b, p. 67, avec *Cophotylus*]

Genre comprenant près d'une dizaine d'espèces des régions holarctique et afrotropicale.

⊔ *Cophotylus aurora* (Karny, 1907)

Wernerella aurora Karny, 1907, p. 356

Type(s) mâle(s), Soudan, Gebel Araschkol, NM Vienne