

CRIOTOCATANTOPS Jago, 1984

Catantopinae

Criotocatantops Jago, 1984, p. 304 (clé), 346

Espèce-type : *Catantops annulatus* Uvarov, 1926a, p. 447

Genre afrotropical comprenant au moins quatre espèces selon Jago (1984) ; il nécessite une révision.

⊃ ***Criotocatantops annulatus*** (Uvarov, 1926)

Catantops annulatus Uvarov, 1926a, p. 447-449


Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

Cit.: *Catantops annulatus*

Chapman, 1962, p. 12, 26, 60 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1968, p. 556 • Dirsh, 1956a, p. 67-68, 71 ~ 1965, p. 363, 364 • Golding, 1948, p. 568 • Jago, 1967b, p. 264 ~ 1968, p. 258-259 • Johnston, 1956, p. 310 ~ 1968, p. 257 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 555, 557-558 • Medler, 1980, p. 38 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 330 • Roy, 1968, p. 11 • Sjöstedt, 1931b, p. 4 • Uvarov, 1926a, p. 447-449

Criotocatantops annulatus

Jago, 1984, p. 346-347 • Mestre, 1988, 152-153 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Otte, 1995a, p. 294



Dist.: **Burkina Faso** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Côte d'Ivoire** (Dirsh, 1956a, 1965) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1956a, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Jago, 1984 • Mestre, 1988) - **Mali** (Jago, 1968) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1956a, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968, 1984 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Dirsh, 1956a, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce a été citée également du Soudan, d'Ouganda et de Tanzanie.

Fishpool & Popov (1984) indiquent, d'après une communication personnelle de Jago, que *Criotocatantops annulatus* ne serait présent ni au Bénin ni au Togo, mais remplacé par deux espèces très similaires encore non décrites. Des confusions existent aussi avec *Criotocatantops pulchripes*. Nous avons en l'attente d'y voir plus clair regroupé plus loin nos observations pour cette région ainsi que celles de Popov & Fishpool sous le nom *Criotocatantops sp.*

⊃ ***Criotocatantops clathratus*** (Ramme, 1929) (? , présence douteuse)

Catantops clathratus Ramme, 1929, p. 421, 422, fig. 83, pl. 13 : f. 1

Holotype mâle, Centrafrique, Pama-Quelle, MNHU Berlin (DORSA : + 5 paratypes)

Cit.: *Catantops clathratus*

Dirsh, 1956a, p. 68-70, 71 ~ 1964, p. 60 ~ 1966, p. 281-283 ~ 1970, p. 312-313 • Johnston, 1956, p. 313 ~ 1968, p. 258 • Ramme, 1929, p. 421, 422, pl. 13 • Roy, 1968, p. 11

Criotocatantops clathratus

Otte, 1995a, p. 294

Dist.: ? **Togo** (Dirsh, 1956a, 1964, 1966, 1970)

Les citations de ce pays sont douteuses. L'espèce est connue du Cameroun, Soudan, Ouganda, Zaïre et Angola.

⊃ ***Criotocatantops pulchripes*** (Karny, 1915)

Catantops pulchripes Karny, 1915, p. 140-141

Holotype mâle, Guinée, Dubréka, NM Vienne


La synonymie avec *Catantops irritans* Ramme, 1929, faite par Dirsh & Uvarov (1953b, p. 233), est erronée selon Jago (1984, p. 347).

Cit.: *Catantops pulchripes*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1965a, p. 953, 954 • Dirsh, 1956a, p. 66-67, 71 ~ 1965, p. 363-365 ~ 1970, p. 310-311 • Gillon, 1974a, p. 146 ~ 1974b, p. 483, 527 • Johnston, 1956, p. 320 ~ 1968, p. 262 • Karny, 1915, p. 140-141 • Lecoq, 1980b, p. 555, 557-558 • Medler, 1980, p. 38 • Phipps, 1970, p. 331 • Roy, 1962, p. 110, 113, 126 ~ 1965, p. 622-623 ~ 1967, p. 1560 ~ 1968, p. 11, pl. 19 ~ 1969a, p. 214 ~ 1970, p. 699

Criotocatantops pulchripes

Jago, 1984, p. 346-347 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Mestre, 1988, p. 152-153 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Otte, 1995a, p. 295 • Popov, 1989, p. 64-65



Dist.: **Burkina Faso** (Mestre, 1988) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Dirsh, 1956a, 1965, 1970 • Jago, 1984 • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Dirsh, 1956b, 1965, 1970 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1965, 1967, 1968, 1969a, 1970) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Togo** (Dirsh, 1956b, 1965, 1970) - **AO** (Lecoq, 1980b • Popov, 1989 • Roy, 1968)

Ces signalisations sont à confirmer compte tenu des confusions probables dans ce genre notamment avec *C. annulatus*. L'espèce a été également citée du Soudan et d'Ouganda.

⊍ ***Criotocatantops* sp.**

Cit.: *Catantops* near ou près *annulatus* (deux espèces)
Fishpool & Popov, 1984, p. 396, 410 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316

Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

CRUCINOTACRIS Jago, 1996

Gomphocerinae

Crucinotacris Jago, 1996a, p. 75

Espèce-type : *Chorthippus (Stauroderus) wernerianus* Karny, 1907, p. 364

Genre comprenant trois espèces selon Jago (1996), deux afrotropicales et une orientale (Inde).

⊍ ***Crucinotacris werneriana* (Karny, 1907)**

Chorthippus (Stauroderus) wernerianus Karny, 1907, p. 363 (clé), 364

Syntypes mâle(s), femelles, Soudan, Gondokoro, perdus selon Hollis (1966, p. 296). Uvarov (1926a, p. 431) indiquait avoir examiné un cotype femelle.

Syn.: *Stauroderus wernerianus* var. *ustulata* Karny, 1907, p. 365. Type sans précision (holotype femelle selon Uvarov, 1926a), Soudan, NM Vienne
[Uvarov, 1926a, p. 432, avec *Aulacobothrus wernerianus*]

Cit.: *Aulacobothrus wernerianus*
Golding, 1948, p. 538 • Johnston, 1956, p. 667 • Risbec, 1950a, p. 42 + fig. 10 ~ 1950b, p. 317 • Uvarov, 1926a, p. 431-432 ~ 1953, p. 167

Chorthippus (Stauroderus) wernerianus

Karny, 1907, p. 363-365

Crucinotacris werneriana

Jago, 1996a, p. 75, 76 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325

Dnopherula obliquifrons (partie, le matériel cité par Chapman, 1962, est à rapporter à *A. obscurus* selon Jago, 1968)

Johnston, 1968, p. 387 (= citation de *Phonerula obliquifrons* par Roy, 1962, voir plus loin)

Dnopherula werneriana

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331-332, 335 • COPR, 1982, p. 529-530 • Comes & Riley, 1972, p. 15 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1968, p. 575, 576 • Dirsh, 1965, p. 543 ~ 1970, p. 570 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 383 • Hollis, 1966, p. 275 (clé), 296-299 • Jago, 1967b, p. 258 ~ 1968, p. 335-336 • Johnsen, 1981b, p. 156 • Johnston, 1968, p. 389 • Launois, 1978b, p. 256-257 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 105-106 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 71-72 ~ 1980b, p. 581, 588-589 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 280-281, 289 • Otte, 1995b, p. 151 • Oyidi, 1975b, p. 98 ~ 1976, p. 89 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 344 • Popov, 1989, p. 154-155 • Roy, 1969a, p. 220-221 ~ 1970, p. 703