

Criotocatantops pulchripes

Jago, 1984, p. 346-347 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Mestre, 1988, p. 152-153 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Otte, 1995a, p. 295 • Popov, 1989, p. 64-65



Dist.: Burkina Faso (Mestre, 1988) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Guinée (Dirsh, 1956a, 1965, 1970 • Jago, 1984 • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Dirsh, 1956b, 1965, 1970 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1965, 1967, 1968, 1969a, 1970) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Togo (Dirsh, 1956b, 1965, 1970) - AO (Lecoq, 1980b • Popov, 1989 • Roy, 1968)

Ces signalisations sont à confirmer compte tenu des confusions probables dans ce genre notamment avec *C. annulatus*. L'espèce a été également citée du Soudan et d'Ouganda.

⊍ *Criotocatantops sp.*

Cit.: *Catantops* near ou près *annulatus* (deux espèces)
Fishpool & Popov, 1984, p. 396, 410 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

CRUCINOTACRIS Jago, 1996

Gomphocerinae

Crucinotacris Jago, 1996a, p. 75

Espèce-type : *Chorthippus (Stauroderus) wernerianus* Karny, 1907, p. 364

Genre comprenant trois espèces selon Jago (1996), deux afrotropicales et une orientale (Inde).

⊍ *Crucinotacris werneriana* (Karny, 1907)

Chorthippus (Stauroderus) wernerianus Karny, 1907, p. 363 (clé), 364

Syntypes mâle(s), femelles, Soudan, Gondokoro, perdus selon Hollis (1966, p. 296). Uvarov (1926a, p. 431) indiquait avoir examiné un cotype femelle.

Syn.: *Stauroderus wernerianus* var. *ustulata* Karny, 1907, p. 365. Type sans précision (holotype femelle selon Uvarov, 1926a), Soudan, NM Vienne
[Uvarov, 1926a, p. 432, avec *Aulacobothrus wernerianus*]

Cit.: *Aulacobothrus wernerianus*

Golding, 1948, p. 538 • Johnston, 1956, p. 667 • Risbec, 1950a, p. 42 + fig. 10 ~ 1950b, p. 317 • Uvarov, 1926a, p. 431-432 ~ 1953, p. 167

Chorthippus (Stauroderus) wernerianus

Karny, 1907, p. 363-365

Crucinotacris werneriana

Jago, 1996a, p. 75, 76 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325

Dnopherula obliquifrons (partie, le matériel cité par Chapman, 1962, est à rapporter à *A. obscurus* selon Jago, 1968)

Johnston, 1968, p. 387 (= citation de *Phonerula obliquifrons* par Roy, 1962, voir plus loin)

Dnopherula werneriana

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331-332, 335 • COPR, 1982, p. 529-530 • Cornes & Riley, 1972, p. 15 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1968, p. 575, 576 • Dirsh, 1965, p. 543 ~ 1970, p. 570 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 383 • Hollis, 1966, p. 275 (clé), 296-299 • Jago, 1967b, p. 258 ~ 1968, p. 335-336 • Johnsen, 1981b, p. 156 • Johnston, 1968, p. 389 • Launois, 1978b, p. 256-257 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 105-106 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 71-72 ~ 1980b, p. 581, 588-589 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 280-281, 289 • Otte, 1995b, p. 151 • Oyidi, 1975b, p. 98 ~ 1976, p. 89 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 344 • Popov, 1989, p. 154-155 • Roy, 1969a, p. 220-221 ~ 1970, p. 703

Phonerula obliquifrons (Err. dét. d'après Roy, 1969a, p. 198, pour *D. werneriana*)

Roy, 1962, p. 111, 113, 133

Phonerula sp. 4 (Err. dét. pour *Dnopherula werneriana* selon Roy, 1969a, p. 198)

Roy, 1962, p. 111, 113, 134

Phonerula werneriana


Chapman, 1962, p. 52 • Davey *et al.*, 1959b, p. 585 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1294 • Dirsh, 1958a, p. 29 ~ 1964, p. 81 ~ 1965, p. 541-543 • Llorente, 1963, p. 53 • Roy, 1962, p. 111, 113, 133

Stauroderus wernerianus

Kirby, 1910, p. 180

Stauroderus wernerianus var. *ustulata*

Karny, 1907, p. 365



Dist.: Bénin (COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1948) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a, 1953) - Nord-Cameroun (Hollis, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969a, 1970 • *mat. exam.*) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1964, 1965 • Jago, 1968, 1996 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Risbec, 1950a • Popov, 1989)

Bien que postérieures à la révision du genre *Dnopherula* faite par Hollis (1966), les signalisations de Sierra Leone dues à Phipps sont à vérifier. L'espèce s'étend vers l'est jusqu'au Kenya et, vers le sud, jusqu'à la Zambie.

CRYPTOCATANTOPS Jago, 1984

Catantopinae

Cryptocatantops Jago, 1984, p. 305 (clé), 341

Espèce-type : *Catantops haemorrhoidalis* Krauss, 1877, p. 36

Ce genre comprend six espèces : cinq en région afrotropicale, et une en région orientale.

⊍ *Cryptocatantops haemorrhoidalis* (Krauss, 1877)

Catantops haemorrhoidalis Krauss, 1877, p. 142 [1878, p. 36, pl. 1 : f. 3, 3a, 3b]

Syntypes mâle(s), femelles, Sénégal, Dagana, NM Vienne. Lectotype mâle désigné par Dirsh (1956, p. 84).

Cit.: *Catantops haemorrhoidalis*

Chopard, 1941, p. 48 ~ 1950, p. 144 ~ 1952, p. 470 • COPR, 1982, p. 277 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 473, 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 90 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 953, 954 ~ 1965b, p. 1309 ~ 1968, p. 556, 557 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 115-116 • Diop, 1987, p. 21, 31, 33, 36-38, 41, 45 • Dirsh, 1956b, p. 84-85 ~ 1965, p. 363-365 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Duranton *et al.*, 1979, p. 319-343 • Fishpool & Popov, 1984, p. 344 • Gillon, 1983, p. 305-306 • Golding, 1934a, p. 278-282, 290, 293 ~ 1948, p. 568, 578-584 • Hergert, 1975, p. 92 • Johnsen, 1981a, p. 87 • Johnston, 1956, p. 315 ~ 1968, p. 259 • Karny, 1907, p. 321, 346 • Kirby, 1910, p. 479 • Krauss, 1877, p. 142 ~ 1878, p. 36-37 • Launois, 1978b, p. 140-141 • Launois-Luong, 1978a, p. 577-578, 582, 584 ~ 1978b, p. 237-240 ~ 1979, p. 209-226 ~ 1980b, p. 774-814 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 617-620, 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 555, 557-558 ~ 1984 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 38 • Oyidi, 1976, p. 88 • Popov, 1985c, p. 15-16, 45, 64 • Risbec, 1950a, p. 424 • Roy, 1962, p. 110, 126 ~ 1964b, p. 1180, 1191 ~ 1968, p. 11, pl. 19 ~ 1969a, p. 213 ~ 1970, p. 699 ~ 1971, p. 405 • Uvarov, 1926a, p. 447

Cryptocatantops haemorrhoidalis

Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1991a, p. 2-3 ~ 1992, p. 330 • Jago, 1984, p. 341-342 • Launois-