

CYPHOCERASTIS Karsch, 1891

Coptacrinae

Cyphocerastis Karsch, 1891, p. 181

Espèce-type : *Cyphocerastis laeta* Karsch, 1891, p. 182 [Dirsh, 1951b, p. 77]

Syn.: *Patocra* Giglio-Tos, 1907b, p. 16-17 [Ramme, 1929, p. 350, avec *Cyphocerastis*]

Kivuvia Rehn, 1914, p. 119 [Dirsh, 1951b, p. 77, avec *Cyphocerastis*]

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces présentes du Cameroun à l'ouest de l'Ouganda.


⊣ ***Cyphocerastis pulcherrima*** Ramme, 1929

Cyphocerastis pulcherrima Ramme, 1929, p. 352, fig. 60, pl. 7 : f. 8

Holotype femelle, Sierra Leone, Makump, NHM Londres

Cit.: *Cyphocerastis pulcherrima*

Chapman, 1962, p. 23 • Dirsh, 1965, p. 239, 240 • Gillon, 1974a, p. 138 • Jago, 1967b, p. 247 ~ 1968, p. 249 • Johnsen, 1981b, p. 152-153 • Johnston, 1956, p. 273 ~ 1968, p. 175 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 61 • Mestre, 1988, p. 104-105 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 134 • Ramme, 1929, p. 350-354



Dist.: Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de cette petite espèce forestière. La signalisation du Nigeria de Mestre & Chiffaud (1997) est une erreur pour *Cyphocerastis sp.*, espèce indéterminée du Cameroun (Bamenda).

CYRTACANTHACRIS Walker, 1870

Cyrtacanthacridinae

Cyrtacanthacris Walker, 1870a, p. 550

Espèce-type : *Gryllus Locusta tataricus* Linné, 1758, p. 432 [Uvarov, 1923a, p. 144]

Dirsh (1979) a mis en synonymie avec *Cyrtacanthacris* divers genres non africains (*Valanga*, *Patanga*, *Austracris*) mais aussi *Nomadacris* (voir ce genre). Ceci a été contesté et non suivi d'effet (voir aussi Jago, 1981, ainsi que Key & Jago, 1986).

Deux sous-espèces sont considérées présentes en Afrique de l'Ouest : *C. aeruginosa flavescens* Walker, 1870a, et *C. aeruginosa goldingi* Uvarov, 1941. Les citations où la distinction subsécifique n'a pas été faite sont regroupées sous *C. aeruginosa ssp.*

La sous-espèce nominative est citée de l'Afrique centrale à l'Afrique du Sud. Par ailleurs, il existe diverses signalisations douteuses de *Cyrtacanthacris tatarica*, espèce d'Afrique orientale, centrale et australe ainsi que de Madagascar.

⊣ ***Cyrtacanthacris aeruginosa flavescens*** Walker, 1870

Cyrtacanthacris flavescens Walker, 1870a, p. 561

Holotype mâle, Afrique de l'Est, NHM Londres

Syn.: *Acridium walkeri* Finot, 1907, p. 264 (nom de remplacement, jamais utilisé, pour *C. flavescens* Walker, que Finot avait considéré à tort indisponible)

[Uvarov, 1924c, p. 100, avec *Cyrtacanthacris aeruginosa flavescens*]

Cyrtacanthacris aeruginosa unicolor Uvarov, 1924c, p. 100-101. Holotype femelle, Ghana, NHM Londres

[Dirsh, 1961b, p. 392, avec *Cyrtacanthacris aeruginosa flavescens*]

Cit.: *Cyrtacanthacris aeruginosa* (*mat. exam.*)

Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61

Cyrtacanthacris aeruginosa flavescens

Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Couturier *et al.*, 1984 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 117 • Dirsh, 1961b, p. 388 ~ 1966, p. 333 ~ 1970, p. 364-366 • Jago, 1967b, p. 238, 239-250 ~ 1968, p. 277 • Jerath, 1968, p. 27-38 • Johnsen, 1970, p. 145, 146 • Johnston, 1968, p. 278 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Roy, 1964b, p. 1179, 1191-1192 ~ 2003, p. 350, 380, 387

Cyrtacanthacris aeruginosa unicolor

Chapman, 1962, p. 13, 30 • Dirsh, 1964, p. 66 • Golding, 1935, p. 265 ~ 1937, p. 9 ~ 1940b, p. 130 ~ 1946, p. 16, 21, 34 ~ 1947, p. 80 ~ 1948, p. 561-562, 578-584 • Medler, 1980, p. 39 • Uvarov, 1924c, p. 101