

ELEUTHEROTHECA Karny, 1907

Gomphocerinae

Eleutherotherca Karny, 1907, p. 360

Espèce-type : *Eleutherotherca concolor* Karny, 1907, p. 360-362, pl. 3

Syn.: *Aporisa* I. Bolívar, 1909b, p. 294 [Uvarov, 1926a, p. 434, avec *Eleutherotherca*]

Genre afrotropical comprenant six espèces.


⊔ ***Eleutherotherca concolor*** Karny, 1907

Eleutherotherca concolor Karny, 1907, p. 360-362, pl. 3 : f. 48

Type femelle (holotype selon Uvarov, 1926a), Soudan, Mongalla, NM Vienne

Cit.: *Eleutherotherca concolor*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-280 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1294-1295 • Dirsh, 1965, p. 538-539 • Johnston, 1968, p. 383 • Karny, 1907, p. 360-362, pl. 3 • Kirby, 1910, p. 150 • Lecoq, 1980b, p. 581, 588 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Roy, 1969a, p. 220



Dist.: Burkina Faso (Roy, comm. pers.) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - AO (Lecoq, 1980b)

La seule autre signalisation est celle du Soudan (type).


⊔ ***Eleutherotherca fungosa*** (I. Bolívar, 1889)

Pnorisa fungosa I. Bolívar, 1889a, p. 99

Type femelle, Angola, Quando, Caconda, détruit (incendie du muséum de Lisbonne)

Syn.: *Dnopherula laticosta* I. Bolívar, 1912b, p. 81. Syntypes mâle(s), femelle(s), Zaïre, MRAC Tervuren [Dirsh, 1966, p. 483, avec *Eleutherotherca fungosa*]

Cette synonymie est attribuée par erreur à Uvarov (1953) par Dirsh (1970, p. 559) alors qu'il en est lui-même l'auteur. Uvarov l'avait effectivement envisagée mais sans prendre position.



Cit.: *Eleutherotherca fungosa*

Chapman, 1962, p. 54 • Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Davey *et al.*, 1959b, p. 587 • Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 62 ~ 1964, p. 79 ~ 1965, p. 538-539 • Fishpool & Popov, 1984, p. 408 • Golding, 1948, p. 536 • Jago, 1967b, p. 255 ~ 1968, p. 337-338 • Johnston, 1956, p. 673 ~ 1968, p. 383 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 344

Pnorisa fungosa

Kirby, 1910, p. 151

Dist.: Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Jago, 1968) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Cette espèce est signalée, via le Zaïre, jusqu'en Afrique du Sud.