

Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1965, 1969a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (I. Bolívar, 1889b • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1959a, 1962, 1970 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988, 2001 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) • **AO** (Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b)

Nous n'avons cartographié que le matériel que nous avons examiné. En effet, la description récente de *E. diopi*, confondue généralement jusqu'ici avec *E. succineus*, rend incertaines un certain nombre de signalisations de cette dernière espèce, en particulier au Ghana et au Togo, où les deux espèces sont présentes.

E. diopi semblant circonscrite au sud-est du Ghana et au sud du Bénin et du Togo, une grande partie des signalisations des autres pays de la région, notamment ceux des zones soudaniennes, doit probablement être rapportée à *E. succineus*.

Il est cependant difficile de savoir quelle est l'extension réelle de cette espèce qui est également signalée du Cameroun, du Congo et du Zaïre. D'autres signalisations d'Angola et du Natal sont à vérifier.

EREMOGRYLLUS Krauss, 1902

Eremogryllinae

Eremogryllus Krauss, 1902b, p. 238-239

Espèce-type : *Eremogryllus hammadae* Krauss, 1902b, p. 231, 239

Syn.: *Sphingonotina* Chopard, 1943c, p. 323 [Dirsh, 1958c, p. 63, avec *Eremogryllus*]

Genre monospécifique ouest-saharien.

⊃ *Eremogryllus hammadae* Krauss, 1902

Eremogryllus hammadae Krauss, 1902b, p. 239-240, fig. 4-6

Syntypes mâles, femelles, Algérie, entre Ouargla et Ghardaïa, dépositaire ? (DORSA : 12 syntypes SMN Stuttgart)

Syn.: *Leptopternis quadriocellata* Werner, 1931, p. 201-202. Syntypes (femelles), Maroc, NM Vienne


[Uvarov & Volkonsky, 1939, p. 19, avec *Eremogryllus hammadae*]

Sphingonotina ochracea Chopard, 1943c, p. 323. Holotype femelle, Algérie, MNHN Paris

[Dirsh, 1958c, p. 63, avec *Eremogryllus hammadae*]

Cit.: *Eremogryllus hammadae*

Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 60 ~ Johnston, 1956, p. 683-684 ~ 1968, p. 362 • Kirby, 1910, p. 154 • Morales Agacino, 1945, p. 326 ~ 1948, p. 16



Dist.: "Rio de Oro" (Morales Agacino, 1945, 1948)

Les signalisations de Morales Agacino sont les seules de l'espèce dans notre zone d'étude. Jusqu'ici, cette espèce saharienne a été signalée surtout d'Afrique du Nord et de la partie septentrionale du Rio de Oro.

EUCOPTACRA I. Bolívar, 1902

Coptacrinae

Eucoptacra I. Bolívar, 1902b, p. 623, 625 (clé)

Espèce-type : *Acridium (Catantops) praemorsum* Stål, 1860, p. 330

Syn.: *Coptacroides* I. Bolívar, 1912b, p. 95 [Uvarov, 1953b, p. 47, avec *Eucoptacra*]

Genre comprenant environ vingt-cinq espèces afrotropicales et orientales. Trois sont citées pour l'Afrique de l'Ouest.