

Sjöstedt, 1928 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928) - **Sierra Leone** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928 • Stål, 1873b • Uvarov, 1926a • Walker, 1871 • *mat. exam.*) - **Tchad** (Golding, 1948 • Sjöstedt, 1928 • *mat. exam.*) - **Togo** (Dirsh, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990)

Cette espèce est également signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie, et, vers le sud, jusqu'en Angola et Zambie.

U *Gastrimargus ochraceus* Sjöstedt, 1928

Gastrimargus ochraceus Sjöstedt, 1928, p. 47, pl. 11 : f. 7

Holotype femelle, Gold Coast (= Ghana), N. Territories, Savkwalla, NHM Londres

Cit.: *Gastrimargus ochraceus*

Dirsh, 1965, p. 481, 482 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 158-159 ~ 1974b, p. 503-504, 529 • Jago, 1968, p. 304 • Johnston, 1956, p. 569 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Mestre, 1988, p. 236-237 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 363 • Ritchie, 1982, p. 243-244 (cié), 301-303, 308, 328 • Sjöstedt, 1928, p. 47



Dist.: Côte d'Ivoire (Gillon, 1971, 1974a, 1974b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ritchie, 1982 • *mat. exam.*) - Ghana (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928)

Curieusement, la seule autre signalisation de cette espèce est du Zaïre.

U *Gastrimargus sp.*

Cit.: *Gastrimargus acutangulus* (non Stål, espèce d'Afrique de l'Est et du Sud, err. dét. selon Ritchie, 1982, p. 298)

Dirsh, 1965, p. 481, 482 ~ 1966, p. 426

Oedaleus acutangulus (non Stål, idem ci-dessus)

Bolívar, 1893b, p. 175

Dist.: Côte d'Ivoire (Bolívar, 1893b • Dirsh, 1965, 1966) - Guinée (Dirsh, 1965, 1966)

G. acutangulus Stål, espèce d'Afrique de l'Est et du Sud, a une fascie alaire très développée. La seule espèce ressemblante sur ce plan en Afrique de l'Ouest, même si la fascie est moins large, est *G. africanus*. Ce serait donc a priori à cette espèce qu'il faudrait rapporter ces signalisations, mais *G. acutangulus* a la base des ailes hyaline à bleutée et non jaune. Il pourrait s'agir de spécimens de *G. africanus* venant de muer récemment et aux ailes postérieures encore peu pigmentées.

GELASTORHINUS Brunner von Wattenwyl, 1893

Acridinae

Gelastorhinus Brunner von Wattenwyl, 1893, p. 137, 157

Espèce-type : *Gelastorhinus albolineatus* Brunner von Wattenwyl, 1893, p. 158

Genre afrotropical et surtout oriental comprenant une vingtaine d'espèces.

U *Gelastorhinus africanus* Uvarov, 1941


Gelastorhinus africanus Uvarov, 1941a, p. 47-48, fig. 1-4, 14

Holotype mâle, Mali, Dia, Macina, MNHN Paris

Cit.: *Gelastorhinus africanus*

COPR, 1982, p. 386 • Comes & Riley, 1972, p. 11 • Davey *et al.*, 1959b, p. 568-569 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Descamps, 1965b, p. 1259, 1267 • Dirsh, 1965, p. 409 • Fishpool & Popov, 1984, p. 352 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 150, 169-173 ~ 1974b, p. 490-491, 520, 522, 525 • Johnston, 1956, p. 635 ~ 1968, p. 294 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 60 ~ 1980b, p. 564, 567 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 188-189 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 320 • Otte, 1995b, p. 167 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Roy, 1965, p. 627 • Uvarov, 1941a, p. 47-48, 52, 53

? *Gelastorhinus sp.* (identification sous réserve de la bonne affectation générique, *G. africanus* étant la seule espèce africaine)
Descamps, 1953, p. 604



Dist.: Bénin (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Delarze & Jungclauss-Delarze, 1987 • Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1965) - Ghana (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1941a) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953) - Sénégal (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965 • *mat. exam.*) - Togo (*mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1980b)

C'est la seule espèce d'Afrique continentale (une autre espèce à Madagascar), avec une répartition limitée à notre zone d'étude.

GEMENETA Karsch, 1892

Hemiacridinae

Gemeneta Karsch, 1892, p. 71-72

Espèce-type : *Gemeneta terrea* Karsch, 1892, p. 72

Syn.: *Escalera* I. Bolívar, 1905b, p. 231 [Dirsh, 1958d, p. 26, avec *Gemeneta*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces.

⊔ *Gemeneta terrea* Karsch, 1892

Gemeneta terrea Karsch, 1892, p. 72, fig. 1

Syntypes mâles, femelle, Cameroun, Buea, MNHU Berlin (DORSA : 3 syntypes, 2 mâles et 1 femelle)

Cit.: *Gemeneta terrea*

Dirsh, 1956c, p. 278 ~ 1965, p. 320, 321 ~ 1966, p. 98-99 ~ 1970, p. 77-78 • Johnston, 1956, p. 296 ~ 1968, p. 228 • Kirby, 1910, p. 385 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 303 • Ramme, 1929, p. 311, 484



Dist.: Nigeria (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

En dehors de ces signalisations issues de Ramme, cette espèce est signalée du Cameroun, du Congo et d'Ouganda.

GERISTA I. Bolívar, 1905

Oxyinae

Gerista I. Bolívar, 1905b, p. 233-234

Espèce-type : *Gerista dimidiata* I. Bolívar, 1905b, p. 234-235

Genre afrotropical monospécifique.

⊔ *Gerista dimidiata* I. Bolívar, 1905

Gerista dimidiata I. Bolívar, 1905b, p. 234-235

Holotype mâle, Guinée Équatoriale, Fernando Pó (= *Bioko ou Bioco*), MNCN Madrid