


Cit.: *Gerista dimidiata*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dirsh, 1958c, p. 52, 53 ~ 1965, p. 237, 238 • Hollis, 1975, p. 214, 219 • Jago, 1962, p. 148-149 • Johnston, 1956, p. 257 ~ 1968, p. 174 • Kirby, 1910, p. 407 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Otte, 1995a, p. 130 • Ramme, 1929, p. 333, 483



Dist.: Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Hollis, 1975 • Jago, 1962 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Hormis les signalisations du Nigeria, cette espèce n'est connue que par l'holotype. Les spécimens du Nigeria cités par Jago (2 mâles et 2 femelles) pourraient, selon Hollis (1975), appartenir à une espèce différente.

GLAUNINGIA Ramme, 1929

Hemiacridinae

Glauningia Ramme, 1929, p. 333-334

Espèce-type : *Glauningia macrocephala* Ramme, 1929, p. 334

Genre afrotropical monospécifique.

⊔ *Glauningia macrocephala* Ramme, 1929

Glauningia macrocephala Ramme, 1929, p. 334-335, fig. 50, 51a, pl. 7 : f. 13

Holotype femelle, Cameroun, Ossidinge, MNHU Berlin (DORSA : holotype)

Cit.: *Glauningia macrocephala*

Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 50 ~ 1965, p. 205, 206 • Golding, 1948, p. 577 • Jago, 1967b, p. 263 ~ 1968, p. 234 • Johnston, 1956, p. 235 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Otte, 1995a, p. 91 • Ramme, 1929, p. 334-335



Dist.: Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Hormis ces pays, cette espèce n'est signalée que du Cameroun.

GLYPHOCLONUS Karsch, 1896

Acridinae

Glyphoclonus Karsch, 1896, p. 249

Espèce-type : *Glyphoclonus miripennis* Karsch, 1896, p. 250

Genre afrotropical monospécifique.

⊔ *Glyphoclonus miripennis* Karsch, 1896

Glyphoclonus miripennis Karsch, 1896, p. 250, fig. 2

Type femelle, Africa orientalis, Territorium Nyassa (= Nyassa-Land = Malawi), Milangi (= Milange, en fait au Mozambique, à la frontière avec le Malawi), MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle).


Syn.: *Glyphoclonus nigrescens* Giglio-Tos, 1907b, p. 6. Holotype femelle, Congo, MRSN Turin ?
[Ramme, 1929, p. 252, avec *Glyphoclonus miripennis*]

Cit.: *Glyphoclonus miripennis*

Chapman, 1962, p. 50 • Chopard, 1958a, p. 146 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1270 ~ 1968, p. 561, 563 • Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 53 ~ 1963b, p. 215 ~ 1964, p. 68 ~ 1965, p. 413, 414 ~ 1966, p. 376 ~ 1970, p. 419-420 • Fishpool & Popov, 1984, p. 399 • Golding, 1948, p. 529 • Jago, 1967b, p. 252 ~ 1968, p. 328 • Johnsen, 1970, p. 149, 150-151 • Johnston, 1956, p. 649-650 ~ 1968, p. 297 • Kirby, 1910, p. 98 • Lecoq, 1980b, p. 564, 567 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 55, 62 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 182-183 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 320 • Otte, 1995b, p. 279 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 335 • Ramme, 1929, p. 252, 253, 482, 484 • Roy, 1969a, p. 215 ~ 2003, p. 358, 381, 388 • Sjöstedt, 1931b, p. 6

Glyphoclonus miripennis forma *nigrescens*

Ramme, 1929, p. 252-253, 482 • Sjöstedt, 1931b, p. 6



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Jago, 1968 • Sjöstedt, 1931b) - Côte d'Ivoire (Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Chopard, 1958a • Dirsh, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • *mat. exam.*) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Dirsh, 1964, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Lecoq, 1980b • Ramme, 1929)

Cette espèce est signalée également du Congo, du Zaïre, d'Angola, du Ruanda et du Malawi.

GONISTA I. Bolívar, 1898

Acridinae

Gonista I. Bolívar, 1898b, p. 27

Espèce-type : *Gonista antennata* I. Bolívar, 1898b, p. 93

Syn.: *Carcharacris* I. Bolívar, 1914a, p. 104, 105 [Willemse, 1951, p. 108, avec *Gonista*]

Genre afrotropical, paléarctique et oriental comprenant une dizaine d'espèces.


⊂ *Gonista occidentalis* Descamps, 1965

Gonista occidentalis Descamps, 1965b, p. 1267, fig. 32-38

Holotype mâle, Mali, Kléla, MNHN Paris

Cit.: *Gonista occidentalis*

Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1965b, p. 1259, 1267-1270 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Johnston, 1968, p. 294 • Lecoq, 1977, p. 7, 10 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 65 ~ 1980b, p. 564-565 ~ 1984 • Mestre, 1988, p. 188-189 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 320 • Otte, 1995b, p. 170



Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1980b)

L'espèce n'a été signalée jusqu'ici que de notre zone d'étude.