

**HOLOPERCNA** Karsch, 1891

Acridinae

*Holopercna* Karsch, 1891, p. 176-177

Espèce-type : *Holopercna coelestis* Karsch, 1891, p. 177

Genre afrotropical monospécifique. Jago (1983b, p. 80) a mis le genre asiatique *Sikkimiana* Uvarov, 1940, en synonymie avec *Holopercna*, mais cette synonymie reste à confirmer.

⊂ ***Holopercna gerstaeckeri*** (I. Bolívar, 1890)

*Duronia gerstaeckeri* I. Bolívar, 1890b, p. 311

Syntypes mâle(s) femelle(s), "Ashanti" et Gabon. Dirsh (1970) signale curieusement un lectotype mâle du Cameroun.

**Syn.:** *Holopercna coelestis* Karsch, 1891, p. 177-178. Syntypes mâles, femelles, Cameroun, ? MNHU Berlin (DORSA : non recensé) [I. Bolívar, 1905b, p. 220, avec *Holopercna gerstaeckeri*]

**Cit.:** *Duronia gerstaeckeri*  
I. Bolívar, 1890b, p. 311

*Holopercna gerstaeckeri*

Baccetti, 2004, p. 30 • Chapman, 1961, p. 264, 275, 277 ~ 1962, p. 15, 45-46, 62 • Chopard, 1958a, p. 148 • Cornes & Riley, 1972, p. 12 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 54 ~ 1963b, p. 218 ~ 1965, p. 426, 427 ~ 1970, p. 430-431 • Gillon, 1974a, p. 153 ~ 1974b, p. 494-495, 525 • Golding, 1940b, p. 130 ~ 1948, p. 533, 578-584 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 251 ~ 1968, p. 312 • Johnsen, 1970, p. 150, 152, 153 ~ 1981b, p. 154 • Johnston, 1956, p. 611 ~ 1968, p. 301 • Kirby, 1910, p. 143 • Lamotte & Roy, 1998, p. 100 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62 • Medler, 1980, p. 40 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 320 • Otte, 1995b, p. 284 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 336 ~ 1971 • Roy, 1960, p. 202 ~ 1969b, p. 55 ~ 2003, p. 366, 381, 388



**Dist.:** Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1970 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Roy, 1969b • *mat. exam.*) - Ghana (I. Bolívar, 1890b • Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1960, 2003 • *mat. exam.*) - Liberia (Jago, 1968 • Johnsen, 1970, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Chopard, 1958a • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1940b, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • *mat. exam.*) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Jago, 1964a)

Cette espèce, caractéristique des milieux ouverts (clairières, bords de piste...) de forêt, est citée du Cameroun jusqu'au Zaïre.

**HOMOXYRRHEPES** Uvarov, 1926

Tropidopolinae

*Homoxyrrhopes* Uvarov, 1926a, p. 443-444

Espèce-type : *Heteracris punctipennis* Walker, 1870b, p. 659

Ce genre comprend deux espèces afrotropicales, mais la validité de l'une d'entre elles, *H. incerta* Salfi, 1955, est à confirmer.

⊂ ***Homoxyrrhopes punctipennis*** (Walker, 1870)

*Heteracris punctipennis* Walker, 1870b, p. 656 (clé), 659

Holotype femelle selon Walker, en fait mâle selon Uvarov (1925d, p. 289), Angola, NHM Londres

**Syn.:** *Oxyrrhopes elegans* I. Bolívar, 1882, p. 116. Syntypes femelles, Angola, détruits (incendie du Muséum de Lisbonne) [Uvarov, 1925d, p. 289, avec *Oxyrrhopes punctipennis*]

**Cit.:** *Heteracris punctipennis*  
Kirby, 1910, p. 555

*Homoxyrrhopes puncticollis* (sic)

Descamps, 1954, p. 179 • Golding, 1948, p. 580

*Homoxyrrhopes punctipennis*


Chapman, 1962, p. 20 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • COPR, 1982, p. 201-202 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 (*Homoxyrrhipes*!) • Davey *et al.*, 1959a, p. 85-86 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1953, p. 602, 603, 605 ~ 1954, p. 179 ~ 1965a, p. 942 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1968, p. 544, 545 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 110 • Dirsh, 1956 c, pl. 37 ~ 1964, p. 53 ~ 1965, p. 224, 225 ~ 1966, p. 137-138 ~ 1970, p. 163-165 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 332 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 136, 173 ~ 1974b, p. 466-468, 526 • Golding, 1948, p. 557 • Jago, 1967b, p. 249 ~ 1968, p. 236-237 • Johnsen, 1970, p. 132 • Johnston, 1956, p. 241-242 ~ 1968, p. 167 • Launois, 1978b, p. 94-95 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 27 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 653, 655, 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 545, 547 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 57-58, 60 • Mallamaire, 1948, p. 632-633 • Medler, 1980, p. 40 • Mestre, 1988, p. 90-91 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 105 • Oyidi, 1976, p. 89 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1971, p. 71-97 • Risbec, 1950a, p. 120 + fig. 47 • Risbec & Mallamaire, 1949, p. 73 • Roy, 1962, p. 125 ~ 1965, p. 619-620 ~ 1970, p. 697 ~ 2003, p. 328, 379, 386 • Shah *et al.*, 1998, p. 451-459 • Uvarov, 1926a, p. 444

*Oxyrrhopes elegans*

I. Bolívar, 1894, p. clxiii • Karny, 1915, p. 138 • Karsch, 1893, p. 112 (clé), 113

*Oxyrrhopes punctipennis*

Uvarov, 1925d, p. 289 • Vayssière & Mimeur, 1924, p. 189 ~ 1925, p. 212, pl. 3 : f. 2 ~ 1926, p. 10-11, pl. 5 : f. 2



**Dist.:** Bénin (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Shah *et al.*, 1998 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (COPR, 1982 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a • *mat. exam.*) - Guinée (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Mali (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Vayssière & Mimeur, 1924 • *mat. exam.*) - Mauritanie (Mestre, 1988) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953, 1954 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950a • Roy, 1962, 1965, 1970 • *mat. exam.*) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970 • Uvarov, 1926a) - "Soudan français" (Vayssière & Mimeur, 1925, 1926) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (I. Bolívar, 1894 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Dirsh, 1964 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Mallamaire, 1948 • Risbec, 1950a • Risbec & Mallamaire, 1949 • Vayssière & Mimeur, 1925, 1926)

Cette espèce est citée également du Congo, Zaïre, Ouganda, Malawi, Zambie et Tanzanie.

**HUMBE** I. Bolívar, 1881

Oedipodinae

*Humbe* I. Bolívar, 1881b, p. 117

Espèce-type : *Humbe pachytyloïde* I. Bolívar, 1881b, p. 117-118

Syn.: *Humbella* Saussure, 1884, p. 50 (clé), 105, 108 [Karsch, 1900, p. 276, avec *Humbe*]

Genre afrotropical monospécifique. Il a été revu par Dirsh (1961a).

⊂ *Humbe tenuicornis* (Schaum, 1853)

*Pachytylus tenuicornis* Schaum, 1853, p. 779

Type (femelle selon Dirsh, 1961a, p. 315), Mozambique, MNHU Berlin (DORSA : holotype mâle)

Syn.: *Pachytylus (Oedaleus) punctifrons* Stål, 1876b, p. 50. Type mâle, Namibie, NR Stockholm [Saussure, 1884, p. 106, avec *Humbella tenuicornis*]