

Cit.: *Arcyptera coerulipes*
Karny, 1915, p. 135
Kraussella coerulipes
Dirsh, 1965, p. 527-528 • Fishpool & Popov, 1984, p. 378 • Johnston, 1956, p. 683 • Mestre, 1988, p. 270-271 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325 • Otte, 1995b, p. 172 • Ramme, 1929, p. 276, 483



Dist.: Bénin (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Guinée (Dirsh, 1965 • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - Mali (*mat. exam.*) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Fishpool & Popov, 1984)

La répartition de cette espèce, peu signalée, semble limitée à notre zone d'étude.

LEIONOTACRIS Jago, 1996

Gomphocerinae

Leionotacris Jago, 1996a, p. 86
Espèce-type : *Dnopherula gilloni* Jago, 1996a

Genre comportant deux espèces selon Jago (1996), l'une afrotropicale, l'autre d'Inde.

⊂ *Leionotacris gilloni* (Hollis, 1966)

Dnopherula gilloni Hollis, 1966, p. 317-318, fig. 20, 102-106
Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Séguéla, NHM Londres


Syn.: *Dnopherula leionota* Jago, 1966b, p. 357-359. Holotype mâle, Ghana, NHM Londres
[Jago, 1967b, p. 266, avec *Dnopherula gilloni*]

Cit.: *Dnopherula leionota*
Jago, 1966b, p. 357-359, 366-367
Dnopherula gilloni

Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 382 • Hollis, 1966, p. 278, 317-318 • Jago, 1967b, p. 258 ~ 1968, p. 337 • Johnston, 1968, p. 387 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 71 ~ 1980b, p. 581, 588-589 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 280-281, 289 • Otte, 1995b, p. 146 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Roy, 1969a, p. 220 ~ 1970, p. 702

Leionotacris gilloni

Jago, 1996a, p. 77, 87 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1966b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a, 1970) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1966b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1980b)

L'espèce est également signalée d'Ouganda.