

LEPTACRIS Walker, 1870

Hemiacridinae

Leptacris Walker, 1870b, p. 607 (clé), 676

Espèce-type : *Leptacris filiformis* Walker, 1870b, p. 676

Syn.: *Ischnacrida* Stål, 1873a, p. 53 [Uvarov, 1944, p. 18, avec *Leptacris*]

Ischnacrida Stål, 1873b, p. 44, 87 [Uvarov, 1944, p. 19, avec *Leptacris*]

Capellea I. Bolívar, 1901, p. 616 [Kirby, 1910, p. 404, avec *Leptacris*]

Rhamphacrida Karsch, 1893, p. 112-113 [Dirsh, 1958d, p. 239, avec *Leptacris*]

Ce genre africain et asiatique a été revu par Grunshaw (1996), invalidant certaines synonymies faites par Dirsh (1958d) et reconnaissant quatre espèces. Pour notre zone, seules seraient présentes *Leptacris kraussii* et *L. monteiroi monteiroi*.

Selon cet auteur, *L. monteiroi* englobe trois sous-espèces dont une asiatique. Celle qui nous concerne est *L. monteiroi monteiroi*, d'Afrique sub-saharienne, *L. monteiroi hova* étant la sous-espèce malgache.

⊃ ***Leptacris kraussii*** (I. Bolívar, 1890)

Ischnacrida kraussii I. Bolívar, 1890a, p. 215

Syntype(s) femelle(s), Angola, Duque de Bragança, détruits (incendie du Muséum de Lisbonne)

Syn.: *Ramphacrida rosea* Ramme, 1929, p. 339. Holotype mâle, Cameroun, MNHU Berlin (DORSA : holotype) [Dirsh, 1966, p. 124, avec *Leptacris kraussii*]

Ramphacrida coeruleascens Miller, 1932, p. 38-39, fig. 19. Holotype mâle, Éthiopie, NHM Londres [Dirsh, 1966, p. 124, avec *Leptacris kraussii*]

Cit.: *Ischnacrida kraussii*

Karny, 1907, p. 298, 299

Leptacris kraussi (ou *kraussii*)


Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1965a, p. 939-940 • Dirsh, 1963b, p. 209 ~ 1964, p. 52 ~ 1965, p. 209-210 ~ 1966, p. 121, 124-125 ~ 1970, p. 106, 109-110 • Fishpool & Popov, 1984, p. 388 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 133, 170 ~ 1974b, p. 461-463, 526 • Grunshaw, 1996, p. 137-139 • Jago, 1967b, p. 248 ~ 1968, p. 231-232 • Johnsen, 1971, p. 18-21 • Johnston, 1968, p. 154 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 541-543 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Medler, 1980, p. 40 • Mestre, 1988, p. 72-73 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 311 • Otte, 1995a, p. 85 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 323 • Popov, 1989, p. 34-35 • Roy, 1967, p. 1558 ~ 1969a, p. 196-207, 209, 221-232 ~ 2003, p. 325-326, 379, 386

Rhamphacrida kraussi (ou *kraussii*)

Chapman, 1962, p. 35 • Chopard, 1958a, p. 132 • Golding, 1948, p. 558 • Johnston, 1956, p. 229 • Karsch, 1893, p. 115 • Kirby, 1910, p. 406 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, p. 119

Ramphacrida rosea (erreur pour *Rhamphacrida*)

Ramme, 1929, p. 339



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1996 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b • Grunshaw, 1996 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Mali** (Descamps, 1965a • Grunshaw, 1996 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Chopard, 1958a • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - **Sénégal** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1967, 1969a) - **Sierra Leone** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Tchad** (Grunshaw, 1996) - **Togo** (Karsch, 1893 • Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce est présente vers l'est jusqu'en Éthiopie et, au sud, jusqu'en Tanzanie.



⊃ ***Leptacris monteiroi monteiroi*** (I. Bolívar, 1890)

Ischnacrida monteiroi I. Bolívar, 1890b, p. 214-215, pl. 1 : f. 6

Syntypes mâle(s), femelle(s), Angola, Duque de Braganza, détruits (incendie du Muséum de Lisbonne)

Syn.: *Ischnacrida testacea* Karny, 1907, p. 299. Holotype mâle, Angola, détruit (incendie du Muséum de Lisbonne)
 [Dirsh, 1966, p. 123, avec *Leptacris monteiroi*]
Ischnacrida violacea Karny, 1907, p. 301. Holotype mâle, Soudan, NM, Vienne
 [Grunshaw, 1996, p. 140, avec *Leptacris monteiroi monteiroi*]
Ischnacrida elegans Chopard, 1921, p. 57-60. Holotype mâle, Kenya, MNHN Paris
 [Dirsh, 1966, p. 123, avec *Leptacris monteiroi*]

Cit.: *Ischnacrida monteiroi*
 Karny, 1907, p. 298, 299 • Karsch, 1893, p. 114 • Kirby, 1910, p. 405
Ischnacrida testacea
 Karny, 1907, p. 298, 299
Ischnacrida violacea
 Karny, 1907, p. 298-302 • Sjöstedt, 1931b, p. 30
Leptacris monteiroi
 Chopard, 1958a, p. 132 • Dirsh, 1964, p. 51-52 ~ 1965, p. 209, 210 ~ 1966, p. 121 (clé), 123-124 ~ 1970, p. 106 (clé), 108-109 • Golding, 1948, p. 558 • Jago, 1968, p. 231-232 • Johnsen, 1971, p. 18-21 • Johnston, 1956, p. 226-227 ~ 1968, p. 154 • Medler, 1980, p. 40 • Mestre, 1988, p. 291 • Otte, 1995a, p. 85-86 • Uvarov, 1926a, p. 444
Leptacris monteiroi monteiroi
 Grunshaw, 1996, p. 140-141 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 311 • Roy, 2003, p. 326, 379, 386, fig. 8
Leptacris violacea
 Chapman, 1962, p. 35 • Comes & Riley, 1972, p. 7 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 108-109 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 939, 940 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1968, p. 543 • Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 50 ~ 1964, p. 52 ~ 1965, p. 209, 210 ~ 1966, p. 121 (clé), 122 ~ 1970, p. 106 (clé), 107-108 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 330 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 134, 170 ~ 1974b, p. 462, 464, 517-518, 526 • Golding, 1948, p. 558 • Jago, 1967b, p. 248 ~ 1968, p. 231 • Johnston, 1956, p. 227 ~ 1968, p. 155 • Launois, 1978b, p. 88-89 • Lecoq, 1977, p. 4 ~ 1978a, p. 623-625, 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 541-543 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Medler, 1980, p. 40 • Mestre, 1988, p. 72-73 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 122 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 323 • Popov, 1989, p. 34-35 • Sjöstedt, 1931b, p. 30



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Côte d'Ivoire** (Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **"French Sudan"** (Dirsh, 1970 • Golding, 1948) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Mali** (Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Dirsh, 1966 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Comes & Riley, 1972 • Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Phipps, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Dirsh, 1964 • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce est présente vers l'est jusqu'en Éthiopie, et descend, via la Tanzanie et le Mozambique, jusqu'en Afrique du Sud.