

**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Chopard, 1958a • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b, 1976, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1984, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre & Laugé, 1983 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1966, 1970 • Hollis, 1965b • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Liberia (Dirsh, 1966, 1970 • Hollis, 1965b) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969a) - Sierra Leone (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Stâl, 1873b • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (COPR, 1982 • Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie et vers le sud jusqu'en Angola et Zambie.

**MADIMBANIA** Dirsh, 1953

Catantopinae

*Madimbania* Dirsh, 1953, p. 234

Espèce-type : *Allotriusia madimbana* Giglio-Tos, 1907b, p. 14

Syn.: *Pyrganthermus* Dirsh, 1953, p. 236 [Dirsh, 1966, p. 239, avec *Madimbania*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces selon Jago (1984).

⊃ ***Madimbania cephalica*** (I. Bolívar, 1889)

*Anthermus cephalicus* I. Bolívar, 1889b, p. 157

Holotype femelle, Angola, Caconda, détruit (incendie muséum de Lisbonne)

**Syn.:** *Anthermus acutifrons* Miller, 1929, p. 82-83, pl. 11 : f. 63, 64. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

*Anthermus uamicus* Ramme, 1929, p. 455. Holotype mâle, Centrafrique, MNHU Berlin (DORSA : + 4 paratypes femelles)

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

*Anthermus longiceps* Ramme, 1929, p. 457, pl. 14 : f. 8. Type femelle, sans précision, MNHU Berlin ? (DORSA : non recensé)

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

**Cit.:** *Anthermus cephalicus*


Kirby, 1910, p. 443

*Madimbania cephalica* (-us)

Dirsh, 1966, p. 241-242 • Fishpool & Popov, 1984, p. 395 • Jago, 1984, p. 358-359 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 310

*Pyrganthermus cephalicus*

Chapman, 1962, p. 29 • Dirsh, 1965, p. 348 • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236-237 • Jago, 1968, p. 267-268 • Johnston, 1968, p. 244



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Mestre & Chiffaud, 1997)  
L'aire de répartition vers l'est s'étend jusqu'à l'Éthiopie, et vers le sud jusqu'à l'Angola et à la Tanzanie.

**MASTACHOPARDIA** Descamps, 1964

Euschmidtinae

*Mastachopardia* Descamps, 1964, p. 30, 63-64

Espèce-type : *Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964, p. 64

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces selon Descamps (1973a), dont deux endémiques à notre zone d'étude.

⊂ ***Mastachopardia jagoi*** Descamps, 1964

*Mastachopardia jagoi* Descamps, 1964, p. 65-68, fig. 64b-64g (p. 66)

Holotype mâle, Liberia, N.E. of Bomi Hills, mining area N. of Monrovia, NHM Londres

**Cit.:** *Mastachopardia jagoi*

Descamps, 1964, p. 65-68 ~ 1967, p. 307 ~ 1973a, p. 833 • Johnston, 1968, p. 7 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 65



**Dist.:** Liberia (Descamps, 1964, 1973a • Mestre & Chiffaud, 1997)

C'est la seule signalisation de cette espèce, connue uniquement par le mâle.

⊂ ***Mastachopardia zougueana*** Descamps, 1964

*Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964, p. 64-65, fig. 62-64 (p. 61) et 64a (p. 65)

Holotype femelle, Guinée, Monts Nimba (camp Zougoué), MNHN Paris

**Cit.:** *Euschmidtia* sp.

Dirsh, 1963b, p. 207

*Mastachopardia zougueana*

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1964, p. 64-65 ~ 1967, p. 308 ~ 1973a, p. 833, 834 ~ 1973b, p. 225 • Johnston, 1968, p. 7 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60 • Mestre, 1988, p. 38-39 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 65 • Roy, 2003, 314-315, 385, fig. 1



**Dist.:** Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Descamps, 1964 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Guinée (Descamps, 1964, 1973a • Dirsh, 1963b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - AO (Mestre, 1988)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**MAURA** Stål, 1873

Pyrgomorphae

*Maura* Stål, 1873a, p. 51

Espèce-type : *Petasia rubro-ornata* Stål, 1855, p. 352

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Kevan (1977).