


⊃ *Parakinkalidia rothi* Donskoff, 1986

Parakinkalidia rothi Donskoff, 1986, p. 212-214, fig. 47, 48-63
Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Cit.: *Parakinkalidia rothi*

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Donskoff, 1986, p. 212-214 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118



Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997)

C'est la seule signalisation de cette espèce forestière.

PARAPETASIA I. Bolívar, 1884

Pyrgomorphinae

Parapetasia I. Bolívar, 1884a, p. 25, et 1884b, p. 484, 498
Espèce-type : *Parapetasia femorata* I. Bolívar, 1884b, p. 485

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ *Parapetasia femorata* I. Bolívar, 1884

Parapetasia femorata I. Bolívar, 1884b, p. 485, 498, 500
Holotype femelle, Gabon, NM Vienne

Syn.: *Parapetasia (Parapetasia) calabarica* Rehn, 1953, p. 121. Holotype femelle, Nigeria, ANS Philadelphie
[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 229, avec *Parapetasia femorata*]
Parapetasia rammei Sjöstedt, 1923d, p. 10-11, pl. 1. Holotype femelle, Cameroun, NR Stockholm
[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 229, avec *Parapetasia femorata*]

Kevan, Akbar & Chang (1974, p. 229) n'établissent pas une synonymie formelle mais indiquent les deux espèces ci-dessus comme "almost undoubtedly mere forms of *P. femorata*". Kevan (1977, p. 318) les liste comme synonymes en indiquant cette publication comme source.

Cit.: *Parapetasia (Parapetasia) calabarica*

Johnston, 1956, p. 131 • Rehn, 1953, p. 121, 122-124

Parapetasia calabarica


Cornes & Riley, 1972, p. 6 • Dirsh, 1965, p. 124, 125 • Johnston, 1968, p. 95 • Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, 229 •
Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115

Parapetasia (Parapetasia) femorata

Johnston, 1956, p. 131

Parapetasia femorata

Cornes & Riley, 1972, p. 6 • Dirsh, 1965, p. 124, 125 • Johnston, 1968, p. 95 • Kevan, 1977, p. 318 • Kevan, Akbar &
Chang, 1974, p. 223, 227, 229 • Kirby, 1910, p. 308 • Medler, 1980, p. 36 • Otte, 1994b, p. 71-72



Dist.: Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Kevan, 1977 • Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 223, 227, 229 • Medler, 1980 •
Mestre & Chiffaud, 1997 • Rehn, 1953).

Cette espèce est également connue du Cameroun et du Gabon.