

**PARAPROPACRIS** Ramme, 1929

Catantopinae

*Parapropacris* Ramme, 1929, p. 402

Espèce-type : *Stenocroblytus rhodopterus* Uvarov, 1923, p. 684

Syn.: *Anacatantops* Dirsh, 1953, p. 232 [Jago, 1984, p. 351, avec *Parapropacris*]

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Jago (1984).

⊂ ***Parapropacris notata*** (Karsch, 1891)

*Catantops notatus* Karsch, 1891, p. 190

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station et Kribi, MNHU Berlin. Lectotype mâle, désigné par Jago (1984, p. 351). Cependant, Dirsh (1970, p. 298) parle aussi d'un lectotype mâle. (DORSA : + 3 paralectotypes)

**Syn.:** *Catantops karschi* Karny, 1907, p. 316, 337. Lectotype femelle (Dirsh, 1956a), Cameroun, NM Vienne [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

*Catantops minimus* Karny, 1907, p. 320, 344-345. Syntypes femelles, Soudan, NM Vienne [Sjöstedt, 1931a, p. 30-31, avec *Catantops notatus*]

*Catantops kraussi* Karny, 1907, p. 321, 345-346. Syntypes mâle(s), femelles, Ghana, NM Vienne [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]


*Catantops bipunctatus* I. Bolívar, 1908c, p. 123. Syntypes mâles, femelles, Zaïre, MNCN Madrid [Ramme, 1929, p. 436, avec *Anacatantops notatus bipunctatus*]

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

*Catantops simplex* Uvarov, 1923c, p. 687-689. Holotype mâle, Ouganda, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

*Catantops frater* Ramme, 1929, p. 437-438. Holotype mâle, Zaïre, MRAC Tervuren [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232, avec *Anacatantops notatus*]

Nous n'avons pas retenu la synonymie faite par Descamps & Donskoff (1968, p. 1215) faisant de *Catantopsilus angulatus* Descamps, 1965, un synonyme de cette espèce. Ainsi qu'indiqué dans Mestre & Chiffaud (1997), *C. angulatus*, dont nous avons examiné le type au Muséum de Paris, est clairement une espèce différente appartenant au genre *Catantopsilus*.



**Cit.:** *Anacatantops notatus*

Chapman, 1962, p. 12, 28 • Chopard, 1958a, p. 136 • COPR, 1982, p. 272-273 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Davey *et al.*, 1959a, p. 92 • Descamps, 1965a, p. 953 ~ 1968, p. 556, 558 • Dirsh, 1956a, p. 30-31 ~ 1956c, p. 275 ~ 1963b, p. 213 ~ 1964, p. 64 ~ 1965, p. 360, 361 ~ 1966, p. 267-269 ~ 1970, p. 296-299 • Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 232 • Fishpool & Popov, 1984, p. 395 • Gillon, 1974a, p. 146 ~ 1974b, p. 483, 528 • Jago, 1964a, p. 198 ~ 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 263-264 • Johnsen, 1971, p. 36, 37, 38 • Johnston, 1956, p. 328-329 ~ 1968, p. 253-254 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 58 ~ 1980b, p. 555, 557 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 38 • Oyidi, 1976, p. 88 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1971 • Roy, 1969a, p. 213 • Vesey-Fitzgerald, p. 356

*Catantops kraussi*

Karny, 1907, p. 321, 345-346 ~ 1915, p. 140

*Catantops minimus*

Golding, 1946, p. 8, 34 ~ p. 1948, p. 469 • Jacques-Félix, 1935, p. 42-43, fig. • Uvarov, 1926a, p. 449

*Catantops notatus*

Descamps, 1953, p. 605 • Golding, 1948, p. 469 • Karny, 1907, p. 321, 346 • Kirby, 1910, p. 480 • Ramme, 1929, p. 436-437, 484 • Sjöstedt, 1931a, p. 30-31 ~ 1931b, p. 30

*Catantops simplex*


Golding, 1940b, p. 130 ~ 1946, p. 8, 34 ~ 1948, p. 569, 578-584

*Parapropacris notata (-us)*

Baccetti, 2004, p. 29 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Jago, 1984, p. 350-352 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Mestre, 1988, p. 146-147 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 317 • Otte, 1995a, p. 324-325 • Phipps, 1970, p. 330

**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Jago, 1967b, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • Ramme, 1929 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Golding, 1948 • Jacques-Félix, 1935 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) -

**Liberia** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1940b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1968, 1970, 1971) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Kamy, 1907 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1931a • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)



L'espèce s'étend vers l'est jusqu'au Kenya et à la Tanzanie.

## PARGA Walker, 1870

Acridinae

*Parga* Walker, 1870a, p. 504-505

Espèce-type : *Amycus xanthopterus* Stål, 1855, p. 353 [Burr, 1902, p. 185, pour le genre *Amycus*]

Syn.: *Amycus* Stål, 1855, p. 353 (nom. praeoc.) [I. Bolívar, 1906, p. 391, *Parga*, nom. subst.]

Ce genre afrotropical est très confus et une révision s'impose. De nombreuses espèces peu caractérisées ont été décrites par Sjöstedt (1931b), dont trois de la même localité du Burkina Faso, et beaucoup d'entre elles ne sont certainement pas valides.

Hormis *Parga lamottei*, nouvelle espèce décrite en 1947 de Guinée, la plupart des auteurs n'ont, après 1931, cité que *Parga cyanoptera* pour l'Afrique de l'Ouest, et les diverses espèces ou formes décrites par Sjöstedt n'ont presque jamais été signalées.

### ⊔ *Parga albovittata* Sjöstedt, 1931

*Parga albovittata* Sjöstedt, 1931a, p. 62, pl. 1 : f. 1

Syntypes mâle(s), femelle(s), Burkina Faso, Pundu, NR Stockholm

**Cit.:** *Parga albovittata*

Dirsh, 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 636 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298 • Sjöstedt, 1931a, p. 62 ~ 1931b, p. 17, 19, 20



**Dist.:** Burkina Faso (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931a,b)

C'est la seule signalisation de l'espèce.

### ⊔ *Parga bissauensis* Sjöstedt, 1931

*Parga bissauensis* Sjöstedt, 1931b, p. 13, fig. 3

Holotype femelle, Guinée-Bissau, Bissau, MNHU Berlin (DORSA : holotype)

**Cit.:** *Parga bissauensis*

Dirsh, 1965, p. 404 • Johnston, 1956, p. 636 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 298 • Sjöstedt, 1931b, p. 9, 13, 18

**Dist.:** Guinée-Bissau (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b).