



C'est la seule signalisation de l'espèce.

⊔ *Parga sp.*

Cit.: *Parga sp.*

Davey *et al.*, 1959b, p. 569 • Johnsen, 1981a, p. 90

Dist.: **Gambie** (Johnsen, 1981a) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b)

PETAMELLA Giglio-Tos, 1907

Tropidopolinae

Petamella Giglio-Tos, 1907b, p. 11-12

Espèce-type : *Petamella fallax* Giglio-Tos, 1907b, p. 12

Syn.: *Anoxyrrhopes* Uvarov, 1925c, p. 180 [Dirsh, 1958d, p. 242, avec *Petamella*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces.

⊔ *Petamella prosternalis* (Karny, 1907)

Oxyrrhopes prosternalis Karny, 1907, p. 297-298

Syntypes mâle(s) et femelle(s), Soudan, diverses localités, NM Vienne

Syn.: *Anoxyrrhopes natalensis* Uvarov, 1925c, p. 181-182, fig. 21. Holotype femelle, Afrique du Sud, NHM Londres [Dirsh, 1966, p. 135, avec *P. prosternalis*]

Cit.: *Anoxyrrhopes prosternalis*


Chapman, 1962, p. 19 • Davey *et al.*, 1959a, p. 86 • Descamps, 1953, p. 605, 611 • Dirsh, 1956c, p. 276, pl. 37 ~ 1958d, p. 242 • Johnston, 1956, p. 240-241

Oxyrrhopes prosternalis

Karny, 1907, p. 297, 298 ~ 1915, p. 138 • Kirby, 1910, p. 402 • Sjöstedt, 1931b, p. 29

Petamella prosternalis

Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1965a, p. 942 ~ 1968, p. 544, 545 • Dirsh, 1964, p. 54 ~ 1965, p. 223, 224 ~ 1970, p. 161-162 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 390 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 136, 169-173 ~ 1974b, p. 466-467, 521, 526 ~ 1983, p. 301 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 237 • Johnston, 1968, p. 166 • Launois, 1978b, p. 96-97 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 53-54 ~ 1980b, p. 545-547 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 60 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 92-93 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 106 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 324 • Roy, 1969a, p. 196-207, 210, 221-232



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988

• Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Dirsh, 1964 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce a été également citée du Soudan, Zaïre, Angola, Zambie, Tanzanie et Afrique du Sud.

PHYLLOCERCUS Uvarov, 1941

Eyrepreocnemidinae

Phyllocercus Uvarov, 1941a, p. 68

Espèce-type : *Phyllocercus bicoloripes* Uvarov, 1941a, p. 68-69

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Phyllocercus bicoloripes*** Uvarov, 1941

Phyllocercus bicoloripes Uvarov, 1941a, p. 68-69, fig. 30, 31 (p. 66)

Holotype mâle, Mali, Diafarabé, NHM Londres

Cit.: *Phyllocercus bicoloripes*

COPR, 1982, p. 260 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959a, p. 103 • Descamps, 1953, p. 602, 603, 605, 608 ~ 1954, p. 179 ~ 1965a, p. 951, 952 ~ 1965b, p. 1309 ~ 1968, p. 549, 553 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 112 • Dirsh, 1956c, p. 277, pl. 40 ~ 1965, p. 299 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 340 • Golding, 1948, p. 576-577, 578-584 • Johnston, 1956, p. 411 ~ 1968, p. 220 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 243 ~ 1980a, p. 55-56 ~ 1980b, p. 551, 553 ~ 1984 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 126-127 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre *et al.*, 2001, p. 315 • Otte, 1995a, p. 201 • Popov, 1985c, p. 50-51 • Uvarov, 1941a, p. 66, 68-69



Dist.: **Bénin** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "**French Sudan**" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Ghana** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1941a • *mat. exam.*) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1941a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953, 1954 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (COPR, 1982 • Mallamaire, 1948 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1985c)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

PHYMATEUS Thunberg, 1815

Pyrgomorphae

Phymateus Thunberg, 1815b, p. 214, 216-217

Espèce-type : *Gryllus Locusta morbillosus* Linné, 1758, p. 431 [Chenu, 1859, p. 76, et CINZ, 1971, p. 88, 89]

Genre afrotropical, incluant Madagascar, d'environ une douzaine d'espèces. Dirsh (1958c) avait mis *Maphyteus* l. Bolívar, 1904, en synonymie avec *Phymateus*, mais Kevan (1977) le conserve comme sous-genre valide.

⊃ ***Phymateus cinctus*** (Fabricius, 1793)

Gryllus cinctus Fabricius, 1793, p. 50-51

Holotype femelle, Sénégal, perdu selon Kevan (1977). Néotype (= holotype ou néotype de *Gryllus Locusta squarrosus* Stoll, 1813, non Linné, 1771), NNM Leyde, indiqué (ou désigné ?) par Kevan (1977, p. 249, 250)