

**PHYMEURUS** Giglio-Tos, 1907

Euryphyminae

*Phymeurus* Giglio-Tos, 1907b, p. 27

Espèce-type : *Phymeurus pardalis* Giglio-Tos, 1907b, p. 28

Syn.: *Platypymus* Uvarov, 1922e, p. 119, 146 [Uvarov, 1954a, p. 146, avec *Phymeurus*]

Genre afrotropical de près d'une vingtaine d'espèces dont deux endémiques à notre zone d'étude.


□ ***Phymeurus lomaensis*** Roy, 1964

*Phymeurus lomaensis* Roy, 1964a, p. 1156-1162, fig. 1-6

Holotype mâle, allotype femelle, Sierra Leone, Mont Bintumane (Monts Loma), MNHN Paris

Cit.: *Phymeurus lomaensis*

Dirsh, 1970, p. 178 (clé) • Jaeger et al., 1966, p. 1183 • Johnston, 1968 p. 197 • Mason, 1966, p. 448 • Otte, 1995a, p. 171 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Roy, 1964a, p. 1155, 1156-1162 ~ 1966, p. 38



Dist.: Sierra Leone (Jaeger et al., 1966 • Mason, 1966 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 1966)

Cette espèce n'est connue que par le matériel-type.

□ ***Phymeurus nimbaensis*** (Chopard, 1958)

*Platypymus nimbaensis* Chopard, 1958a, p. 139-141


Holotype mâle, Guinée, Mont Nimba, MNHN Paris

Cit.: *Platypymus nimbaensis*

Chopard, 1958a, p. 139-141

*Phymeurus nimbaensis*

Dirsh, 1963b, p. 212 ~ 1965, p. 265, 266 ~ 1970, p. 178 (clé) • Johnston, 1968, p. 197 • Lamotte & Roy, 1998, p. 121 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 171 • Roy, 1964a, p. 1159, 1173-1174 ~ 1966, p. 38 ~ 2003, p. 336, 380, 386, fig. 12



Dist.: Côte d'Ivoire (Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 1966, 2003)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**PLATYPTERNODES** I. Bolívar, 1908

Gomphocerinae

*Platypternodes* I. Bolívar, 1908d, p. 245-246

Espèce-type : Uvarov (1926a) indique *Ochrilidia brevipes* Stål, 1876b (non *O. brevipes* Chopard, 1947) mais, ainsi que l'indiquent Johnston (1956) et Otte (1995b), il n'y a pas eu de désignation.

Genre afrotropical comprenant trois espèces.


□ ***Platypternodes savannae* Uvarov, 1926**

*Platypternodes savannae* Uvarov, 1926a, p. 419-421, fig.

Holotype femelle, Nord-Nigeria, Azare (en fait Sherifuri, 40 km au nord), NHM Londres

Cit.: *Platypternodes savannae*

Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chapman, 1961, p. 279 ~ 1962, p. 55, 62 • Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Davey *et al.*, 1959b, p. 591 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1300-1302, 1310 ~ 1968, p. 575, 583 • Dirsh, 1965, p. 519 • Fishpool & Popov, 1984, p. 408 • Golding, 1948, p. 536, 578-584 • Jago, 1967b, p. 252 ~ 1968 • Johnston, 1956, p. 718 ~ 1968, p. 374 • Lecoq, 1977, p. 10 ~ 1978b, p. 243 ~ 1980b, p. 580, 586 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 256-257 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325 • Otte, 1995b, p. 210 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Roy, 1970, p. 702 ~ 1971, p. 409 • Uvarov, 1926a, p. 419-421



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Lecoq, 1977) - **Côte d'Ivoire** (Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **"French Sudan"** (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Descamps, 1965b • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1970) - **Tchad** (Descamps, 1965b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

Compte tenu de l' aspect très similaire des deux espèces, des confusions avec *Sporobolius infuscatus* ne sont pas à exclure.  
Cette espèce a été également signalée d'Angola et du Kenya.


□ ***Platypternodes voltaensis* Sjöstedt, 1931**

*Platypternodes voltaensis* Sjöstedt, 1931b, p. 23

Holotype femelle, Burkina Faso, Pundu, NR Stockholm

Cit.: *Platypternodes voltaensis*

Descamps, 1965b, p. 1292, 1300, 1302-1303 • Dirsh, 1965, p. 519 • Johnston, 1956, p. 719 ~ 1968, p. 374 • Lecoq, 1980b, p. 580, 586-587 • Mestre, 1988, p. 256-257 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Otte, 1995b, p. 210 • Sjöstedt, 1931b, p. 23



Dist.: **Burkina Faso** (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Mali** (Descamps, 1965b • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.