

Popov & Kevan, 1979 • Popov *et al.*, 1990) - **Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • COPR, 1982 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1943c, 1950 • Chopard & Villiers, 1950 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Lecoq, 1992 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Dirsh, 1965 • Golding, 1934a, 1935, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Phipps, 1971 • Popov & Kevan, 1979 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Popov & Kevan, 1979) - **"Rio de Oro"** (Morales Agacino, 1945, 1948) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979) - **Tchad** (Chopard, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979 • *mat. exam.*) - **AO** (Chopard, 1943c • Kevan, 1977 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990)

Cette sous-espèce est citée vers l'est du Soudan et de l'Éthiopie, et, vers le nord, des parties sahariennes de l'Algérie à l'Égypte.

PSEUDOGMOTHELA Karny, 1910

Gomphocerinae

Pseudogmothela Karny, 1910, p. 79

Espèce-type : *Pseudogmothela rehni* Karny, 1910, p. 79

Syn.: *Pachycarus* Uvarov, 1921e, p. 383 [Uvarov, 1929b, p. 43, avec *Pseudogmothela*]

Genre afrotropical d'au moins onze espèces. Le travail récent de R. Roy (2002) a montré qu'il y avait trois espèces confondues sous le nom *P. foveolata* en Afrique de l'Ouest. Les signalisations à préciser ont été regroupées sous *Pseudogmothela sp.*

⊔ ***Pseudogmothela foveolata*** Roy, 1965

Pseudogmothela foveolata Roy, 1965, p. 628-630, fig. 2-3

Holotype mâle, Sénégal, Tali (Basse-Casamance), MNHN Paris


Syn.: *Pseudogmothela cheradophila* Jago, 1966b, p., 355-357, fig. 33-37. Holotype mâle, Mali, NHM Londres [Jago, 1967b, p. 266, avec *Pseudogmothela foveolata*]

Cit.: *Pseudogmothela cheradophila*

Jago, 1966b, p. 33-37, fig. 33-37 (partie) • Johnston, 1968, p. 382

Pseudogmothela foveolata

Johnston, 1968, p. 382 • Otte, 1995b, p. 215 • Roy, 1965, p. 628-630 ~ 1970, p. 703 ~ 2002, p. 6-7, 8, 10




Dist.: **Gambie** (Roy, 2002) - **Guinée-Bissau** (Roy, 2002) - **Mali** (Jago, 1966b • Roy, 2002) - **Sénégal** (Jago, 1966b • Roy, 1965, 1970, 2002)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊔ ***Pseudogmothela jagoi*** Roy, 2002

Pseudogmothela jagoi Roy, 2002, p. 8

Holotype mâle, Mali, Koutiala, MNHN Paris



Cit.: *Pseudogmothela jagoi*

Roy, 2002, p. 6, 8, 10

Pseudogmothela sp.

Mestre *et al.*, 2001, p. 326 (*mat. exam.*)

Dist.: Bénin (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Ghana (Roy, 2002) - Mali (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Niger (Roy, 2002) - Nigeria (Roy, 2002) - Nord-Cameroun (Roy, 2002) - Togo (Roy, 2002 • *mat. exam.*)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊍ *Pseudogmothela yonlii* Roy, 2002

Pseudogmothela yonlii Roy, 2002, p. 6, 7, 8-10


Holotype mâle, Burkina Faso, Kamboinsé (12 km au nord de Ouagadougou), MNHN Paris

Cit.: *Pseudogmothela foveolata* (Err. dét., *mat. exam.*)

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 335 • Mestre, 1988, p. 275 (illustration femelle) • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 (partie, matériel du Niger)

Pseudogmothela yonlii

Roy, 2002, p. 6, 7, 8-10



Dist.: Burkina Faso (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Ghana (Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2002 • *mat. exam.*) - Nigeria (Roy, 2002)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊍ *Pseudogmothela* sp. (= *P. foveolata*, *P. jagoi* ou *P. yonlii*)

Cit.: *Pseudogmothela foveolata*

Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1295-1296 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 380 • Jago, 1966b, p. 352-353, 355-357 ~ 1967b, p. 246 ~ 1968, p. 339 • Johnston, 1968, p. 382 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 70 ~ 1980b, p. 581, 588 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 274-275 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 215 • Oyidi, 1977 ~ 1978

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Jago, 1966b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Sénégal (Jago, 1966b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

PSEUDOPHIALOSPHERA Dirsh, 1952

Catantopinae

Pseudophialosphaera Dirsh, 1952, p. 264-266

Espèce-type : *Phialosphaera tectifera* Ramme, 1929, p. 374, 375

Genre afrotropical comprenant trois espèces forestières. Dirsh (1970, p. 241) le cite comme synonyme d'*Antita* I. Bolívar, 1908 (Hollis, *in litt.*) mais cette synonymie a été ignorée.

⊍ *Pseudophialosphaera sylvatica* (Chapman, 1960)

Apoboleus sylvaticus Chapman, 1960, p. 242, fig. 4-9

Holotype mâle, Est-Ghana, Réserve forestière d'Essuboni, NHM Londres

Cit.: *Apoboleus sylvaticus*

Chapman, 1960, p. 242 ~ 1962, p. 24, 60 ~ 1964, p. 120 • Dirsh, 1965, p. 330, 331

Pseudophialosphaera sylvatica

Jago, 1966b, p. 344-345 ~ 1967b, p. 247 ~ 1968, p. 252-253 • Johnston, 1968, p. 234 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 208

Dist.: Ghana (Chapman, 1960, 1962 • Dirsh, 1965 • Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997)