

1962, 1970, 1971 • Uvarov, 1926a • *mat. exam.*) - Tchad (Chopard, 1958a • Descamps, 1968 • Kevan & Hsiung, 1985, 1987 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Kevan & Hsiung, 1985, 1987 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Appert, 1957 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a)

Cette espèce commune est citée vers l'est jusqu'en Éthiopie, et s'étend vers le sud jusqu'à un axe allant du nord de l'Angola à la Tanzanie.

RHABDOPLEA Karsch, 1893

Acridinae

Rhabdoplea Karsch, 1893, p. 54 (clé), 69-70

Espèce-type : *Rhabdoplea munda* Karsch, 1893, p. 70 [Kirby, 1910, p. 147]

Genre afrotropical comportant trois espèces.

⊃ *Rhabdoplea munda* Karsch, 1893

Rhabdoplea munda Karsch, 1893, p. 70-71, fig. 8

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckurg, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes, 3 mâles et 2 femelles)

- Syn.:** *Rhabdoplea mira* Karsch, 1893, p. 71. Lectotype femelle (Uvarov, 1953b), Togo, MNHU Berlin (DORSA : + 2 paralectotypes)
 [Descamps & Donskoff, 1968, p. 1228, avec *Rhabdoplea munda*]
Rhabdoplea angustula Karsch, 1893, p. 72, fig. 9. Syntypes mâles, femelles, Togo, MNHU Berlin (DORSA : 3 syntypes)
 [Dirsh, 1970, p. 426, avec *Rhabdoplea munda*]
Phlaeoba elegans Karny, 1907, p. 368, 369, pl. 3 : f. 51. Syntype(s) mâles, femelle(s), Soudan, NM Vienne
 [Dirsh, 1966, p. 387, avec *Rhabdoplea munda*]
Acteana klaptoczi Karny, 1915, p. 131-132. Holotype femelle, Guinée, NM Vienne
 [Dirsh, 1966, p. 389, avec *Rhabdoplea angustula*, par erreur]
 [Descamps & Donskoff, 1968, p. 1228, avec *Rhabdoplea munda*]


Il existe chez cette espèce des représentants avec des ailes réduites ou bien développées qui avaient été à l'origine considérés comme des espèces différentes. Les microptères avaient été décrits sous le nom *R. mira* et *Acteana klaptoczi* et les macroptères sous *R. angustula*, *R. munda* ou *Phlaeoba elegans*.

Descamps & Donskoff (1968) indiquent que la synonymie de *Acteana klaptoczi* avec *R. angustula* faite par Dirsh (1966) était une erreur (comm. pers. de Dirsh), la synonymie prévue étant avec *R. mira* (devenu *R. munda*). Ces auteurs envisagent, sans l'affirmer, que *R. angustula* soit cependant aussi un synonyme de *R. munda* ce qu'établira Dirsh en 1970.

- Cit.:** *Acteana klaptoczi*
 Dirsh, 1966, p. 389 • Jago, 1968, p. 214 • Karny, 1915, p. 131-132 • Ramme, 1929, p. 483
Phlaeoba elegans
 Karny, 1907, p. 368, 369, pl. 3
Rhabdoplea angusticomis (? Err. dét., espèce d'Afrique centrale)
 Baccetti, 2004, p. 29-30 (Cette signalisation récente, très éloignée de l'aire de répartition connue, doit être vérifiée)
Rhabdoplea angustula
 Dirsh, 1965, p. 423 ~ 1966, p. 389 ~ 1970, p. 426 • Jago, 1968, p. 313-314 • Johnston, 1956, p. 614 • Karsch, 1893, p. 72 • Kirby, 1910, p. 147 • Phipps, 1970, p. 335
Rhabdoplea klaptoczi
 Chapman, 1962, p. 46 • Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Dirsh, 1963b, p. 217 ~ 1965, p. 423, 424 ~ 1966, p. 389 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1968, p. 313-314 • Johnston, 1956, p. 615 ~ 1968, p. 300 • Lecoq, 1977, p. 6 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 • Roy, 1966, p. 36
Rhabdoplea mira
 Chopard, 1958a, p. 148 • Dahdoh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1965b, p. 1259, 1262 • Dirsh, 1964, p. 69 ~ 1965, p. 423, 424 ~ 1966, p. 389 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Golding, 1948, p. 533 • Jago, 1967b, p. 244, 245 ~ 1968, p. 313-314 • Johnston, 1956, p. 615 ~ 1968, p. 300 • Karsch, 1893, p. 71 • Lecoq, 1977, p. 6, 10 ~ 1984 • Phipps, 1970, p. 335 • Ramme, 1929, p. 484 • Uvarov, 1953b, p. 141
Rhabdoplea munda
 Chapman, 1962, p. 47 • Chopard, 1958a, p. 148 • Cornes & Riley, 1972, p. 11 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdoh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Descamps, 1965b, p. 1259, 1262 • Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 53 ~ 1963b, p. 217 ~ 1964, p. 68-69 ~ 1965, p. 423, 424 ~ 1966, p. 387-388 ~ 1970, p. 425-427 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 400 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 152-153, 172-174 ~ 1974b, p. 492-494, 518, 525 ~ 1976, p. 5-85 ~ 1983, p. 300, 302, 305 • Jago, 1967b, p. 253 ~ 1968, p. 313-314 • Johnsen, 1970, p. 149-151 • Johnston, 1956, p. 615 ~ 1968, p. 300 • Karsch, 1893, p. 70-71 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Lecoq, 1977, p. 6, 10 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980a, p. 61-62 ~ 1980b, p. 564, 567 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 62 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre, 1988, p. 184-185 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre *et al.*, 2001, p. 321 • Otte, 1995b, p. 303 • Oyidi, 1977, ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 335 • Roy, 1962, p. 131 ~ 1969a, p. 216 ~ 2003, p. 358-359, 381, 388, fig. 21

- Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdoh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Gillon, 1983 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Gillon, 1971, 1974a,b, 1976, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1966 • Jago,

1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965, 1966 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Karny, 1915 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1966, 2003) - **Mali** (Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Dirsh, 1964, 1965, 1966 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969 • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • *mat. exam.*) - **Togo** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **AO** (Gillon, 1983 • Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)



Cette espèce est également signalée du Cameroun, Congo, Zaïre, Kenya.

RHAPHOTITTHA Karsch, 1896

Gomphocerinae

Rhaphotittha Karsch, 1896, p. 256

Espèce-type : *Rhaphotittha levis* Karsch, 1896, p. 257 [Kirby, 1910, p. 151]

Syn.: *Prostethophyma* l. Bolívar, p. 295 [Jago, 1971, p. 246, avec *Rhaphotittha*]

Paraduronia Karny, 1910, p. 81 [Jago, 1971, p. 246, avec *Rhaphotittha*]

Milleriola Uvarov, 1953b, p. 168 [Jago, 1996a, p. 112, avec *Rhaphotittha*]

Afrohippus Uvarov, 1941a, p. 53 [Jago, 1996a, p. 112, avec *Rhaphotittha*]

Genre afrotropical comprenant six espèces selon Jago (1996a).

⊂ *Rhaphotittha levis* Karsch, 1896

Rhaphotittha levis Karsch, 1896, p. 257

Type mâle, Africa merid. orient., Delagaobai (*au Mozambique*), MNHU Berlin (DORSA : holotype mâle)

Syn.: *Rhaphotittha nyuki* Sjöstedt, 1909, p. 156, 168. Syntypes mâles, femelles, Tanzanie, NR Stockholm [Jago, 1996a, p. 113, avec *Rhaphotittha levis*]

Rhaphotittha meruensis Sjöstedt, 1909, p. 156, 169. Syntypes mâles, femelles, Tanzanie, NR Stockholm [Hollis, 1966, p. 326, avec *Rhaphotittha nyuki*] [Jago, 1996a, p. 113, avec *Rhaphotittha levis*]

Aulacobothrus africanus Uvarov, 1921c, p. 370-371. Holotype mâle, Afrique du Sud, NHM Londres [Hollis, 1966, p. 326, avec *Rhaphotittha levis*]

Chorthippus (Stauroderus) targui Chopard, 1941, p. 47. Holotype femelle, Niger, MNHN Paris [Jago, 1996a, p. 113, avec *Rhaphotittha levis*]



Cit.: *Aulacobothrus targui*

Chopard, 1950, p. 138 ~ 1963, p. 470 • Johnston, 1956, p. 666 • Uvarov, 1953b, p. 168

Chorthippus (Stauroderus) targui

Chopard, 1941, p. 47

Phonerula targui

Descamps, 1965b, p. 1292, 1294