

1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965, 1966 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Karny, 1915 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1966, 2003) - **Mali** (Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Dirsh, 1964, 1965, 1966 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969 • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • *mat. exam.*) - **Togo** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **AO** (Gillon, 1983 • Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)



Cette espèce est également signalée du Cameroun, Congo, Zaïre, Kenya.

RHAPHOTITTHA Karsch, 1896

Gomphocerinae

Rhaphotittha Karsch, 1896, p. 256

Espèce-type : *Rhaphotittha levis* Karsch, 1896, p. 257 [Kirby, 1910, p. 151]

Syn.: *Prostethophyma* I. Bolívar, p. 295 [Jago, 1971, p. 246, avec *Rhaphotittha*]

Paraduronia Karny, 1910, p. 81 [Jago, 1971, p. 246, avec *Rhaphotittha*]

Milleriola Uvarov, 1953b, p. 168 [Jago, 1996a, p. 112, avec *Rhaphotittha*]

Afrohippus Uvarov, 1941a, p. 53 [Jago, 1996a, p. 112, avec *Rhaphotittha*]

Genre afrotropical comprenant six espèces selon Jago (1996a).

⊂ *Rhaphotittha levis* Karsch, 1896

Rhaphotittha levis Karsch, 1896, p. 257


Type mâle, Africa merid. orient., Delagaobai (*au Mozambique*), MNHU Berlin (DORSA : holotype mâle)

Syn.: *Rhaphotittha nyuki* Sjöstedt, 1909, p. 156, 168. Syntypes mâles, femelles, Tanzanie, NR Stockholm [Jago, 1996a, p. 113, avec *Rhaphotittha levis*]

Rhaphotittha meruensis Sjöstedt, 1909, p. 156, 169. Syntypes mâles, femelles, Tanzanie, NR Stockholm [Hollis, 1966, p. 326, avec *Rhaphotittha nyuki*]
[Jago, 1996a, p. 113, avec *Rhaphotittha levis*]

Aulacobothrus africanus Uvarov, 1921c, p. 370-371. Holotype mâle, Afrique du Sud, NHM Londres [Hollis, 1966, p. 326, avec *Rhaphotittha levis*]

Chorthippus (Stauroderus) targui Chopard, 1941, p. 47. Holotype femelle, Niger, MNHN Paris [Jago, 1996a, p. 113, avec *Rhaphotittha levis*]



Cit.: *Aulacobothrus targui*

Chopard, 1950, p. 138 - 1963, p. 470 • Johnston, 1956, p. 666 • Uvarov, 1953b, p. 168

Chorthippus (Stauroderus) targui

Chopard, 1941, p. 47

Phonerula targui

Descamps, 1965b, p. 1292, 1294

Rhaphotittha levis

Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 63 ~ 1965, p. 543-544 • Jago, 1996a, p. 113 • Kirby, 1910, p. 151 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 223

Rhaphotittha targui

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • Descamps, 1968, p. 575, 576 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 125 • Fishpool & Popov, 1984, p. 384 • Johnston, 1968, p. 390 • Lecoq, 1980b, p. 581, 589 • Mestre, 1988, p. 286-287 • Otte, 1995b, p. 224 • Popov, 1989, p. 156-157

Dist.: **Bénin** (*mat. exam.*) - **Burkina Faso** (*mat. exam.*) - **Mali** (Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1950 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Tchad** (Chopard, 1963 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1980b • Popov, 1989)

L'espèce est présente jusqu'en Éthiopie et en Afrique du Sud.

RITCHIELLA Mungai, 1992

Cyrtacanthacridinae

Ritchiella Mungai, 1992, p. 262-265

Espèce-type : *Acridium* (*Cyrtacanthacris*) *sanguineum* Sjöstedt, 1912, p. 23-24, pl. 3 : f. 3, 3a

Genre afrotropical comprenant cinq espèces incluses auparavant dans le genre *Chondracris*, genre maintenant considéré circonscrit à la région orientale.

u *Ritchiella baumanni* (Karsch, 1896)

Cyrtacanthacris baumanni Karsch, 1896, p. 293-294, fig. 22

Syntypes mâle(s), femelles, Togo, Bismarckburg et Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle, Togo, Misahöhe, indiqué par Mungai (1992) (DORSA : lectotype mâle + 5 paralectotypes, 2 mâles et 3 femelles)

Cit.: *Chondracris baumanni*

Chapman, 1962, p. 30 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 329-330, 332, 335 • Chopard, 1958a, p. 134 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Davey *et al.*, 1959a, p. 100 • Dirsh, 1965, p. 387, 388 ~ 1966, p. 343 • Gillon, 1974a, p. 148 ~ 1974b, p. 488, 524 • Golding, 1948, p. 565, 578-584 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 277-278 • Johnston, 1956, p. 385-386 ~ 1968, p. 281 • Kirby, 1910, p. 453 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 160-161 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 333 • Risbec, 1950a, p. 120 ~ 1950b, p. 363 • Uvarov, 1923a, p. 144 ~ 1924c, p. 106, 107 • Vayssière & Mimeur, 1924, p. 189 ~ 1925, p. 216, pl. 3 ~ 1926, p. 15, pl. 5

Cyrtacanthacris baumanni

Karsch, 1896, p. 293-294

Cyrtacanthacris roseus (Err. dét., Karsch, 1896, p. 293, et Uvarov, 1924c, p. 107)

Karsch, 1893, p. 88

Ritchiella baumanni

Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 319 • Mungai, 1992, p. 259, 265-268, 271, 273



Dist.: **Bénin** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mungai, 1992 • Risbec, 1950b • Vayssière & Mimeur, 1924, 1925, 1926) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mungai, 1992 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Togo** (Dirsh, 1965, 1966 • Jago, 1968 • Karsch, 1893, 1896 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mungai, 1992 • Uvarov, 1924c) - **AO** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Risbec, 1950a • Vayssière & Mimeur, 1926)

Hormis notre zone d'étude, cette espèce est citée du sud-ouest du Cameroun et d'Angola (dernière citation à confirmer).