

**RUTIDODERES** Westwood, 1837

Pyrgomorphinae

*Locusta (Rutidoderes)* Westwood, 1837, p. 119-120

Espèce-type : *Gryllus Locusta squarrosus* Linné, 1771, p. 533 [Kirby, 1890, p. 589]

Syn.: *Peristegus* I. Bolívar, 1884a, p. 25 [Karsch, 1893, p. 82, avec *Rhytidoderes*]

[Kirby, 1910, p. 311, avec *Rutidoderes*]

*Rhytidoderes* Karsch, 1893, p. 82 (nom. praeoc.) [I. Bolívar, 1894, p. clxii, avec *Peristegus*, nom. subst.]

Genre afrotropical comprenant trois espèces forestières.

⊃ ***Rutidoderes squarrosus*** (Linné, 1771)

*Gryllus Locusta squarrosus* Linné, 1771, p. 533

Type 'Africa', perdu selon Kevan (1962b, 1977) et Dirsh (1970). Néotype mâle, Ghana, East Region, Essuboni Forest Reserve, NHM Londres (N.D. Jago) signalé par Dirsh (1970, p. 23). Kevan (1977) indique aussi un néotype mâle au NHM Londres sans précision sur l'auteur de la désignation. Marshall (1983) attribue la désignation du néotype à Dirsh (1970) mais celui-ci ne fait que le citer sans aucune désignation explicite.

Syn.: *Phymateus pardalinus* Walker, 1870a, p. 541. Lectotype mâle (Uvarov, 1925d), Ghana, NHM Londres

[I. Bolívar, 1884b, p. 472, avec *Peristegus squarrosus*]

*Phymateus acutus* Walker, 1870a, p. 542. Lectotype femelle (Uvarov, 1925d), Ghana, NHM Londres

[I. Bolívar, 1884b, p. 471, avec *Peristegus squarrosus*]

Cit. : *Acrydium squarrosus*

Olivier, 1791, p. 219

*Libellula squarrosus*

Drury, 1773 (index se référant à l'illustration pl. 49 : f. 1 de 1770)

*Locusta (Rutidoderes) squarrosa*

Westwood, 1837, vol. 1, p. 119, pl. 41 : f. 1

*Peristegus squarrosus*

I. Bolívar, 1884b, p. 470, 497, pl. 3 ~ 1889b, p. 152 ~ 1894, p. clxii ~ 1904c, p. 402 • Giglio-Tos, 1907b, p. 4 • Karsch, 1888c, p. 358

*Phymateus acutus*

Walker, 1870a, p. 542

*Phymateus pardalinus*

Walker, 1870a, p. 541

*Phymateus squarrosus*


Saussure, 1861, p. 477 • Stål, 1873b, p. 17 • Walker, 1870a, p. 540

*Rhytidoderes squarrosus*

Karsch, 1893, p. 82-83

*Rutidoderes squarrosus*

Chapman, 1962, p. 16 • Chopard, 1958a, p. 142 • COPR, 1982, p. 45 • Comes & Riley, 1972, p. 6 • Dirsh, 1965, p. 116 ~ 1970, p. 22-23 • Golding, 1946, p. 15, 22, 34 ~ 1948, p. 549, 578-584 • Jago, 1967b, p. 242 ~ 1968, p. 223-224 • Johnsen, 1981a, p. 83 • Johnston, 1956, p. 144-145 ~ 1968, p. 82 • Kevan, 1977, p. 233-235 • Kevan & Roy, 1971 • Kirby, 1910, p. 311 • Medler, 1980, p.36 • Mestre, 1988, p. 60-61 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 311 • Otte, 1994b, p. 93 • Phipps, 1970, p. 320 ~ 1971 • Roy, 1965, p. 615, 617 ~ 2003, p. 316, 379, 385, fig. 2 • Uvarov, 1925d, p. 282



Dist.: Côte d'Ivoire (I. Bolívar, 1904c • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Giglio-Tos, 1907b • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Gambia (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Walker, 1870a) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Giglio-Tos, 1907b • Jago, 1967b, 1968 • Karsch, 1888c • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Walker, 1870a) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Nigeria (Comes & Riley, 1972 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Karsch, 1891 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Saussure, 1861) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965) - Sierra Leone (I. Bolívar, 1884b, 1989b • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Drury, 1773 • Giglio-Tos, 1907b • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Olivier, 1791 • Phipps, 1970, 1971 • Stål, 1873b • Walker, 1870a • Westwood, 1837) - Togo (I. Bolívar, 1894 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Giglio-Tos, 1907b • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Kevan, 1977 • Walker, 1870a)

L'espèce s'étend via le Cameroun et le Gabon jusqu'au Zaïre et au Nord-Ouest de la Tanzanie.