

STAUROCLEIS Uvarov, 1923

Catantopinae

Staurocleis Uvarov, 1923c, p. 682

Espèce-type : *Staurocleis magnifica* Uvarov, 1923c, p. 682

Genre afrotropical monospécifique.

⊂ ***Staurocleis magnifica*** Uvarov, 1923

Staurocleis magnifica Uvarov, 1923c, p. 682-684

Holotype mâle, Ouganda, Entebbe, NHM Londres

Syn.: *Staurocleis magnifica occidentalis* Uvarov, 1923c, p. 684. Holotype mâle, Ghana, NHM Londres
[Dirsh, 1970, p. 262, avec *Staurocleis magnifica*]

Staurocleis occidentalis Sjöstedt, 1931a, p. 52-53 (nom. preoc). Syntypes mâles, femelle, Burkina Faso, NR Stockholm
[Dirsh, 1956a, p. 17, avec *Staurocleis magnifica occidentalis*]

Cit.: *Staurocleis magnifica*


COPR, 1982, p. 268-269 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Dirsh, 1956c, p. 275, pl. 34 ~ 1964, p. 59 ~ 1965, p. 346, 347 ~ 1970, p. 262-263 • Fishpool & Popov, 1984, p. 342 • Gillon, 1974b, p. 480-481 ~ 1983, p. 296 • Jago, 1984, p. 357-358 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 53 • Lecoq, 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 156-157 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Otte, 1995a, p. 339 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 52-53 • Roy, 2003, p. 343, 380, 387

Staurocleis magnifica occidentalis

Chapman, 1962, p. 29 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 93 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 953, 958 • Dirsh, 1956, p. 17 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Gillon, 1974a, p. 144 • Golding, 1948, p. 571 • Jago, 1967b, p. 260 ~ 1968, p. 268 • Johnston, 1956, p. 344 ~ 1968, p. 243 • Launois, 1978b, p. 154-155 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 555-556 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 42 • Uvarov, 1923c, p. 684

Staurocleis occidentalis

Sjöstedt, 1931b, p. 52



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1956, 1964, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Gillon, 1974a,b • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1923c • *mat. exam.*) - **Guinée** (Roy, 2003) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1923c) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Gillon, 1983 • Jago, 1984 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce, à la coloration très caractéristique, est également signalée du Cameroun, du Zaïre et d'Ouganda. Elle est donc logiquement présente dans divers autres pays d'Afrique centrale (Centrafrique, Congo...).

STENOCROBYLUS Gerstäcker, 1869

Catantopinae

Stenocrobilus Gerstäcker, 1869, p. 219

Espèce-type : *Stenocrobilus cervinus* Gerstäcker, 1869, p. 220

Genre afrotropical comprenant une douzaine d'espèces.

⊂ ***Stenocrobilus cinnabarinus*** Ramme, 1929

Stenocrobilus cinnabarinus Ramme, 1929, p. 452, pl. 14 : f. 3

Holotype femelle, Centrafrique, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : + 2 paratypes femelles)