



La signalisation de Gambie (Mestre & Chiffaud, 1997) est une erreur. L'espèce est également signalée du Soudan.

SUMBA I. Bolívar, 1909

Acridinae

Sumba I. Bolívar, 1909b, p. 288-289

Espèce-type : *Sumba roseipennis* I. Bolívar, 1912b (1911), p. 78

Genre afrotropical comprenant six espèces.

⊃ ***Sumba longicornis*** Ramme, 1929


Sumba longicornis Ramme, 1929, p. 275, pl. 3 : f. 25-26

Holotype mâle, Centrafrique, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : + 11 paratypes)

Cit.: *Sumba longicornis*

Dirsh, 1965, p. 422, 423 • Fishpool & Popov, 1984, p. 400 • Johnston, 1956, p. 616 • Jago, 1968, p. 314-315 • Johnsen, 1971, p. 40-42 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 305 • Ramme, 1929, p. 257

Sumba sp. (identification sous réserve de la bonne affectation générique, *S. longicornis* étant la seule espèce ouest-africaine)
Delarze & Le Gall, 1989, p. 279, 280



Dist.: ? Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Cette espèce est aussi signalée de Centrafrique.

TAIACRIS Donskoff, 1986

Catantopinae

Taiacris Donskoff, 1986, p. 206-207

Espèce-type : *Taiacris couturieri* Donskoff, 1986, p. 207-209

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Taiacris couturieri*** Donskoff, 1986

Taiacris couturieri Donskoff, 1986, p. 207-209, fig. 17-33

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Cit.: *Taiacris couturieri*

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Donskoff, 1986, p. 207-209, fig. 17-33 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118

Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997)