

- Cit.:** *Acrida serrata*  
 Burr, 1902, p. 176-177 • Kirby, 1910, p. 97  
*Truxaloides serratus*  
 Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 60 • Johnston, 1956, p. 739-740 – 1968, p. 366 • Otte, 1995b, p. 313 • Roy, 1964c, p. 124
- Dist.:** Sierra Leone (Burr, 1902 • Roy, 1964c)

Cette espèce, connue d'Angola et de plusieurs pays d'Afrique australe, n'est pas signalée en Afrique de l'Ouest par Dirsh (1951a) dans sa révision du genre et sa présence est douteuse. La description fournie par Burr, conforme à celle de *T. serratus*, ne permet pas de rapporter sa signalisation de Sierra Leone, si elle est exacte, à *T. braziliensis* ou *T. chekei*. En effet, la couleur typique des ailes de *T. serratus* (partie basale hyaline à légèrement jaunâtre ou verdâtre, apex enfumé) est très différente de celle de ces deux autres espèces (base des ailes nettement colorée et apex non enfumé). Mais cela pourrait correspondre à un imago de *T. braziliensis* venant de muer avec les ailes encore peu pigmentées. Notons en effet que Phipps (1970) cite *T. braziliensis*, si l'identification est correcte, de la même région de collecte.

## TUAREGA Uvarov, 1943

Akicerinae

- Tuarega* Uvarov, 1943g, p. 3, 4, 8, 14, 31, 36, 47  
 Espèce-type : *Oedipoda insignis* Lucas, 1851, p. 370-373  
 Syn.: *Eremocharis* Saussure, 1884, p. 63, 233-234 (partim) [Uvarov, 1943g, p. 47, avec *Tuarega*]


Genre monospécifique saharien.

### ⊃ *Tuarega insignis* (Lucas, 1851)

*Oedipoda insignis* Lucas, 1851, p. 370-373  
 Type femelle, Algérie, Kefoum-Teboul, MNHN Paris

- Syn.:** *Eremobia jaminii* Lucas, 1853, lxx. Type femelle, Algérie, dépositaire ? MNHN Paris  
 [Lucas, 1857, p. cvi, avec *Eremobia (Oedipoda) insignis*]  
*Batrachotettix elephas* Saussure, 1884, p. 236, 237. Type femelle, "Afrique du Sud" (err. d'après Saussure, 1888a), NM Vienne  
 [Saussure, 1888a, p. 135-136, avec *Eremocharis insignis*]

- Cit.:** *Eremocharis insignis*  
 Chopard, 1932, p. 870 – 1936a, p. 72 – 1943c, p. 334 • Kirby, 1910, p. 290  
*Tuarega insignis*  
 Chopard, 1952, p. 472 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 127, 185, 203 • Descamps, 1968, p. 539 • Dirsh, 1956c, p. 272, pl. 17 – 1965, p. 86-87 • Johnston, 1956, p. 64-65 – 1968, p. 62 • Mestre, 1988, p. 42-43 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115  
 • Morales Agacino, 1945, p. 330 – 1948, p. 16 • Otte, 1994b, p. 163 • Roy, 1960, p. 199



- Dist.:** **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "**Rio de Oro**" (Chopard, 1943c • Morales Agacino, 1945, 1948) - **Tchad** (Chopard, 1932, 1936a, 1943c • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Roy, 1960)

Espèce du domaine désertique saharien, signalée depuis l'ancien Sahara espagnol jusqu'à l'Égypte.

## TYLOTROPIDIUS Stål, 1873

Eyprepocnemidinae

- Pezotettix (Tylotropidius) Stål*, 1873b, p. 74  
 Espèce-type : *Gryllus didymus* Thunberg, 1815, p. 241