

1971, 1974a,b , 1976 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1948) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Grunshaw, 1995 • Jago, 1964a, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Mali** (Boisson, 1961 • COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Grunshaw, 1995 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1934a, 1948 • Grunshaw, 1995 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1967, 1969a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Chopard, 1952, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1995 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Stål, 1873b • Uvarov, 1921b • Walker, 1870b) - **Tchad** (Grunshaw, 1995 • *mat. exam.*) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1995 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1964 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

L'espèce est citée vers l'est jusqu'en Éthiopie, et vers le sud, jusqu'en Angola et en Zambie.

#### U *Tylotropidius* sp.

**Cit.:** *Tylotropidius* sp.

Descamps, 1953, p. 601, 605 • Golding, 1934, p. 293 ~ 1948, p. 573

**Dist.:** **Nigeria** (Golding, 1934, 1948) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953)

## VOSELLERIANA Uvarov, 1924

Oedipodinae

*Vosseleriana* Uvarov, 1924a, p. 31

Espèce-type : *Helioscirtus fonti* I. Bolívar, 1902a, p. 275, 281

Syn.: *Mistshenkoa* Bey-Bienko, 1950, p. 202 [Dirsh, 1961b, p. 396, avec *Vosseleriana*]

Genre de 6 ou 7 espèces xérophiles essentiellement africaines (zone saharienne) et une espèce présente en Arabie.


#### U *Vosseleriana eburnea* Baccetti, 2004

*Vosseleriana eburnea* Baccetti, 2004, p. 30-31, fig. 8

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Grand-Bassam, dépositaire non indiqué (Sienne ?)

**Cit.:** *Vosseleriana eburnea*

Baccetti, 2004, p. 30-31, fig. 8



**Dist.:** **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004)

Cette espèce décrite récemment n'est connue que par le matériel type. Cette espèce, trouvée sur les plages sableuses du littoral ivoirien, est la seule qui ne soit pas associée aux milieux désertiques ou sub-désertiques.

#### U *Vosseleriana korsakovi* (Chopard, 1943)


*Sphingonotus korsakovi* Chopard, 1943b, p. 145

Holotype mâle, Algérie, oasis de Taghela, MNHN Paris

**Cit.:** *Vosseleriana korsakovi*

Descamps, 1968, p. 561, 566 • Dirsh, 1965, p. 463, 464 • Lecoq, 1980b, p. 569, 573 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 440

**Dist.:** **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1980b)




Hormis la signalisation tchadienne, l'espèce n'est citée que d'Algérie et de Lybie.

⊃ ***Vosseleriana strepens*** (Uvarov, 1938)

*Sphingonotus strepens* Uvarov, 1938c, p. 600-602  
 Holotype mâle, Mauritanie, Kedia Guengoum, MNHN Paris

- Cit.:** *Mistshenkoa strepens*  
 Johnston, 1956, p. 496  
*Sphingonotus strepens*  
 Chopard, 1943c, p. 320-321 ~ 1952, p. 474 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 105, 210 • Uvarov, 1938c, p. 600-602  
*Vosseleriana strepens*  
 Dirsh, 1965, p. 464, 465 • Johnston, 1968, p. 325 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 440



**Dist.:** **Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1938c)

La signalisation d'Uvarov est du Zemmour, au nord de la Mauritanie, et donc en dehors de notre zone d'étude *sensu stricto*. Cette espèce n'est signalée que de Mauritanie (la signalisation du Tchad de Mestre & Chiffaud, 1997, est une erreur).

**WERNERELLA** Karny, 1907 Oedipodinae

*Wernerella* Karny, 1907, p. 355  
 Espèce-type : *Thalpomena picteti* Krauss, 1892b, p. 167  
 Syn.: *Fortunata* l. Bolivar, 1908a, p. 323 (nom. praecoc) [Kirby, 1910, p. 246, avec *Wernerella*, nom. subs.]  
 Genre d'une dizaine d'espèces afrotropicales et holarctiques (Algérie, Espagne et îles Canaries).

⊃ ***Wernerella atlantica*** Popov, 1984

*Wernerella atlantica* Popov, 1984, p. 42-46, fig. 1a-b, 2a-e, 3a-b, 4a-b, 5a-b  
 Holotype mâle, îles du Cap-Vert, Santa Luzia, MNHN Paris