

1971, 1974a,b , 1976 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1948) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Grunshaw, 1995 • Jago, 1964a, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Mali** (Boisson, 1961 • COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Grunshaw, 1995 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1934a, 1948 • Grunshaw, 1995 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1967, 1969a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Chopard, 1952, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1995 • Jago, 1968 • Karny, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Stål, 1873b • Uvarov, 1921b • Walker, 1870b) - **Tchad** (Grunshaw, 1995 • *mat. exam.*) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1995 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1964 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

L'espèce est citée vers l'est jusqu'en Éthiopie, et vers le sud, jusqu'en Angola et en Zambie.

U *Tylotropidius* sp.

Cit.: *Tylotropidius* sp.

Descamps, 1953, p. 601, 605 • Golding, 1934, p. 293 ~ 1948, p. 573

Dist.: **Nigeria** (Golding, 1934, 1948) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953)

VOSELLERIANA Uvarov, 1924

Oedipodinae

Vosseleriana Uvarov, 1924a, p. 31

Espèce-type : *Helioscirtus fonti* I. Bolívar, 1902a, p. 275, 281

Syn.: *Mistshenkoa* Bey-Bienko, 1950, p. 202 [Dirsh, 1961b, p. 396, avec *Vosseleriana*]

Genre de 6 ou 7 espèces xérophiles essentiellement africaines (zone saharienne) et une espèce présente en Arabie.


U *Vosseleriana eburnea* Baccetti, 2004

Vosseleriana eburnea Baccetti, 2004, p. 30-31, fig. 8

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Grand-Bassam, dépositaire non indiqué (Sienne ?)

Cit.: *Vosseleriana eburnea*

Baccetti, 2004, p. 30-31, fig. 8



Dist.: **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004)

Cette espèce décrite récemment n'est connue que par le matériel type. Cette espèce, trouvée sur les plages sableuses du littoral ivoirien, est la seule qui ne soit pas associée aux milieux désertiques ou sub-désertiques.

U *Vosseleriana korsakovi* (Chopard, 1943)


Sphingonotus korsakovi Chopard, 1943b, p. 145

Holotype mâle, Algérie, oasis de Taghela, MNHN Paris

Cit.: *Vosseleriana korsakovi*

Descamps, 1968, p. 561, 566 • Dirsh, 1965, p. 463, 464 • Lecoq, 1980b, p. 569, 573 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 440

Dist.: **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1980b)




Hormis la signalisation tchadienne, l'espèce n'est citée que d'Algérie et de Lybie.

⊃ ***Vosseleriana strepens*** (Uvarov, 1938)

Sphingonotus strepens Uvarov, 1938c, p. 600-602
 Holotype mâle, Mauritanie, Kedia Guengoum, MNHN Paris

- Cit.:** *Mistshenkoa strepens*
 Johnston, 1956, p. 496
Sphingonotus strepens
 Chopard, 1943c, p. 320-321 ~ 1952, p. 474 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 105, 210 • Uvarov, 1938c, p. 600-602
Vosseleriana strepens
 Dirsh, 1965, p. 464, 465 • Johnston, 1968, p. 325 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 440



Dist.: **Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1938c)

La signalisation d'Uvarov est du Zemmour, au nord de la Mauritanie, et donc en dehors de notre zone d'étude *sensu stricto*. Cette espèce n'est signalée que de Mauritanie (la signalisation du Tchad de Mestre & Chiffaud, 1997, est une erreur).

WERNERELLA Karny, 1907 Oedipodinae

Wernerella Karny, 1907, p. 355
 Espèce-type : *Thalpomena picteti* Krauss, 1892b, p. 167
 Syn.: *Fortunata* l. Bolivar, 1908a, p. 323 (nom. praecoc) [Kirby, 1910, p. 246, avec *Wernerella*, nom. subs.]
 Genre d'une dizaine d'espèces afrotropicales et holarctiques (Algérie, Espagne et îles Canaries).

⊃ ***Wernerella atlantica*** Popov, 1984

Wernerella atlantica Popov, 1984, p. 42-46, fig. 1a-b, 2a-e, 3a-b, 4a-b, 5a-b
 Holotype mâle, Îles du Cap-Vert, Santa Luzia, MNHN Paris