

- Cit.:** *Wernerella atlantica*
 Duranton *et al.*, 1984, p. 41, 42-46 • Launois *et al.*, 1988, p. 157 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 440 • Popov, 1984, p. 42-46
- Dist.:** **Cap-Vert** (Duranton *et al.*, 1984 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1984)
 C'est la seule signalisation de l'espèce.

⊃ ***Wernerella picteti*** (Krauss, 1892) (? , présence à confirmer)

Thalpomena picteti Krauss, 1892, p. 167
 Syntypes mâle(s), femelle(s), Îles Canaries, Tenerife, SMN Stuttgart (DORSA : 29 syntypes)

- Cit.:** *Wernerella picteti*
 Dirsh, 1965, p. 473, 474 • Duranton *et al.*, 1984, p. 41, 42, 46-47 • Johnsen, 1985, p. 158-160 • Kirby, 1910, p. 246 • Launois *et al.*, 1988, p. 157 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 441
- Dist.:** ? **Cap-Vert** (Duranton *et al.*, 1984 • Launois *et al.*, 1988)

Cette espèce n'était connue que des îles Canaries. La détermination pour le Cap-Vert a été faite à partir d'un unique juvénile de dernier stade et les auteurs de cette signalisation la donnent avec réserve.

XENOTRUXALIS Dirsh, 1951

Acridinae


Xenotruxalis Dirsh, 1951a, p. 135 (clé), 245-246
 Espèce-type : *Acridella fenestrata* Ramme, 1929

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Xenotruxalis fenestrata*** (Ramme, 1929)

Acridella fenestrata Ramme, 1929, p. 249, pl. 2 : f. 1
 Holotype mâle, Ghana, Kete Kratje (= *Keti Krachi*), MNHU Berlin (DORSA : + 2 paratypes)

- Cit.:** *Acridella fenestrata*
 Ramme, 1929, p. 249
- Xenotruxalis fenestrata*
 Davey *et al.*, 1959b, p. 596 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-280 • Descamps, 1965b, p. 1293 • Dirsh, 1951a, p. 247 ~ 1965, p. 509-510 • Jago, 1967b, p. 251 ~ 1968, p. 348 • Johnston, 1956, p. 366 ~ 1968, p. 740 • Lecoq, 1980b, p. 578-579 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 246-247 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Otte, 1995b, p. 313-314 • Roy, 1964c, p. 124



- Dist.:** **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Dirsh, 1951a, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929 • Roy, 1964c) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964c) - **Nigeria** (Dirsh, 1965 • Medler, 1980) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Certaines signalisations du Togo (en fait du Togo allemand) sont erronées car à rapporter au Ghana actuel. Cette espèce est également signalée du Cameroun.

YENDIA Ramme, 1929

Acridinae

Yendia Ramme, 1929, p. 251
 Espèce-type : *Acrida thymmatoptera* Karsch, 1893, p. 55

Ce genre afrotropical comporte deux espèces, *Y. bredoi* Schouteden, 1940, citée uniquement par le type femelle du Zaïre (Katanga), et *Y. thymmatoptera*, signalée seulement de notre zone d'étude.