

Anacridium Uvarov, 1923a, p. 141

Espèce-type : *Gryllus Locusta aegyptius* Linné, 1764

Ce genre comporte une quinzaine d'espèces des régions holarctique, afrotropicale et orientale. Il inclut en Afrique de l'Ouest ce que l'on appelle les criquets arboricoles (essentiellement *A. melanorhodon melanorhodon*).

On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur les autres espèces ouest-africaines à savoir *A. aegyptium* (Linné), de présence douteuse, *A. eximium* (Sjöstedt), *A. melanorhodon melanorhodon* (Walker) et *A. wernerellum* (Karny). Les deux dernières espèces ont été signalées du Cameroun ainsi que, pour *A. wernerellum*, de R. centrafricaine.

Clé spécifique : Dirsh & Uvarov (1953a, 12 espèces).

Anacridium illustrissimum (Karsch, 1896)

Cyrtacanthacris illustrissimus Karsch, 1896, p. 297-298.

Holotype femelle, Cameroun, Lolodorf, MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle).

Cette espèce n'est signalée que par l'holotype. Dirsh & Uvarov (1953a) indiquent ne pas avoir examiné le type présent à Berlin et que le statut de cette espèce devait être clarifié. L'aile postérieure, entièrement noire, la distingue des trois autres espèces de notre zone d'étude.

Citations bibliographiques

Acridium illustrissimum

- Finot, 1907, p. 320

Anacridium illustrissimum

- Dirsh, 1965, p. 383, 384

- Dirsh & Uvarov, 1953a, p. 10 (carte), 14-15, 55

- Johnston, 1956, p. 361

- Otte, 1995b, p. 6

Cyrtacanthacris illustrissimus (- a)

- Karsch, 1896, p. 297-298


- Uvarov, 1923b, p. 489, sous *C. illustrissima*

(? appartenance au genre *Orthacanthacris*)

Orthacanthacris illustrissima

- Kirby, 1910, p. 446

- Sjöstedt, 1918, p. 5



Distribution géographique

Cameroun (Karsch, 1896)

L'holotype est le seul spécimen connu.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.