

Barombia Karsch, 1891, p. 180Espèce-type : *Barombia tuberculosa* Karsch, 1891

Genre afrotropical monospécifique.

Ce genre a été longtemps inclus dans les Catantopinae et transféré dans les Hemiacridinae par Dirsh (1966). Dans le catalogue de Otte (1995a), il est encore intégré aux Catantopinae.

Barombia tuberculosa* Karsch, 1891Barombia tuberculosa* Karsch, 1891, p. 180-181, 1 fig.

Syntypes mâle, femelles, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA 2007 : 3 syntypes, 1 mâle et 2 femelles, l'une d'elle indiquée mâle par erreur ; Karsch cite bien 1 mâle et 2 femelles donnant d'ailleurs une fourchette de taille du corps pour les femelles).

*Barombia tuberculosa* d'après Karsch (1891)**Synonymes***Barombia nassau* Rehn, 1958, p. 1, 3-5, figs. 3, 4. Holotype mâle, Cameroun, ANS Philadelphie (site Internet ANSP : holotype)[Dirsh, 1966, p. 101, avec *Barombia tuberculosa*]*Barombia tuberculosa* var. *sublaevis* I. Bolívar, 1905b, p. 226. Type sans précision, Guinée Équatoriale, MNCN Madrid ?[Kirby, 1910, p. 386, avec *Barombia tuberculosa*, synonymie non citée par Ramme][Ramme, 1929, p. 311, avec *Barombia tuberculosa*]

Otte (1995a, p. 277) réinstitue cette sous-espèce comme valide dans son catalogue sans fournir la moindre explication. En l'attente de précisions, nous conservons ici la synonymie faite par Kirby et Ramme.

Citations bibliographiques*Barombia nassau*

- Dirsh, 1965, p. 307
- Rehn, 1958, p. 1, 3-5, figs. 3, 4.

Barombia tuberculosa


- I. Bolívar, 1908c, p. 106
- Dirsh, 1965, p. 307, 308, fig. 234 ~ 1966, p. 100, 101, fig. 40 ~ 1970, p. 81, 82, fig. 23
- Johnston, 1956, p. 266 ~ 1968, p. 223
- Karsch, 1891, p. 180-181, 1 fig.
- Kirby, 1910, p. 386
- Ramme, 1929, p. 311
- Rehn, 1958, p. 1, 2-3, figs. 1, 2
- Sjöstedt, 1910, p. 5

Barombia tuberculosa sublaevis ou var. *sublaevis*

- Johnston, 1956, p. 266 (comme synonyme)
- Otte, 1995a, p. 277 (comme sous-espèce valide)
- Ramme, 1929, p. 311 (comme synonyme)

Barombia tuberculosa tuberculosa

- Otte, 1995a, p. 277

*Barombia tuberculosa*

Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • I. Bolívar, 1908c • Karsch, 1891 • Rehn, 1958 • Sjöstedt, 1910)

L'espèce est également signalée de Guinée Équatoriale, du Congo et de la R.D. du Congo (ex-Zaïre).

Iconographie

Habitus (im. : Dirsh, 1965♂, 1966♂, 1970♂ • Karsch, 1891♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Rehn, 1958, sous *B. tuberculosa* et *B. nassau*) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1966)

Bio-écologie

Aucune information.