

Gemeneta Karsch, 1892, p. 71-72

Espèce-type : *Gemeneta terrea* Karsch, 1892

Syn.: *Escalera* I. Bolívar, 1905b, p. 231 [Dirsh, 1958a, p. 26, avec *Gemeneta*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces forestières.

Ce genre a été longtemps inclus dans les Catantopinae et transféré dans les Hemiacridinae par Dirsh (1966). Dans le catalogue de Otte (1995a), il est encore intégré aux Catantopinae.

***Gemeneta opilionoides* (I. Bolívar, 1905)**

Escalera opilionoides I. Bolívar, 1905b, p. 232.

Type femelle (= holotype selon Dirsh, 1958a), Biafra (= Guinée Équatoriale), Cabo San Juan, MNCN Madrid.

Synonymes

Gemeneta rostratuberculata Kevan, 1956b, p. 965-969, figs. 3, 3bis. Holotype femelle, Cameroun, ZM Copenhagen
[Dirsh, 1958a, p. 26, avec *Gemeneta terrea*]

Citations bibliographiques

Escalera opilionoides

- I. Bolívar, 1905b, p. 232

- Kirby, 1910, p. 406

Gemeneta opilionoides


- Dirsh, 1958a, p. 26 ~ 1966, p. 98 ~ 1970, p. 77

- Johnston, 1956, p. 216 ~ 1968, p. 228

- Otte, 1995a, p. 303

Gemeneta rostratuberculata

- Kevan, 1956b, p. 965-969, figs. 3, 3bis



Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1966, 1970 • Kevan, 1956b)

Cette espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.

Iconographie

Habitus (im.: Kevan, 1956b♀, sous *G. rostratuberculata*) - **Autres morph.** (Kevan, 1956b, sous *G. rostratuberculata*) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information. Kevan (1956b) indique en décrivant *G. rostratuberculata* que l'espèce "... presumably lives on trees, if one may judge from its lichen-like appearance".



Gemeneta terrea Karsch, 1892

Gemeneta terrea Karsch, 1892, p. 72, fig. 1.

Syntypes mâles, femelle, Cameroun, Buea, MNHU Berlin. Lectotype mâle désigné par Kevan (1956b, p. 968) qui indique « *The male is here selected as single type* » mais la description indique clairement 2 mâles (et 1 femelle). Trois syntypes sont effectivement présents au MNHU selon le recensement DORSA. L'un des mâles étiqueté Type est a priori le lectotype désigné par Kevan (l'autre étant étiqueté Paratype), mais aucune étiquette ne l'indique.

Citations bibliographiques*Gemeneta terrea*

- Chopard, 1945, p. 177
- Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 43 : f. 21 ~ 1965, p. 320, 321, fig. 246 ~ 1966, p. 98-99, fig. 39 ~ 1970, p. 77-78, fig. 21
- Johnston, 1956, p. 296 ~ 1968, p. 228
- Karsch, 1892, p. 72, fig. 1
- Kevan, 1956b, p. 968, 969, fig. 4
- Kirby, 1910, p. 385
- Medler, 1980, p. 39
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 ~ 2006, p. 18, 147
- Otte, 1995a, p. 303
- Ramme, 1929, p. 311, 484, pl. 6 : f. 15-17
- Sjöstedt, 1910, p. 9



Gemeneta terrea
d'après Karsch (1892)

Distribution géographique

Cameroun (Chopard, 1945 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Karsch, 1892 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1910) - **Nigeria** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Cette espèce est également signalée du Congo, du Zaïre et d'Ouganda.

Iconographie

Habitus (im.: Dirsh, 1965♂, 1966♀, 1970♂ • Karsch, 1892♂ • Ramme, 1929♂♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965, 1970 • Kevan, 1956b) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965, 1966, 1970)

Bio-écologie

Aucune information.