

Heteropternis Stål, 1873b, p. 117 (clé), 128

Espèce-type : *Heteropternis pyrroscolis* Stål, 1873b (= *H. respondens* Walker, 1859)

Syn.: *Thaleius* Finot, 1908, p. 27-28 [Uvarov, 1954b, p. 127, avec *Heteropternis*]

Genre comprenant près d'une vingtaine d'espèces des régions afrotropicale, orientale et australienne.

On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations concernant les autres espèces ouest-africaines du genre à savoir *H. descampsi* Roy, *H. royi* Mestre, *H. coulouiana* (Saussure) et *H. thoracica* Walker. Les deux dernières espèces, à vaste répartition, ont été signalées du Cameroun.

Clés spécifiques : Descamps, 1965b (partiel, espèces ouest-africaines) ; Dirsh, 1966, 1970 (Afrique, 8 espèces).

***Heteropternis cheesmanae* Uvarov, 1935**


Heteropternis cheesmanae Uvarov, 1935, p. 209-210.

Holotype mâle, Cameroun, Mt. Cameroon, Mann's Quelle, NHM Londres.

Citations bibliographiques

Heteropternis cheesmanae

- Chopard, 1945, p. 175
- Descamps, 1965b, p. 1285 (clé spécifique)
- Dirsh, 1965, p. 475, 476 ~ 1966, p. 421 ~ 1970, p. 480 (clé espèces)
- Johnston, 1956, p. 581 ~ 1968, p. 333
- Otte, 1995b, p. 342
- Uvarov, 1935, p. 206, 209-210



Distribution géographique

Cameroun (Chopard, 1945 • Dirsh, 1965, 1966 • Uvarov, 1935)

Cette espèce n'est citée que du Mont Cameroun.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information. Cette espèce brachyptère a été collectée à des altitudes comprises entre 2300 et 3000-3500 m.

***Heteropternis pugnax* I. Bolívar, 1912**

Heteropternis pugnax I. Bolívar, 1912b, p. 85-86.

Type femelle, Zambie, Mpika, MRAC Tervuren.

Synonymes


Heteropternis violaceipennis Ramme, 1929, p. 277, pl. 4 : f. 2. Syntypes mâles (dont deux indiqués " types "), femelles, République Centrafricaine, MNHU Berlin (DORSA : holotype = type I de Ramme + 14 paratypes) [Dirsh, 1966, p. 418, avec *H. pugnax*]

Citations bibliographiques*Heteropternis violaceipennis*

- Descamps, 1965b, p. 1285 (clé spécifique)
- Dirsh, 1965, p. 475-476, 477 ~ 1966, p. 418
(comme syn. de *H. pugnax*)
- Johnston, 1956, p. 585 ~ 1968, p. 335
- Otte, 1995b, p. 345
- Ramme, 1929, p. 277, pl. 4 : f. 2

Heteropternis pugnax

- I. Bolívar, 1912b, p. 85-86
- Dirsh, 1965, p. 475-476, 477 ~ 1966, p. 418 ~
1970, p. 483
- Johnston, 1956, p. 583 ~ 1968, p. 334
- Otte, 1995b, p. 345

**Distribution géographique****R. centrafricaine** (Ramme, 1929)

Cette espèce est également citée de l'Angola, de R.D. Congo (ex-Zaïre), du Kenya, de Zambie, de Tanzanie et du Zimbabwe. Les signalisations du Cameroun faisant référence au matériel type de *H. violaceipennis* sont des erreurs pour la République centrafricaine.

Iconographie

Habitus (im. ♀ : Ramme, 1929, sous *H. violaceipennis*) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.