

Madimbania Dirsh, 1953, p. 234

Espèce-type : *Allotriusia madimbana* Giglio-Tos, 1907b, par désignation originale

Syn.: *Pyrganthermus* Dirsh, 1953, p. 236-237 [Dirsh, 1966, p. 239, avec *Madimbania*]

Genre afrotropical comprenant deux espèces selon Jago (1984).

Clés spécifiques : Dirsh (1956a, 3 espèces mais pas *M. cephalica* ~ 1966, 1970, 3 espèces dont *M. fumipennis* transféré dans *Anthermus* par Jago, 1984).

***Madimbania cephalica* (I. Bolívar, 1889)**

Anthermus cephalicus I. Bolívar, 1889b, p. 157-158.

Type femelle, Angola, Caconda, détruit (incendie Muséum de Lisbonne).

Synonymes

Anthermus acutifrons Miller, 1929, p. 82-83, pl. 11 : f. 63, 64. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

Anthermus uamicus Ramme, 1929, p. 455. Holotype mâle, République centrafricaine, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 4 paratypes femelles)

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

Anthermus longiceps Ramme, 1929, p. 457, fig. 95, pl. 14 : f. 8. Holotype femelle, sans précision, MNHU Berlin ? (DORSA : non_reconservé). Dirsh (1956a, p. 25, repris par Jago, 1968, p. 267) indique comme localité type La Panda au Katanga (= Zaïre = RD Congo) et l'IRSN Bruxelles comme dépositaire.

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

Citations bibliographiques

Anthermus acutifrons

- Miller, 1929, p. 82-83, pl. 11 : f. 63, 64

Anthermus cephalicus

- Kirby, 1910, p. 443

Anthermus longiceps

- Ramme, 1929, p. 457, fig. 95, pl. 14 : f. 8

Anthermus uamicus

- Ramme, 1929, p. 455

Madimbania cephalica (-us)

- Dirsh, 1966 (comb. nov.), p. 241-242, fig. 112 ~ 1970, p. 277-278

- Fishpool & Popov, 1984, [p. 395]

- Jago, 1984, p. 358-359, figs. 163-167

- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 20, 186-187

- Otte, 1995a, p. 310

Pyrganthermus cephalicus

- Chapman, 1962, p. 29


- Dirsh, 1956a, p. 25, figs. 30-33 ~ 1956c, p. 275, pl. 34 : f. 7 ~ 1965, p. 348, fig. 273

- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236-237

- Jago, 1968, p. 267-268

- Johnston, 1956, p. 335 ~ 1968, p. 244

- Uvarov, 1953b, p. 34, 35-36, fig. 28



Madimbania cephalica

Distribution géographique

Bénin (Fishpool, *comm. pers.* • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **R. centrafricaine** (Dirsh, 1956a, 1965, Ramme, 1929)

L'aire de répartition vers l'est s'étend jusqu'à l'Éthiopie, et vers le sud jusqu'à l'Angola et à la Zambie. Dirsh et Uvarov citent le Cameroun mais, faisant référence au matériel type de Ramme (*A. uamicus*), c'est une erreur.

Iconographie

Habitus (im. : Dirsh, 1965♂, 1966♂ • Jago, 1984♂ • Ramme, 1929♀, sous *A. longiceps*) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a, 1965, 1966 • Jago, 1984 • Miller, 1929, sous *A. acutifrons* • Ramme, 1929, sous *A. longiceps* • Uvarov, 1953b) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965 • Jago, 1984)

Bio-écologie

Aucune information.

Madimbania madimbana (Giglio-Tos, 1907)

Allotriusia madimbana Giglio-Tos, 1907, p. 14-15.
Holotype femelle, Zaïre, Madimba, MRSN Turin.

Synonymes

Catantops pamae Ramme, 1929, p. 432-433, pl. 13 : f. 3, 4. Holotype mâle, République centrafricaine, MNHU Berlin
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Madimbania madimbana*]
Madimbania obesa Uvarov, 1953b, p. 20, 25-26, fig. 11. Holotype mâle, Angola, NHM Londres
[Dirsh, 1966, p. 240, avec *Madimbania madimbana*]

Citations bibliographiques

Allotriusia madimbana

- Kirby, 1910, p. 444

Catantops madimbanus

- Ramme, 1929, p. 431, pl. 13 : f. 2

Catantops pamae

- Ramme, 1929, p. 432-433, pl. 13 : f. 3, 4

Madimbania madimbana

- Dirsh, 1956a, p. 21, 23, 24, figs. 17-23 ~ 1956c, p. 275, pl. 34 : f. 6 ~ 1965, p. 355, 356, fig. 280 ~ 1966, p. 240-241, fig. 111 ~ 1970, p. 276-277, fig. 88

Madimbania madimbana (suite)


- Jago, 1984, p. 358-359

- Johnston, 1956, p. 335-336 ~ 1968, p. 248

- Otte, 1995a, p. 310-311

Madimbania obesa

- Dirsh, 1956a, p. 21, 23, 24, figs. 17, 27-29



Distribution géographique

R. centrafricaine (Dirsh, 1956a, 1965, 1966 • Ramme, 1929)

Dirsh cite le Cameroun mais, faisant référence au matériel type de Ramme (*C. pamae*), c'est une erreur. L'espèce est également citée du Congo, de R.D. Congo (ex-Zaire), d'Angola et de Zambie.

Iconographie

Habitus (im. : Dirsh, 1965♀, 1966♂, 1970♀ • Ramme, 1929, sous *C. madimbanus* ♀ et sous *C. pamae* ♂♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a, sous *M. madimana* et *M. obesa*, 1965, 1966, 1970 • Uvarov, 1953b, sous *M. obesa*) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965, 1970)

Bio-écologie

Aucune information.