

*Mastachopardia* Descamps, 1964, p. 30, 63-64  
Espèce-type : *Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964

Genre afrotropical comprenant neuf espèces selon Descamps (1974).

**Clés spécifiques** : Descamps (1967a : ♂ 2 espèces, ♀ 2 espèces - 1974 : ♂ 3 espèces, ♀ 7 espèces).


### ***Mastachopardia digitata* Descamps, 1974**

*Mastachopardia digitata* Descamps, 1974, p. 833, 834, 835-837, figs. 28-30, 39-44.  
Holotype mâle, République centrafricaine, La Maboké, MNHN Paris.

#### **Citations bibliographiques**

*Mastachopardia digitata*

- Descamps, 1973, p. 251, pl. 30 : f. 455-457 ~ 1974, p. 833, 834, 835-837, figs. 28-30, 39-44
- Otte, 1994a, p. 65



#### **Distribution géographique**

**R. centrafricaine** (Descamps, 1974)

Cette espèce n'est citée que par le matériel type de ce pays.

#### **Iconographie**

**Habitus (?) - Autres morph.** (Descamps, 1973, 1974) - **Anat.** (génit. ♂ : Descamps, 1973, 1974)

#### **Bio-écologie**

Aucune information.

### ***Mastachopardia jagoi* Descamps, 1964**

*Mastachopardia jagoi* Descamps, 1964, p. 65-68, fig. 64b-64g.  
Holotype mâle (dernier stade juvénile), Liberia, N.E. of Bomi Hills, mining area N. of Monrovia, NHM Londres.

Descamps indiquait, en l'absence de femelle et ne connaissant pas le mâle de *M. zougueana* (voir plus loin), que la position de *M. jagoi* était provisoire. Aucun élément nouveau n'a été apporté depuis et la conspécificité des deux espèces n'est pas exclue.

#### **Citations bibliographiques**


*Mastachopardia jagoi*

- Descamps, 1964, p. 65-68, fig. 64b-64g ~ 1967a, p. 307 ~ 1974, p. 833
- Johnston, 1968, p. 7
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 17, 187
- Otte, 1994a, p. 65

**Distribution géographique**

**Liberia** (Descamps, 1964, 1974 • Mestre & Chiffaud, 1997)

C'est la seule signalisation de cette espèce, connue uniquement par l'holotype mâle (juvénile de dernier stade) et rapporté provisoirement au genre *Mastachopardia* par Descamps.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Descamps, 1964) - **Anat.** (génit. ♂ : Descamps, 1964)

**Bio-écologie**

Aucune donnée précise. L'holotype a été collecté dans une clairière forestière en cours de recolonisation par de petits arbres.

***Mastachopardia mirei* Descamps, 1974**


*Mastachopardia mirei* Descamps, 1974, p. 834, 835, 838, figs. 34-36.

Holotype femelle, Cameroun, Oyak, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques**

*Mastachopardia mirei*

- Descamps, 1974, p. 834, 835, 838, figs. 34-36
- Otte, 1994a, p. 65

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Descamps, 1974)

L'espèce n'est connue que par l'holotype.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Descamps, 1974) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964**

*Mastachopardia zougueana* Descamps, 1964, p. 61, 64-65, figs. 62-64, 64a.  
Holotype femelle, Guinée, Nimba, Camp Zougoué, MNHN Paris.

Le mâle, inconnu de Descamps, n'a pas encore été décrit malgré l'indication d'un matériel collecté relativement abondant faite par Couturier *et al.* (1984).

**Citations bibliographiques**

*Euschmidtia* sp. (spécimen femelle = holotype *M. zougueana* Descamps)

- Dirsh, 1963b, p. 207

*Mastachopardia zougueana*

- Couturier *et al.*, 1984, p. 156, 167, 168, 170, 176

- Delarze & Le Gall, 1989, p. 277

- Descamps, 1964, p. 61, 64-65, figs. 62-64, 64a ~ 1967a, p. 308 ~ 1973, p. 225, fig. 47 ~ 1974, p. 833, 834, figs. 23-24

- Johnston, 1968, p. 7


- Le Gall, 1986, p. 37, 50, 77, 257, 266

- Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60

- Mestre, 1988, p. 38-39, fig. 5 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 17, 187

- Otte, 1994a, p. 65

- Roy, 2003, 314-315, 385, fig. 1



**Distribution géographique**

**Côte d'Ivoire** (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Descamps, 1964 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Descamps, 1964, 1974 • Dirsh, 1963b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - **AO** (Mestre, 1988)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**Iconographie**

**Habitus** (im. ♀ : Descamps, 1964, 1973 • Roy, 2003) - **Autres morph.** (Descamps, 1964, 1974 • Mestre, 1988) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

En forêt de Taï (Couturier *et al.*, 1984), l'essentiel des captures a été fait en forêt ombrophile et cette espèce est indiquée comme caractéristique de la haute canopée. Quelques rares autres spécimens ont été collectés dans des milieux ouverts en voie de fermeture.

Les autres signalisations se réfèrent à de rares individus, souvent même un seul, et ne fournissent aucune information précise.