

Phryganomelus Jago, 1983c, p. 152
Espèce-type : *Odontomelus fullonius* Karsch, 1896

Genre afrotropical incluant six espèces microptères des milieux ouverts de la zone forestière.

Clé spécifique : Jago (1983c, 5 espèces)

***Phryganomelus biafrensis* (I. Bolívar, 1905)**

Odontomelus biafrensis I. Bolívar, 1905b, p. 219-220.

Syntypes mâle(s), femelle(s), Guinée Équatoriale, Biafra, Cabo San Juan, MNCN Madrid.

Synonymes

Odontomelus subtusminiatus Ramme, 1929, p. 256-257, pl. 3 : f. 5-6. Holotype mâle, Cameroun, Bipindi, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 1 paratype femelle)
[Descamps & Donskoff, 1968, p. 1220, avec *Odontomelus biafrensis*]

Citations bibliographiques

Odontomelus biafrensis


- Descamps & Donskoff, 1968, p. 1220 (clé), 1221, 1222, 1223, 1224, figs. 13, 15, 18, 20, 23, 28d
- Dirsh, 1965, p. 410, 411
- Johnston, 1956, p. 646
- Ramme, 1929, p. 255, 257

Odontomelus subtusminiatus

- Dirsh, 1965, p. 410, 411
- Johnston, 1956, p. 648
- Ramme, 1929, p. 256-257, pl. 3 : f. 5-6

Phryganomelus biafrensis

- Jago, 1983c (comb. nov.), p. 153 (clé), 154, 156-157, fig. 10
- Otte, 1995b, p. 301



Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • Ramme, 1929)

L'espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.

Iconographie

Habitus (im. : Ramme, 1929♂♀, sous *O. subtusminiatus*) - **Autres morph.** (Descamps & Donskoff, 1968 • Jago, 1983c, holotype *O. subtusminiatus*) - **Anat.** (génit. ♂ : Descamps & Donskoff, 1968)

Bio-écologie

Aucune information.

***Phryganomelus romi* (I. Bolívar, 1908)**

Odontomelus romi I. Bolívar, 1908c, p. 94-95.

Type femelle, Zaïre, Kassongo à Stanley Falls, IRSN Bruxelles.


Citations bibliographiques

Odontomelus romi

- Descamps & Donskoff, 1968, p. 1220 (clé), 1221, 1222, 1223, 1224, figs. 17, 19, 22, 28c
- Dirsh, 1965, p. 410, 411
- Johnston, 1956, p. 647
- Ramme, 1929, p. 255-256

Phryganomelus romi

- Jago, 1983c (comb. nov.), p. 153 (clé), 154, 158-159, figs. 12-13
- Otte, 1995b, p. 301-302



Distribution géographique

R. centrafricaine (Descamps & Donskoff, 1968)

Cette signalisation est indiquée comme " suspecte " par Jago (1983c). L'espèce est également signalée d'Angola et de R.D. Congo (ex-Zaïre).

Iconographie

Habitus (?) - Autres morph. (Descamps & Donskoff, 1968 • Jago, 1983c) - **Anat.** (génit. ♂ : Descamps & Donskoff, 1968)

Bio-écologie

Aucune information.