

*Pteropera* Karsch, 1891, p. 185-186, 189  
Espèce-type : *Pteropera verrucigena* Karsch, 1891

Genre afrotropical comprenant 27 espèces selon la révision de Donskoff (1981).

**Clés spécifiques** : Bruner (1920, 4 espèces), Donskoff (1981, 27 espèces), Ramme (1929, 7 espèces).


### ***Pteropera bertii* Donskoff, 1981**

*Pteropera bertii* Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 55, 56, figs. 21, 23, 28.  
Holotype mâle, Cameroun, N'Koemvone, Ebolowa, MNHN Paris.

#### **Citations bibliographiques**

*Pteropera bertii*

- Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 55, 56, figs. 21, 23, 28
- Otte, 1995a, p. 331



#### **Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

#### **Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Donskoff, 1981)

#### **Bio-écologie**

Aucune information.

### ***Pteropera carnapi* Ramme, 1929**

*Pteropera carnapi* Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 364-365, figs. 64g, 65e.  
Holotype mâle, Cameroun, Yaunde [= Yaoundé], MNHU Berlin (DORSA : holotype + paratype femelle).

#### **Synonymes**

*Pteropera biloloca* Sjöstedt, 1931a, p. 28-29, 63, pl. 3 : f. 6, 6a, 6b, 6c. Syntypes mâle, femelles, République Centrafricaine, NR Stockholm.  
[Donskoff, 1981, p. 59, avec *Pteropera carnapi*]

#### **Citations bibliographiques**


*Pteropera biloloca*

- Dirsh, 1965, p. 338, 339
- Johnston, 1956, p. 291 ~ 1968, p. 239
- Sjöstedt, 1931a, p. 28-29, 63, pl. 3 : f. 6, 6a, 6b, 6c

Ces auteurs citent l'espèce du Cameroun, mais Bilolo, la localité type est en République centrafricaine.

*Pteropera carnapi*

- Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 43 : f. 20 ~ 1965, p. 338, 339, fig. 263
- Donskoff, 1981, p. 36, 38, 42-50 (clés espèces), 59-60, figs. 4, 15, 22, 23, 31
- Johnston, 1956, p. 291
- Kevan, 1956b, p. 963
- Otte, 1995a, p. 331
- Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 364-365, figs. 64g, 65e

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Kevan, 1956b • Ramme, 1929) - **R. centrafricaine** (Donskoff, 1981 • Sjöstedt, 1931)

L'espèce est également citée du Gabon et du Congo (= R.P. Congo).

**Iconographie**

**Habitus** (Dirsh, 1965♂ • Sjöstedt, 1931♂, sous *P. biloloca*) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1931♂, sous *P. biloloca*) - **Anat.** (génit. : Dirsh, 1956c♂, 1965♂ • Donskoff, 1981♂♀)

**Bio-écologie**


Aucune information.

***Pteropera descampsi* Donskoff, 1981**

*Pteropera descampsi* Donskoff, 1981, p. 38, 42-50 (clés espèces), 63, 64, figs. 10, 21, 23, 34.  
Holotype mâle, Cameroun, Onguot, Yaoundé, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques***Pteropera descampsi*

- Donskoff, 1981, p. 38, 42-50 (clés espèces), 63, 64, figs. 10, 21, 23, 34
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera karschi zenkeri* Ramme, 1929**

*Pteropera zenkeri* Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 362-363, figs. 64d, 65d, 66, pl. 8 : 12, 13.

Holotype mâle, Cameroun, Bipindi, " Urwald ", MNHU Berlin (DORSA : ? holotype(s) + paratypes ; erreur car 2 " holotypes ", aucun des deux n'ayant la date de collecte fournie dans la description, problème que l'on retrouve partiellement avec les dates fournies pour les paratypes).


**Citations bibliographiques**

*Pteropera zenkeri*

- Dirsh, 1965, p. 338, 339
- Johnston, 1956, p. 292 ~ 1968, p. 239
- Kevan, 1956b, p. 963
- Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 362-363, figs. 64d, 65d, 66, pl. 8 : 12, 13

*Pteropera karschi zenkeri*

- Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 71, fig. 22 (stat. nov.)
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Kevan, 1956b • Ramme, 1929)

L'espèce est également citée du Gabon et de Guinée Équatoriale.

**Iconographie**

**Habitus** (im. ♂♀ : Ramme, 1929) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981 • Ramme, 1929) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera mirei* Donskoff, 1981**

*Pteropera mirei* Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 74, 75, figs. 22, 23, 42.

Holotype mâle, Cameroun, N'Koemvone, Ebolowa, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques**


*Pteropera mirei*

- Donskoff, 1981, p. 42-50 (clés espèces), 74, 75, figs. 22, 23, 42
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981)

L'espèce est également citée du Gabon.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera teocchii* Donskoff, 1981**


*Pteropera teocchii* Donskoff, 1981, p. 34, 35, 37, 42-50 (clés espèces), 81, 82, figs. 1, 2, 3, 5, 21, 24, 47.

Holotype mâle, République centrafricaine, La Maboké, MNHN Paris.

**Citations bibliographiques**

*Pteropera teocchii*

- Donskoff, 1981, p. 34, 35, 37, 42-50 (clés espèces), 81, 82, figs. 1, 2, 3, 5, 21, 24, 47
- Otte, 1995a, p. 332

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Donskoff, 1981) - **R. centrafricaine** (Donskoff, 1981)

L'espèce est également citée du Congo (= R.P. Congo).

**Iconographie**

**Habitus** (im. : Donskoff, 1981 ♂♀) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera uniformis* Bruner, 1920**


*Pteropera uniformis* Bruner, 1920, p. 112.

Holotype mâle, Cameroun, Batanga, ANS Philadelphie ? (non listé sur site Internet ANSP).

**Citations bibliographiques**

*Pteropera uniformis*

- Bruner, 1920, p. 112
- Dirsh, 1965, p. 338, 339
- Donskoff, 1981, p. 38, 42-50 (clés espèces), 84-85, figs. 9, 14, 21, 23, 49
- Johnston, 1956, p. 292
- Otte, 1995a, p. 332
- Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 364, figs. 64H(?), 65f (?)

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965 • Donskoff, 1981 • Ramme, 1929)

L'espèce n'est citée que du Cameroun.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981 • Ramme, 1929 (?)) - **Anat.** (génit. ♂♀: Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.

***Pteropera verrucigena* Karsch, 1891**

*Pteropera verrucigena* Karsch, 1891, p. 186-187.

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station. Lectotype mâle désigné par Donskoff (1981, p. 85), MNHU Berlin (DORSA : lectotype + paralectotype femelle).

**Citations bibliographiques**

*Pteropera verrucigena*

- |   |   |
|---|---|
| - Bruner, 1920, p. 112  | - Johnston, 1956, p. 292  |
| - Dirsh, 1965, p. 338, 339 ~ 1966, p. 226-227, fig. 102 ~ 1970, p. 252-253, fig. 78 | - Karsch, 1891, p. 186-187  |
| - Donskoff, 1981, p. 36, 39, 42-50 (clés espèces), 85, 86, figs. 4, 19, 21, 24, 50  | - Otte, 1995a, p. 332-333   |
| - Johnsen, 1971, p. 34, 35, 36, pl. 10 : f. 7                                       | - Ramme, 1929, p. 358-360 (clé espèces), 361, 484, figs. 64c, 65a |
|   | - Sjöstedt, 1910, p. 7  |

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Donskoff, 1981 • Karsch, 1891 • Sjöstedt, 1910)

L'espèce est également citée d'Angola et de R.D. Congo (ex-Zaïre).

**Iconographie**

**Habitus** (im. ♀ : Dirsh, 1966) - **Autres morph.** (Donskoff, 1981 • Johnsen, 1971) - **Anat.** (génit. ♂♀ : Dirsh, 1966, 1970 • Donskoff, 1981)

**Bio-écologie**

Aucune information.