

Pterotiltus Karsch, 1893, p. 108
 Espèce-type : *Pygostolus impennis* Karsch, 1891

Syn.: *Pygostolus* Karsch, 1891, p. 192-193 (nom. praeoc) [Karsch, 1893, avec *Pterotiltus*, n. nov.]

Genre afrotropical d'une dizaine d'espèces qui nécessite une révision. Elles sont connues, hormis une espèce de la frontière Ghana-Togo, des forêts du Sud-Cameroun et de l'île de Bioko (ex-Fernando Poo), du Congo, de l'ouest de la R.D. Congo et d'Ouganda.


Clé spécifique : Ramme (1929, 10 espèces).

***Pterotiltus apicalis rubroantennatus* Ramme, 1929**

Pterotiltus apicalis rubroantennatus Ramme, 1929, p. 315-316.
 Holotype mâle, Cameroun, Ossindige [= Mamfé], MNHU Berlin (DORSA : holotype + 3 paratypes femelles).

Citations bibliographiques

- Pterotiltus apicalis rubroantennatus*
- Johnston, 1956, p. 258
 - Otte, 1995a, p. 130
 - Ramme, 1929, p. 313 (clé espèces), 315-316



Distribution géographique

Cameroun (Ramme, 1929)

Cette espèce est également signalée de R.D. Congo (ex-Zaire).

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

***Pterotiltus coeruleocephalus* I. Bolívar, 1905**

Pterotiltus coeruleocephalus I. Bolívar, 1905b, p. 227-228.
 Type mâle, Cameroun, MNCN Madrid.


Citations bibliographiques

- Pterotiltus coeruleocephalus*
- I. Bolívar, 1905, p. 227-228
 - Hollis, 1975, p. 226
 - Johnston, 1956, p. 258
 - Kirby, 1910, p. 386
 - Otte, 1995a, p. 130
 - Ramme, 1929, p. 312 (clé espèces), 313-314, figs. 34c, 35b
- Pterotiltus impennis*
- Sjöstedt, 1910, p. 8-9 (Err. dét. selon Ramme, 1929, p. 313)

Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • I. Bolívar, 1905b • Hollis, 1975 • Sjöstedt, 1910) -

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**Iconographie**

Habitus (?) - **Autres morph.** (Ramme, 1929) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

***Pterotiltus femoratus* Ramme, 1929**


Pterotiltus femoratus Ramme, 1929, p. 314-315, figs. 34d, 35c.

Holotype mâle, Cameroun, Victoria, NHM Londres (DORSA : 1 paratype femelle).

Citations bibliographiques

Pterotiltus femoratus

- Hollis, 1975, p. 226
- Johnston, 1956, p. 259
- Otte, 1995a, p. 130
- Ramme, 1929, p. 313 (clé espèces), 314-315, figs. 34d, 35c

**Distribution géographique**

Cameroun (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Ramme, 1929) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

***Pterotiltus impennis* (Karsch, 1891)**

Pygostolus impennis Karsch, 1891, p. 193-194, 2 figs.

Syntypes mâles, femelle (s), Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 3 syntypes mâles, 2 femelles).

Synonymes

Pterotiltus impennis var. *multicolor* I. Bolívar, 1905b, p. 228-229. Type sans précision, Cameroun, dépositaire ? [Ramme, 1929, p. 313, avec *Pterotiltus impennis*]

Citations bibliographiques

Pygostolus impennis

- Karsch, 1891, p. 193-194, 2 figs.

Pterotiltus impennis

- Dirsh, 1965, p. 235, 236, fig. 179a,b

- Hollis, 1975, p. 226, 227, fig. 64

- Johnston, 1956, p. 259 ~ 1968, p. 173

- Kirby, 1910, p. 386

- Otte, 1995a, p. 130-131

Pterotiltus impennis var. *multicolor*

- I. Bolívar, 1905b, p. 228-229


- Ramme, 1929, p. 312 (clé espèces), 313, 314, figs.

33, 34a

- Rowell, 2005, p. 35, 37, 40, figs. 2B, 4, 6

- Sjöstedt, 1910, p. 8-9

- Uvarov, 1977, p. 375



Distribution géographique

Cameroun (I. Bolívar, 1905b • Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Karsch, 1891 • Sjöstedt, 1910)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

Bio-écologie

Aucune information.


Iconographie

Habitus (im. : Dirsh, 1965♂ • Karsch, 1891♂)

- **Autres morph.** (Dirsh, 1965 • Karsch, 1891

• Ramme, 1929 • Rowell, 2005) - **Anat.**

(génit.: Hollis, 1975♂ • Rowell, 2005♂♀)



Pygostylus impennis d'après Karsch (1891)

***Pterotiltus inuncatus* (Karsch, 1892)**

Pygostolus inuncatus Karsch, 1892, p. 72-73.

Syntypes mâles, femelle, Cameroun, Buea, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes mâles, 1 femelle).

Citations bibliographiques

Pterotiltus inuncatus

- Chopard, 1945

- Dirsh, 1956c, p. 276, pl. 38 : f. 15 ~ 1961, p. 401,

fig. 24.6 ~ 1965, p. 235, 236, fig. 179c

- Hollis, 1975, p. 226, fig. 67

- Johnston, 1956, p. 259 ~ 1968, p. 173

Pygostolus inuncatus

Karsch, 1892, p. 72-73

- Kirby, 1910, p. 387

Medler, 1980, p. 41

- Otte, 1995a, p. 130


- Ramme, 1929, p. 312 (clé espèces)

- Uvarov, 1935, p. 210

Distribution géographique

Cameroun (Chopard, 1945 • Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Karsch, 1892 • Uvarov, 1935) - ? **Nigeria** (Medler, 1980)

Medler ne précise pas de localité pour le Nigeria et sa signalisation doit être confirmée. Elle n'est pas à exclure même si les localités du Cameroun recensées pour cette espèce sont situées à une certaine altitude (800 à 1500 m).

**Iconographie**

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965 • Hollis, 1975)

Bio-écologie

Aucune information.

***Pterotiltus miniatulus* Karsch, 1893**


Pterotiltus miniatulus Karsch, 1893, p. 108-109.

Syntypes mâles [fourchette de taille], femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 6 syntypes, 4 mâles et 2 femelles).

Citations bibliographiques

Pterotiltus miniatulus

- I. Bolívar, 1905, p. 226
- Cornes & Riley, 1972, p. 8
- Dirsh, 1965, p. 235, 236
- Hollis, 1975, p. 226, 227, fig. 65
- Jago, 1967b, p. 241 ~ 1968, p. 246-247
- Johnston, 1956, p. 259-260
- Karsch, 1893, p. 108-109
- Kirby, 1910, p. 387
- Medler, 1980, p. 41
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 ~ 2006, p. 18, 245
- Otte, 1995a, p. 131
- Popov, 1971, appendice p. 2
- Ramme, 1929, p. 312 (clé espèces)

**Distribution géographique**

Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1971) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Les signalisations du Nigeria, qui ne précisent rien des localités et des déterminateurs, doivent être confirmées. Cette espèce est également signalée de Guinée Équatoriale, mais la détermination est douteuse. Cette signalisation provient de I. Bolivar (1905) qui indique « un ♂ que parece referirse bien á la especie », avant les diverses descriptions d'espèces de Ramme.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (génit. ♂ : Hollis, 1975)

Bio-écologie

Aucune information.


Pterotiltus minimus Ramme, 1929

Pterotiltus minimus Ramme, 1929, p. 318-319, fig. 36, pl. 6 : f. 23.
Holotype mâle, Cameroun, Bamenda, MNHU Berlin (DORSA : holotype).

Citations bibliographiques

Pterotiltus minimus

- Hollis, 1975, p. 227, 228, fig. 68
- Johnston, 1956, p. 260
- Otte, 1995a, p. 131
- Ramme, 1929, p. 313 (clé espèces), 318-319, fig. 36, pl. 6 : f. 23



Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

Iconographie

Habitus (im. ♂ : Ramme, 1929) - **Autres morph.** (Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂ : Hollis, 1975)

Bio-écologie

Aucune information.

Pterotiltus occipitalis Ramme, 1929

Pterotiltus occipitalis Ramme, 1929, p. 317-318
Holotype femelle, Cameroun, Yaunde [= Yaoundé], MNHU Berlin (DORSA : holotype)

Citations bibliographiques


Pterotiltus occipitalis

- Chopard, 1945, p. 177
- Hollis, 1975, p. 227, 228, fig. 66
- Johnston, 1956, p. 260
- Otte, 1995a, p. 131
- Ramme, 1929, p. 313 (clé espèces), 317-318

Distribution géographique

Cameroun (Chopard, 1945 • Dirsh, 1965 • Hollis, 1975 • Ramme, 1929)

Cette espèce est également signalée de R.D. Congo (ex-Zaïre).

**Iconographie**

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (génit. ♂ : Hollis, 1975)

Bio-écologie

Aucune information.