

Ritchiella Mungai, 1992, p. 262-265

Espèce-type : *Acridium* (*Cyrtacanthacris*) *sanguineum* Sjöstedt, 1912, p. 23-24, pl. 3 : f. 3

Genre afrotropical révisé par Mungai (1992) et comprenant cinq espèces incluses auparavant dans le genre *Chondracris*, genre maintenant considéré circonscrit à la région orientale. On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur l'autre espèce du genre présente en Afrique de l'Ouest à savoir *R. baumanni* (Karsch).

Clé spécifique : Mungai (1992, 5 espèces).

***Ritchiella uvarovi* (Sjöstedt, 1924)**

Chondracris uvarovi Sjöstedt in Uvarov, 1924c, p. 107, 109.

Syntypes mâle(s), femelle(s), Tanzanie, Manow, NR Stockholm. Lectotype mâle et paralectotypes femelles désignés par Mungai (1992, p. 274).

L'espèce apparaît la première fois, de manière très sommaire, dans Uvarov (1924c) à partir d'informations provenant de Sjöstedt. Uvarov indique qu'une description détaillée sera fournie ultérieurement par cet auteur. Elle ne réapparaîtra en fait, sans beaucoup plus de détails, que dans le catalogue des types du NR Stockholm dressé par Sjöstedt en 1932.


Citations bibliographiques

Chondracris uvarovi

- Dirsh, 1965, p. 387, 388
- Johnston, 1956, p. 385, 386 ~ 1968, p. 281
- Ramme, 1929, p. 342
- Sjöstedt, 1932, p. 39, 67-68, 89, pl. 19 : f. 1
- Uvarov, 1924c, p. 107, 109

Ritchiella uvarovi

- Mungai, 1992, p. 256, 273, 274-275 (comb. nov.), fig. 31
- Otte, 1995b, p. 20



Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • Mungai, 1992 • Ramme, 1929)

Cette espèce est par ailleurs citée du Kenya et de Tanzanie.

Iconographie

Habitus (im. : Sjöstedt, 1932♀) - **Autres morph.** (Sjöstedt, 1932) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.