

*Stenocrobylus* Gerstäcker, 1869, p. 219-220

Espèce-type : *Stenocrobylus cervinus* Gerstäcker, 186, p. 220

Genre afrotropical comprenant une douzaine d'espèces.

On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur la quatrième espèce ouest-africaine à savoir *S. festivus* Karsch, espèce la plus commune dont le type est du Cameroun.

**Clés spécifiques** : Bruner (1920, 9 espèces) - Dirsh (1966, 3 espèces d'Angola ~ 1970, 4 espèces de R.D. Congo).

### ***Stenocrobylus catantopoides* Bruner, 1920**

*Stenocrobylus catantopoides* Bruner, 1920, p. 116-118.


Syntypes mâle et femelle, Cameroun, Batanga, CMNH Pittsburg ? selon Otte (1995a) et OSF.

Uvarov (1953, p. 42) indique le statut incertain, la description insuffisante et ne pas avoir pu examiner le type de cette espèce ; il évoque la possibilité qu'il s'agisse d'une sous-espèce de *S. festivus*.

#### **Citations bibliographiques**

*Stenocrobylus catantopoides*

- Bruner, 1920, p. 116-118
- Dirsh, 1956a, p. 145 ~ 1965, p. 322, 323
- Jago, 1984, p. 366
- Johnston, 1956, p. 345 ~ 1968, p. 228
- Otte, 1995a, p. 250
- Uvarov, 1953, p. 42



#### **Distribution géographique**

**Cameroun** (Bruner, 1920)

L'espèce n'est signalée que par la série type.

#### **Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

#### **Bio-écologie**

Aucune information.

### ***Stenocrobylus cinnabarinus* Ramme, 1929**

*Stenocrobylus cinnabarinus* Ramme, 1929, p. 452, pl. 14 : f. 3.

Holotype femelle, République centrafricaine, Bosum, Uamgebiet, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 2 paratypes femelles).

### Citations bibliographiques


#### *Stenocroblylus cinnabarinus*

- Descamps, 1965a, p. 953, 958-959, figs. 19-23
- Dirsh, 1956a, p. 144 ~ 1965, p. 322, 323
- Jago, 1984, p. 366
- Johnston, 1956, p. 345 ~ 1968, p. 229
- Lecoq, 1980b, p. 555-556, fig. 21
- Le Gall, 1986, p. 89, 206, 258, 269 ~ 1989, p. 249
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 57, 61
- Mestre, 1988, p. 138-139, figs. 4-6
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 271-272
- Otte, 1995a, p. 250
- Ramme, 1929, p. 452, pl. 14 : f. 3
- Roy, 1967, p. 1559-1560


#### ? *Stenocroblylus* sp.

- Jago, 1967b, p. 261 ~ 1968, p. 270

La description de cette espèce indéterminée, faite par Jago (1967b), espèce différente de *S. festivus* (citée aussi par cet auteur), est tout à fait conforme à *S. cinnabarinus* et nous y rapportons cette signalisation sans précision de localité.



*Stenocroblylus cinnabarinus* femelle d'après Mestre (1988)



*Stenocroblylus cinnabarinus*

### Distribution géographique

**Côte d'Ivoire** (Le Gall, 1986, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968) - **Guinée** (*mat. exam.*) - **Mali** (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **R. centrafricaine** (Ramme, 1929) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1967 • *mat. exam.*) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce. Sa présence du Bénin au Cameroun est donc certaine.

### Iconographie

**Habitus** (im. : Mestre, 1988♀ • Ramme, 1929♀) - **Autres morph.** (Descamps, 1965a • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂ : Descamps, 1965a)

### Bio-écologie

L'espèce a été peu collectée et il n'y a aucune information précise.

Le Gall (1986, 1989) l'indique comme presque toujours collectée dans les savanes à couvert arbustif ou arboré dense sur ou près de *Porospermum*

*febrifugum*, un arbuste de la famille des Hypéricacées.

C'est sur un arbuste de la même famille que s'observe surtout, et se nourrit, *Stenocroblylus festivus*.

### *Stenocroblylus roseus* Giglio-Tos, 1907

*Stenocroblylus roseus* Giglio-Tos, 1907b, p. 23-25.  
Type femelle, Zaïre, Madimba, MRSN Turin.

**Synonymes**

*Stenocrobylus cyaneus* I. Bolívar, 1908, p. 124. Syntypes femelles, Zaïre, IRSN Bruxelles  
[Ramme, 1929, p. 451, avec *Stenocrobylus roseus*]

**Citations bibliographiques**


- Stenocrobylus roseus*
- Bruner, 1920, p. 116 (clé)
  - Dirsh, 1956a, p. 145 ~ 1966, p. 219 ~ 1970, p. 234
  - Giglio-Tos, 1907b, p. 23-25
  - Johnston, 1956, p. 347 ~ 1968, p. 230
  - Otte, 1995a, p. 251
  - Ramme, 1929, p. 450, 451-452, 482, 483, fig. 93b, pl. 14 : f. 2
  - Uvarov, 1977, p. 305
  - Vesey-Fitzgerald, 1966, p. 360

**Distribution géographique**

**R. centrafricaine ?** (Dirsh, 1966, 1970 • Ramme, 1929)

Les signalisations de Dirsh parlent du Cameroun mais, faisant apparemment référence à Ramme (1929), sont une erreur pour la République centrafricaine. Cette identification est à confirmer.

L'espèce est également signalée d'Angola, du Congo, de R.D. Congo (ex-Zaïre), de Tanzanie et de Zambie.

**Iconographie**

**Habitus** (im. : Ramme, 1929♀) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information.

En Zambie, Vesey-Fitzgerald (1966) observe des adultes en saison sèche s'abritant dans des morceaux de troncs en décomposition (de même que *S. festivus*).