

*Gryllus Acrida* Linnaeus, 1758, p. 427  
Espèce-type : *Gryllus Acrida turritus* Linnaeus, 1758,  
par désignation subséquente de Kirby (1910, p. 90, 92)

Ce genre d'une quarantaine d'espèces, à vaste répartition (afrotropicale, holarctique, orientale et australienne), a été et reste toujours très confus depuis la dernière révision de Dirsh (1954). L'apport des techniques d'identification moléculaire seraient sans doute très utiles dans la révision de ce genre.

En dehors de l'aspect purement systématique (identité des espèces d'Afrique de l'Ouest), la difficulté de diagnose rend en pratique la séparation des espèces délicate. Il y a donc très probablement de nombreuses confusions y compris dans les inventaires récents.

Quatre espèces seraient présentes dans notre zone selon Dirsh : *A. bicolor*, *A. confusa*, *A. sulphuripennis* et *A. turrita*. Dans l'impossibilité de les distinguer, notamment dans des relevés de terrain à vue, certaines signalisations regroupent ces espèces. C'est que nous avons indiqué sous l'appellation *Acrida* sp. qui inclut aussi des espèces considérées valides mais a priori non présentes en Afrique de l'Ouest.

**Clé** Dirsh (1949c, 14 espèces et 7 sous-espèces paléarctiques - 1954, 23 espèces mondiales - 1966, 5 espèces Angola) - Johnsen (1984a, espèces Zambie - 1991a, 5 espèces Botswana)

***Acrida bicolor*** (Thunberg, 1815)

*Truxalis bicolor* Thunberg, 1815, p. 266-267, pl. 3

Type mâle, origine inconnue (Afrique du Sud ?, selon Dirsh, 1954), ZI Uppsala. Spécimen désigné par Dirsh (1954, p. 140) comme type (=lectotype).

- Syn.** *Truxalis pellucida* Klug, 1830, texte non paginé, pl. 18: f. 5-9. Iconotype (Dirsh, 1949c), illust. Klug, pl. 18 : f. 7, Égypte (holotype mâle MNHU selon DORSA)  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Tryxalis stali* Bolívar, 1893a, p. 162 (clé), 164. Syntypes mâle(s), femelle(s), Sénégal, Sierra Leone, NR Stockholm selon Johnston, 1956 ; holotype mâle, Sénégal, MNCN Madrid selon Dirsh, 1954, p. 140.  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida orientalis* Bolívar, 1919, p. 242. Syntypes mâle(s), femelles(s)(holotype mâle selon Dirsh, 1954, p. 141), Éthiopie méridionale, MNHN Paris  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida deminuta* Bolívar, 1922, p. 183. Type mâle, Éthiopie (holotype selon Dirsh, 1954), MNHN Paris  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida tessellata* Sjöstedt, 1931b, p. 5, pl. 3 : f. 2. Syntypes mâles (holotype mâle selon Dirsh, 1954, p. 141), Burkina Faso, NR Stockholm  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida leopoldi* Sjöstedt, 1934, p. 1-2, fig. 1. Holotype mâle, R.D. Congo, IRSNB Bruxelles  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida pellucida algeriana* Dirsh, 1949c, p. 30 (clé), 32. Holotype mâle, Algérie, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida pellucida palaestina* Dirsh, 1949c, p. 30 (clé), 33. Holotype mâle, Israël, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida pellucida cypria* Dirsh, 1949c, p. 30 (clé), 34. Holotype mâle, Chypre, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida anatolica* Dirsh, 1949c, p. 30 (clé), 34-35. Holotype mâle, Turquie, NHM Londres  
[Dirsh, 1954, p. 140, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida mediterranea mediterranea* Dirsh, 1949c, p. 35 (clé), 36-37. Holotype mâle, Italie, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida mediterranea bosporica* Dirsh, 1949c, p. 35, 37-38. Holotype mâle, Turquie, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida mediterranea lombardica* Dirsh, 1949c, p. 35, 38. Holotype mâle, Italie, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida bicolor*]  
*Acrida meridionalis* Ramme, 1951, p. 384, 423. (nomen erratum pour *A. mediterranea*)  
[Dirsh, 1954, p. 140, avec *Acrida bicolor*]

Dirsh (1954) reconnaissait plusieurs sous-espèces sous *A. bicolor* dont pour l'Afrique sub-saharienne *bicolor*, *stali*, *orientalis* et *pellucida*.

**Citations bibliographiques**

<p><i>Acrida anatolica</i> -- Dirsh, 1949c, p. 21 (clé), 26, 34-35, 43, figs. 11, 31, 49, 59, 91, 102 (carte)</p> <p><i>Acrida bicolor</i> -- Chapman &amp; Robertson, 1958, p. 96, 97, 109, figs. 2A-d, 13 -- Chiffaud &amp; Mestre, 1992, p. 331 -- COPR, 1982, p. 374-375, carte 321 -- Cornes &amp; Riley, 1972, p. 11 -- Dahdouh <i>et al.</i>, 1978, p. 476-477</p>	<p><i>Acrida bicolor</i> (suite) -- Davey <i>et al.</i>, 1959b, p. 570-571 -- Descamps, 1965b, p. 1260, 1271, 1309 ~ 1967b, p. 656 ~ 1968, p. 561, 564 -- Descamps &amp; Le Breton, 1973, p. 120 -- Dirsh, 1954, p. 117, 124 (clé), 125, 140-143, fig. 10, carte 6 ~ 1965, p. 400, 401 ~ 1966, p. 360-362, fig. 184 ~ 1968, p. 491-493, fig. 46a-c ~ 1970, p. 393-396</p>	<p><i>Acrida bicolor</i> (suite) -- Duranton &amp; Lecoq, 1980, p. 151-164 -- Duranton <i>et al.</i>, 1982, p. 304, 305, 316, 319, 320, 844, 940, figs. 140C-d, 147, 441 ~ 1987, p. 176, 179, 208, pl. I : f. 25, pl. 25 : f. 1-5 -- Fishpool &amp; Popov, 1984, p. 350 -- Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 330-331 ~ 1996b, p. 128, fig. 8</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Acrida bicolor* (suite)

- Johnsen, 1981a, p. 89 ~ 1981b, p. 154 ~ 1984a, p. 282-283, fig. 253~1991a, p. 180-182, figs. 513-519
- Johnston, 1956, p. 655-656 ~ 1968, p. 286
- Kirby, 1910, p. 94
- Launois, 1978b, p. 40, 48, 176-177, figs. 1-5, pl. D3 : f. 70
- Launois-Luong, 1978a, p. 581-582 ~ 1980b, p. 774-814
- Launois-Luong & Launois, 1987, p. 176, 179, 208, pl. I : f. 25, pl. 25 : f. 1-5
- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 70-71, 1 carte
- Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 642-643, 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 564-566 ~ 1984 ~ 1988, p. 54-55, figs. non numérotées
- Medler, 1980, p. 37
- Mestre, 1988, p. 176, 177, figs. 4, 5AB, 6AB, 7AB
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 123 ~ 2006, p. 20, 40-41, 1 carte
- Mestre *et al.*, 2001, p. 319
- Otte, 1995b, p. 240-242
- Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 84 ~ 1977 ~ 1978
- Paraíso *et al.*, 2012, p. 35, 51
- Popov, 1989, p. 90, fig. non numérotée
- Popov *et al.*, 1990, p. 96-97, pl. 17

*Acrida bicolor* (suite)

- Roy, 1962, p. 133 ~ 1964b, p. 1187 ~ 1964c, p. 122 ~ 1967, p. 1562 ~ 1969a, p. 214 ~ 1970, p. 700 ~ 1971, p. 405
- Acrida mediterranea bosporica*
- Dirsh, 1949c, p. 25, 31, 35 (clé), 37-38, 43, figs. 12, 61, 71, 93, 102 (carte)
- Acrida mediterranea lombardica*
- Dirsh, 1949c, p. 25, 31, 35 (clé), 38, 43, figs. 14, 33, 62, 72, 94, 102 (carte)
- Acrida mediterranea mediterranea*
- Dirsh, 1949c, p. 25, 31, 35 (clé), 36-37, 43, figs. 13, 32, 60, 70, 92, 102 (carte)
- Acrida leopoldi*
- Sjöstedt, 1934, p. 1-2, fig. 2
- Acrida orientalis*
- Bolívar, 1922, p. 184-185, pl. Io2 : f. 4
- Acrida pellucida*
- Chopard, 1950, p. 137
- Acrida pellucida algeriana*
- Dirsh, 1949c, p. 25, 26, 30 (clé), 31, 32, 43, figs. 8, 27, 45, 55, 87, 102 (carte)
- Acrida pellucida cypria*
- Dirsh, 1949c, p. 25, 26, 30 (clé), 31, 34, 43 figs. 30, 48, 58, 90, 102 (carte)

*Acrida pellucida palaestina*

- Dirsh, 1949c, p. 25, 26, 30 (clé), 31, 33, 43 figs. 10, 29, 47, 57, 89, 102 (carte)
- Acrida pellucida pellucida*
- Dirsh, 1949c, p. 25, 26, 30 (clé), 30-32, 43, figs. 9, 28, 46, 88, 102 (carte)
- Acrida propinqua* (espèce d'Afrique australe, Err. dét. pour *A. bicolor* selon Dirsh, 1954, p. 134)
- Bruner, 1920, p. 97
- Burr, 1902, p. 171
- Jago, 1968, p. 331 (*A. propinqua* !)
- Johnston, 1956, p. 657
- Acrida stâli*
- Burr, 1902, p. 157 (clé), 169-170
- Acrida staeli*
- Kirby, 1910, p. 92
- Acrida sulphuripennis* (Err. dét., = *Tryxalis stali* selon Bolívar, 1893a, voir ci-après)
- Stål, 1873b, p. 95
- Acrida tessellata*
- Sjöstedt, 1931b, p. 5, 36, pl. 3 : f. 2
- Tryxalis stali*
- Bolívar, 1893a, p. 162 (clé), 164


**Distribution géographique**

**Bénin** (Mestre *et al.*, 2001 • Paraíso *et al.*, 2012 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Daoudouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • *mat. exam.*) - **Cameroun** (Bruner, 1920 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Gambie** (Johnsen, 1981a, 1991a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Burr, 1902 • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Guinée** (Johnsen, 1981b, 1991a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Liberia** (Johnsen, 1991a) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1950 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1968, 1996b • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978) - **Sénégal** (Bolívar, 1893a • Burr, 1902 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1954, 1966 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1967, 1969a, 1970 • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Bolívar, 1893a • Burr, 1902 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997 • Stål, 1873b) - **Tchad** (Descamps, 1967b, 1968 • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Duranton *et al.*, 1987 • Fishpool & Popov, 1984 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mestre, 1988 • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990)

*A. bicolor* est citée de toute l'Afrique sub-saharienne ainsi que de plusieurs pays du pourtour méditerranéen.

**Iconographie**

**Habitus** (*juv.*: Dirsh, 1968 • Klug, 1830, sous *T. pellucida* ♂ *im.*: Dirsh, 1968 ♂ • Duranton *et al.*, 1987 ♂♀ • Klug, 1830, sous *T. pellucida* ♂ • Launois, 1978b ♂♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 ♂♀ • Lecoq, 1988 ♂ • Popov *et al.*, 1990 ♀ • Sjöstedt, 1931b ♂, sous *A. tessellata*, 1934 ♂, sous *A. leopoldi*) - **Autres morph.** (Dirsh, 1949c, sous *A. anatolica*, *A. pellucida* ssp. et *A. mediterranea* ssp., 1954, 1966 • Duranton *et al.*, 1987 • Johnsen, 1984a, 1991a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Lecoq, 1988 • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1996b) - **Ooth.** (Chapman & Robertson, 1958 • Duranton *et al.*, 1982 • Popov *et al.*, 1990)

**Bio-écologie**

*Acrida orientalis* mâle  
d'après Bolívar (1922)

**Acrida confusa** Dirsh, 1954

*Acrida confusa* Dirsh, 1954, p. 131, fig. 4, carte 3  
Holotype mâle, Soudan, Gallard forest, NHM Londres

**Citations bibliographiques***Acrida confusa*

- Chapman, 1961, p. 276, 278 ~ 1962, p. 15, 51, fig. 42 (carte)
- Delarze & Le Gall, 1989, p. 278
- Dirsh, 1954, p. 114, 122 (clé), 125, 131-132, fig. 4, carte 3 ~ 1964, p. 67 ~ 1965, p. 400, 401 ~ 1966, p. 358-359, fig. 182 ~ 1970, p. 391-392
- Gillon, 1974a, p. 148

*Acrida confusa* (suite)


- Johnsen, 1984a, p. 284, 285, fig. 254
- Johnston, 1968, p. 287
- Launois, 1978b, p. 176, 178
- Lecoq, 1980b, p. 564-566
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62
- Medler, 1980, p. 37
- Mestre, 1988, p. 176, 177, figs. 5AC, 7AC

*Acrida confusa* (suite)

- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 ~ 2006, p. 20, 41, 1 carte
- Mestre *et al.*, 2001, p. 319
- Otte, 1995b, p. 242
- Phipps, 1970, p. 334
- Roy, 1964c, p. 122 ~ 2003, p. 354, 381, 388

**Distribution géographique**

**Bénin** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)  
- **Cameroun** (Dirsh, 1954, 1965, 1966) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Nigeria** (Medler, 1980) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Togo** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Dirsh, 1964 • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)



Cette espèce est citée de nombreux pays de l'Afrique sub-saharienne.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Dirsh, 1954, 1966 • Johnsen, 1984a • Mestre, 1988) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie****Acrida sulphuripennis** (Gerstäcker, 1869)

*Tryxalis sulphuripennis* Gerstäcker, 1869, p. 215-216  
Syntypes mâle(s), femelle(s), Sansibar (=Zanzibar), NHM Londres

**Citations bibliographiques***Acrida sulphuripennis*

- Bolívar, 1908c, p. 93
- Chopard, 1958a, p. 145
- COPR, 1982, p. 374, 375, carte 121
- Cornes & Riley, 1972, p. 11
- Davey *et al.*, 1959b, p. 571
- Descamps, 1965b, p. 1260
- Dirsh, 1954, p. 115, 123, 132-134, fig. 5, carte 4 ~ 1965, p. 400, 401 ~ 1966, p. 359-360, fig. 183 ~ 1970, p. 392-393
- Fishpool & Popov, 1984, p. 350
- Golding, 1946, p. 11, 34 ~ 1948, p. 529 (?)

*Acrida sulphuripennis* (suite)


- Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 331 ~ 1996b, p. 128, fig. 10
- Johnsen, 1981a, p. 89 ~ 1981b, p. 154 ~ 1984a, p. 284, 286, fig. 255 ~ 1991a, p. 182-184, figs. 520-527
- Johnston, 1956, p. 658-659 ~ 1968, p. 288
- Karny, 1915, p. 126
- Kirby, 1910, p. 92
- Launois, 1978b, p. 176, 178
- Lecoq, 1980b, p. 564-566
- Medler, 1980, p. 37
- Mestre, 1988, p. 176, 177, fig. 7AS

*Acrida sulphuripennis* (suite)

- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 ~ 2006, p. 20, 41-42, 1 carte
  - Otte, 1995b, p. 244-245
  - Popov, 1989, p. 90, 91, figs. non numérotées
  - Roy, 1964c, p. 122 ~ 2003, p. 353, 381, 388
- Tryxalis sulphuripennis*
- Bolívar, 1893a, p. 162 (clé), 164
  - Gerstäcker, 1869, p. 215-216 ~ 1873, p. xiii, 33-34, pl. 3 : f. 1

**Distribution géographique**

**Cameroun** (Bolívar, 1908c) - **Gambie** (Johnsen, 1981a, 1984a, 1991a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b, 1984a, 1991a • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (Johnsen, 1981b, 1984a, 1991a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 •



Golding, 1946, 1948 ? • Jago, 1968 • Medler, 1980) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968) - **Sierra Leone** (Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988 • Popov, 1989)

Cette espèce a été assez peu citée dans notre zone d'étude, d'autant qu'un certain nombre de signalisations sont en fait de simples reprises du travail de Dirsh (1954). Le matériel signalé de Sierra Leone par Stål a été rapporté à *T. stali* (devenu *A. bicolor*) par Bolívar (1893a).

Cette espèce est citée de nombreux pays de l'Afrique sub-saharienne, descendant jusqu'en Afrique du Sud.

### Iconographie

**Habitus** (juv.: Popov *et al.*, 1990 ▫ im.: Gerstäcker, 1873 ♂ • Johnsen, 1991a ♂) - **Autres morph.** (Dirsh, 1954, 1966 • Johnsen, 1984a, 1991a • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1996b)

### Bio-écologie




*Tryxalis sulphuripennis*  
mâle d'après  
Gerstäcker (1873)

## *Acrida turrita* (Linnaeus, 1758)

*Gryllus Acrida turritus* Linnaeus, 1758, p. 427

Type "Africa", perdu d'après Dirsh (1949c, 1954) qui désigne comme localité type l'Algérie. Jago (1996b) parle d'un lectotype femelle dans la collection de la Linnean Society of London ; ce statut n'est cependant pas indiqué pour ce spécimen par Marshall (1983) dans sa liste des types d'Orthoptéroïdes détenus par cette institution.



*Acrida turrita* (mat. exam.) d'après Mestre (1988, sans précision spécifique)

- Syn.** *Truxalis rufescens* Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 2. Type Afrique occidentale, depositaire ? (a priori perdu)  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]
- Truxalis tenuis* Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 3. Type mâle Afrique occidentale, depositaire ? (a priori perdu)  
[Kirby, 1910, p. 93, avec *Acrida turrita*]  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]
- Tryxalis carinulata* Bolívar, 1889a, p. 90-91. Type femelle, Îles du Cap-Vert ?<sup>(1)</sup>, perdu ? selon Dirsh (1954)  
[Dirsh, 1966, p. 356, avec *Acrida turrita*]
- Acrida turrita uvarovi* Bolívar, 1936, p. 408-409. Syntypes mâle(s), femelle(s), Maroc, MNCN Madrid  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]
- Acrida turrita tunetana* Dirsh, 1949c, p. 23 (clé), 25-26. Holotype mâle, Tunisie, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]
- Acrida turrita sicula* Dirsh, 1949c, p. 24 (clé), 27. Holotype femelle, Sicile, NHM Londres  
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 231, avec *Acrida turrita*]
- Acrida maroccana* Dirsh, 1949c, p. 21 (clé), 27-28. Holotype mâle, Maroc, NHM Londres  
[Dirsh, 1966, p. 356, avec *Acrida turrita*]
- Acrida maxima* Karny, 1907, mise en synonymie avec *A. turrita* par Dirsh & Uvarov (1953b), est admise valide par Jago (1996b).

(1) Bolívar (1889a,b) cite comme localité de collecte "Cabo Verde" pour plusieurs espèces. Kevan (1977) a considéré, en référence à la même indication pour *Phymateus cinctus*, qu'il s'agirait de la presqu'île du Cap Vert au Sénégal et non des îles du Cap-Vert. Cette hypothèse est étayée par le fait que d'autres espèces citées par Bolívar du même endroit n'ont jamais été retrouvées sur ces îles, dont *A. turrita*, alors qu'elles sont présentes au Sénégal (cf. notamment Duranton *et al.* 1983 et 1984). A l'inverse cependant, *Oedaleus senegalensis dimidiatus* (Bolívar, 1889a), sous-espèce strictement cap-verdienne, a la même indication de localité et de collecteur. Il est donc difficile de savoir à partir des informations publiées si toutes les signalisations proviennent bien du même endroit ou s'il peut y avoir eu confusion.

## Citations bibliographiques

*Acrida carinulata*

- Burr, 1902, p. 157 (clé), 163-164
- Kirby, 1910, p. 92

*Acrida maroccana*

- Dirsh, 1949c, p. 21 (clé), 27-28, 43, figs. 6, 25, 43, 53, 85102 (carte) ~ 1954, p. 122 (clé), 125, 129-130, fig. 3

*Acrida rufescens*

- Kirby, 1910, p. 94

*Acrida rufescens* (suite)

- Risbec, 1950a, p. 42 ~ 1950b, p. 317
- Stål, 1873b, p. 97

*Acrida turrita*

- Baccetti, 2004, p. 29
- Boisson, 1961, p. 29
- Chapman, 1961, p. 278 ~ 1962, p. 15, 51, fig. 42 (carte)
- Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181
- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331
- Chopard, 1941, p. 47 ~ 1958a, p. 145
- COPR, 1982, p. 375-376, fig. 81
- Cornes & Riley, 1972, p. 11
- Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182
- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
- Davey *et al.*, 1959b, p. 571
- Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987
- Delarze & Le Gall, 1989, p. 278, 280
- Descamps, 1965b, p. 1260, 1271, 1309 ~ 1968, p. 561, 564
- Descamps & Le Breton, 1973, p. 120
- Dirsh, 1949c, p. 21 (clé) ~ 1954, p. 113, 122 (clé), 125, 127-129, fig. 2, carte 2 ~ 1956c, p. 257-258, 279, pl. 51 : f. A-L, pl. 53 : f. 4 ~ 1963b, p. 215 ~ 1964, p. 67 ~ 1965, p. 400, 401, fig. 318a-g ~ 1966, p. 356-358, fig. 181 ~ 1970, p. 388-391
- Duranton & Lecoq, 1980
- Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 213 ~ 1984, p. 41

*Acrida turrita* (suite)


- Fishpool & Popov, 1984, p. 350
- Gillon, 1974a, p. 148 ~ 1974b, p. 488
- Golding, 1948, p. 529 (?)
- Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 331-332 ~ 1996b, p. 126, 128, 129, figs. 1, 3, 5, 7, 18, 21
- Johnsen, 1981a, p. 90 ~ 1981b, p. 154 ~ 1984a, p. 284, 287-288, fig. 256A, C-F (fig. B = *A. maxima*) ~ 1991a, p. 184-186, figs. 528-532, 535- 536 (les figs. 533-534 = *A. maxima*)
- Johnston, 1956, p. 659-662 ~ 1968, p. 289
- Karny, 1907, p. 374 ~ 1915, p. 126
- Karsch, 1893, p. 55
- Kirby, 1910, p. 92-93
- Lamotte & Roy, 1998, p. 107
- Launois, 1978b, p. 40, 48, 176-177, figs. 1-5, pl. D3 : f. 70, p. 40, 49, 178-179, figs. 1-5, pl. D3 : f. 81
- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 71-72, 1 fig. non numérotée, 1 carte
- Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 60 ~ 1980b, p. 564-566 ~ 1984
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 54, 62
- Mallamaire, 1948, p. 631
- Medler, 1980, p. 37
- Mestre, 1988, p. 176, 177, figs. 1-3 (= *A. turrita* mat. exam.), 5AT, 6AT, 7AT
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 ~ 2006, p. 20, 42-43, 1 carte
- Mestre *et al.*, 2001, p. 319
- Otte, 1995b, p. 245
- Oyidi, 1976, p. 84 ~ 1977 ~ 1978
- Paraíso *et al.*, 2012, p. 35-36, 51
- Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 334

*Acrida turrita* (suite)

- Popov, 1989, p. 88-89
  - Popov *et al.*, 1990, p. 98-99, pl. 18
  - Roy, 1962, p. 133 ~ 1964b, p. 1179, 1188, 1195 ~ 1964c, p. 122 ~ 1965, p. 627-628 ~ 1966, p. 36 ~ 1967, p. 1562 ~ 1969a, p. 214 ~ 1969b, p. 54 ~ 1971, p. 405-406 ~ 2003, p. 353, 381, 388
  - Sjöstedt, 1931b, p. 2
  - Zacher, 1917, p. 163, fig. 8
- Acrida turrita sicula*
- Dirsh, 1949c, p. 24 (clé), 26, 27, 29, 43, figs. 34, 80, 81, 102 (carte)
- Acrida turrita tunetana*
- Dirsh, 1949c, p. 23 (clé), 25-26, 31, figs. 5, 23, 42, 43, 52, 84, 102 (carte)
- Acrida turrita turrita*
- Dirsh, 1949c, p. 23 (clé), 24, 26, 31, figs. 2A, 4, 22, 41, 43, 51, 83, 102 (carte)
- Acrida uvarovi*
- Chopard, 1950, p. 137 ~ 1952, p. 476
  - Dirsh, 1949c, p. 21 (clé), 25, 26, 31, figs. 7, 26, 44, 54, 86, 102 (carte)
- Truxalis rufescens*
- Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 2.
- Truxalis tenuis*
- Palisot de Beauvois, 1805, p. 17, pl. 2 : f. 3.
- Tryxalis carinulata*
- Bolívar, 1889a, p. 90-91 ~ 1893a, p. 162 (clé), 164
  - Finot, 1908, p. 27 (*Truxalis*)
- Tryxalis rufescens*
- Bolívar, 1893a, p. 162 (clé), 164
  - Mallamaire, 1948, p. 631
- Tryxalis turrita*
- Krauss, 1878, p. 52

## Distribution géographique

**Bénin** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Paraíso *et al.*, 2012 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b) - **Cameroun** (Johnsen, 1981b • Zacher, 1917) - **Cap-Vert** (voir note 1) Bolívar, 1889a, 1893a • Burr, 1902 • Dirsh, 1965, 1970 • Saraiva, 1961) - **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004 • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Finot, 1908 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b • *mat. exam.*) - **"French Sudan"** (Dirsh, 1965) - **Gambie** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1967b • Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Karny, 1915 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1966) - **Liberia** (Dirsh, 1954, 1965,



*T. rufescens* femelle (gauche)  
*T. tenuis* mâle (droite)  
 d'après  
 Palisot de Beauvois (1805)

1966, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Boisson, 1961 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1954, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1950 • Dirsh, 1954 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 (?) • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Palisot de Beauvois, 1805) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Krauss, 1878 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1964c, 1965, 1967, 1969a,b) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Stål, 1873b) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Dirsh, 1954, 1965, 1966, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Togo** (Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Zacher, 1917 • *mat. exam.*) - **AO** (Bolívar, 1893a • COPR, 1982 • Dirsh, 1964 • Fishpool & Popov, 1984 • Karny, 1907 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b • Mallamaire, 1948 • Mestre, 1988 • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a)

Cette espèce est citée de toute l'Afrique sub-saharienne, du sud du Soudan et de l'Éthiopie, et de la bordure méditerranéenne des pays du Maghreb. La présence au Cap-Vert est à confirmer (voir note 1 page 42), les diverses citations n'étant que des reprises de Bolívar.

### Iconographie

**Habitus** (*juv.*: Popov *et al.*, 1990 ▫ *im.*: COPR, 1982 ♂ • Dirsh, 1965, 1966 ♂ • Johnsen, 1984a ♂, 1991a ♂ • Launois, 1978b ♂♀ • Launois-Luong & Lecoq, 1989 ♀ • Mestre, 1988 ♀ • Palisot de Beauvois, 1805, sous *Truxalis rufescens* ♀ et *T. tenuis* ♂ • Popov *et al.*, 1990 ♀ • Zacher, 1917) - **Autres morph.** (Dirsh, 1949c, sous *A. turrata* ssp., *A. maroccana* et *A. uvarovi*, 1954, sous *A. turrata* et *A. maroccana*, 1965, 1966 • Jago, 1996b • Johnsen, 1984a, 1991a • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1956c, 1965, 1966 • Jago, 1996b • Johnsen, 1984a, 1991a) - **Ooth.** (Popov *et al.*, 1990)

### Bio-écologie

## Acrida sp.

### Citations bibliographiques

*Acrida acuminata* Stål (Err. dét., espèce d'Afrique australe)  
 -- Bolívar, 1893c, p. 174 ~ 1908c, p. 93  
 -- Burr, 1902, p. 162-163  
 -- Johnsen, 1981a, p. 89  
 -- Karny, 1907, p. 373  
*Acrida spp.*  
 -- Descamps, 1953, p. 604  
 -- Fishpool & Popov, 1984, p. 350 (*A. bicolor*, *A. sulphuripennis*, *A. turrata*)  
 -- Johnston, 1956, p. 662 ~ 1968, p. 290

*Truxalis nasutus* (non *Gryllus Acrida nasutus* Linné) ; l'excellente figure fournie montre qu'il s'agit d'un *Acrida* que Kirby (1910) a rapporté à *A. turrata*)  
 -- Palisot de Beauvois, 1805, p. 16, pl. 2 : f. 1

### Distribution géographique

**Cameroun** (Bolívar, 1908c • Descamps, 1953) - **Côte d'Ivoire** (Bolívar, 1893c) - **Gambie** (Bolívar, 1893c • Burr, 1902 • Johnsen, 1981a • Karny, 1907) - **Guinée Bissau** (Bolívar, 1893c) - **Nigeria** (Palisot de Beauvois, 1805) - **AO** (Fishpool & Popov, 1984)

### Iconographie

**Habitus** (*im.*: Palisot de Beauvois, 1805 ♀, sous *Truxalis nasutus*) - **Autres morph.** () - **Anat.** ()