

Anamesacris Uvarov, 1934b, p. 467-469

Espèce-type : *Anamesacris saharae* Uvarov, 1934b, par désignation originale et monotypie

Ce genre africain englobe trois espèces désertiques circonscrites à la zone nord Mauritanie, Sahara occidental et sud marocain. Seule *A. zolotarevskyi* a jusqu'ici été signalée de l'ouest de notre zone d'étude.

Clé Descamps (1970, 3 espèces)

Anamesacris zolotarevskyi Uvarov, 1938

Anamesacris zolotarevskyi Uvarov, 1938c, p. 602-604

Holotype femelle, Mauritanie, Kedia Guengoum (Zemmour), MNHN Paris

Syn. *Anamesacris abajoi* Morales Agacino, 1949, p. 159-163, fig. 2. Holotype mâle, Sahara occidental, MNCN Madrid
[Descamps, 1970, p. 29-30, avec *A. zolotarevskyi*]

Citations bibliographiques

Anamesacris abajoi

- Dirsh, 1965, p. 185, 186, fig. 136
- Morales Agacino, 1949, p. 159-163, fig. 2
- Johnston, 1956, p. 202

Anamesacris zolotarevskyi (ou par erreur *zolotarewskyi*)

- Chopard, 1943c, p. 386 ~ 1952, p. 469
- Descamps, 1970, p. 30
- Dirsh, 1965, p. 185, 186 ~ 1975, p. 115, fig. 48
- Johnston, 1956, p. 202
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 18, 62-63, 1 carte
- Morales Agacino, 1949, p. 158
- Uvarov, 1938c, p. 602-604

Anamesacris zolotarevskyi zolotarevskyi


- Otte, 1995a, p. 70
- Anamesacris zolotarevskyi elongata*
- Otte, 1995a, p. 70
- Anamesacris zolotarevskyi var. elongata*
- Johnston, 1956, p. 202
- Anamesacris zolotarewskyi var. elongata*
- Morales Agacino, 1949, p. 158

Le statut de cette variété *elongata* décrite par Morales Agacino est à préciser. Cet auteur indique simplement qu'elle est caractérisée par " *su aspecto general más grácil, poco pesado y tegumentos menos rugosos* ". Sympatrique de l'espèce nominative, nous la traitons ici sous toutes réserves comme une simple variante morphologique de *A. zolotarevskyi*.
Otte (1995a) la liste comme une sous-espèce valide.

Distribution géographique

Mauritanie (Chopard, 1943c, 1952 • Descamps, 1970 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Uvarov, 1938c) - "**Rio de Oro**" (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Morales Agacino, 1949)

La plupart des signalisations du Rio de Oro se situent au-delà du 24ème Nord, au nord de notre zone d'étude. L'espèce est également signalée de la partie nord de l'ex Sahara espagnol et du Maroc saharien.



Anamesacris zolotarevskyi


Iconographie

Habitus (*im.*, sous *A. abajoi* : Dirsh, 1965, 1975, ♂ • Morales Agacino, 1949, ♂) - **Autres morph.** (Morales Agacino, 1949) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1975, sous *A. abajoi*)

Bio-écologie

Aucune information.

D'après Morales Agacino, cette petite espèce se rencontre sur des sols variés qu'ils soient sableux, graveleux ou pierreux.



d'après Morales Agacino, 1949
sous *Anamesacris abajoi*

2m
1949