

*Barombia* Karsch, 1891, p. 180Espèce-type : *Barombia tuberculosa* Karsch, 1891, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

Ce genre a été longtemps inclus dans les Catantopinae et transféré dans la très hétérogène famille des Hemiacridinae par Dirsh (1966). Dans le catalogue de Otte (1995a), il est encore intégré aux Catantopinae.

***Barombia tuberculosa* Karsch, 1891***Barombia tuberculosa* Karsch, 1891, p. 180-181, 1 fig. non numérotée

Syntypes mâle, femelles, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA 2007 : 3 syntypes, 1 mâle et 2 femelles, l'une d'elle indiquée mâle par erreur ; Karsch cite bien 1 mâle et 2 femelles donnant d'ailleurs une fourchette de taille du corps pour les femelles).

*Barombia tuberculosa* d'après Karsch (1891)**Syn.** *Barombia nassau* Rehn, 1958, p. 1 (clé), 3-5, figs. 3, 4. Holotype mâle, Cameroun, ANS Philadelphie (site Internet ANSP : holotype)[Dirsh, 1966, p. 101, avec *Barombia tuberculosa*]*Barombia tuberculosa* var. *sublaevis* Bolívar I., 1905b, p. 226. Type sans précision, Guinée Équatoriale, MNCN Madrid ?[Kirby, 1910, p. 386, avec *Barombia tuberculosa*, synonymie non citée par Ramme][Ramme, 1929, p. 311, avec *Barombia tuberculosa*]

Otte (1995a, p. 277) réinstiue cette sous-espèce comme valide dans son catalogue sans fournir la moindre explication. En l'attente de précisions, nous conservons ici la synonymie faite par Kirby et Ramme.

**Citations bibliographiques***Barombia nassau*

-- Dirsh, 1965, p. 307

-- Rehn, 1958, p. 1 (clé), 3-5, figs. 3, 4

*Barombia tuberculosa*

-- Bolívar I., 1908c, p. 106

-- Dirsh, 1965, p. 307, 308, fig. 234a-d

~ 1966, p. 99-100, 101, fig. 40 ~

1970, p. 81-82, fig. 23

-- Johnston, 1956, p. 266 ~ 1968, p. 223

-- Karsch, 1891, p. 180-181, 1 fig.

-- Kirby, 1910, p. 386

*Barombia tuberculosa* (suite)

-- Ramme, 1929, p. 311

-- Rehn, 1958, p. 1, 2-3, figs. 1, 2

-- Sjöstedt, 1910, p. 5

*Barombia tuberculosa sublaevis* ou var. *sublaevis*

-- Johnston, 1956, p. 266 (comme synonyme)

-- Otte, 1995a, p. 277 (comme sous-espèce valide)


-- Ramme, 1929, p. 311 (comme synonyme)

*Barombia tuberculosa tuberculosa*

-- Otte, 1995a, p. 277

**Distribution géographique****Cameroun** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Bolívar I., 1908c • Karsch, 1891 • Ramme, 1929 • Rehn, 1958 • Sjöstedt, 1910)

L'espèce est également signalée de Guinée Équatoriale, du Congo et de la R.D. du Congo (ex-Zaire).

**Iconographie****Habitus** (im. : Dirsh, 1965, ♂, 1966, ♂, 1970, ♂ • Karsch, 1891, ♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Rehn, 1958, sous *B. tuberculosa* et *B. nassau*) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1966, 1970)**Bio-écologie**

Aucune information.

L'espèce est liée au milieu forestier et, au vu de l'habitus, on peut penser à une espèce terricole de sous-bois.