

Berengueria Bolívar, 1909b, p. 296
 Espèce-type : *Berengueria rotundifrons* Bolívar, 1912b,
 par désignation subséquente d'Uvarov (1953b, p. 176)

Ce genre afrotropical, qui avait été mis en synonymie avec *Dnopherula* par Dirsh (1958a), a été réhabilité par Jago (1996a) qui y inclut trois espèces.


Cet auteur décrit par ailleurs dans cet article une espèce nouvelle, *B. cryptica*, très voisine de *B. bifoveolata*, avec qui elle coexiste fréquemment et avait été jusqu'ici confondue. La répartition respective de ces deux espèces devra donc être revue.

Clé Jago (1996a, 3 espèces).

***Berengueria bifoveolata* (Karsch, 1893)**

Pnorisa bifoveolata Karsch, 1893, p. 65

Syntypes mâles et femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin ?. Lectotype mâle désigné par Hollis (1966, p. 281) et déposé au NHM Londres. Cependant, Jago (1996, p. 74) désigne également comme lectotype le seul spécimen mâle, selon lui, de la série-type du MNHU Berlin ; Karsch indiquait pourtant dans sa description plusieurs mâles et femelles (DORSA : aucun spécimen recensé).



Berengueria bifoveolata femelle d'après Mestre (1988)

Citations bibliographiques


Berengueria bifoveolata
 -- Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 62
 -- Golding, 1948, p. 537
 -- Jago, 1996a, p. 73-75, figs. 8, 11, 13
 -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 ~ 2006, p. 22, 76-77, 1 carte
 -- Mestre *et al.*, 2001, p. 324
 -- Phipps, 1962, p. 13-21
 -- Uvarov, 1953b, p. 177
Dnopherula bifoveolata
 -- Chapman, 1962, p. 54
 -- Cornes & Riley, 1972, p. 14
 -- Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987
 -- Delarze & Le Gall, 1989, p. 279
 -- Dirsh, 1970, p. 565-566
 -- Fishpool & Popov, 1984, p. 408

Dnopherula bifoveolata (suite)
 -- Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 165-167, 169-170, 173-174 ~ 1974b, p. 513-515, 529-530 ~ 1976, p. 5-85 ~ 1983, p. 301
 -- Hollis, 1966, p. 272 (clé), 281-283
 -- Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 333-334
 -- Johnston, 1956, p. 667 ~ 1968, p. 385
 -- Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 581
 -- Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62
 -- Medler, 1980, p. 39
 -- Mestre, 1988, p. 278, 279, 289, figs. 1-4

Dnopherula bifoveolata (suite)
 -- Otte, 1995b, p. 145
 -- Oyidi, 1977 ~ 1978
 -- Phipps, 1970, p. 344
 -- Roy, 1969a, p. 220
Dnopherula sp. (= *D. bifoveolata* d'après Roy, 1969a, p. 198)
 -- Roy, 1962, p. 111, 113, 134
Phonerula bifoveolata
 -- Davey *et al.*, 1959b, p. 586
 -- Descamps, 1965b, p. 1292, 1293
 -- Dirsh, 1958a, p. 29 ~ 1964, p. 80 ~ 1965, p. 541, 542
Pnorisa bifoveolata
 -- Karsch, 1893, p. 65
 -- Kirby, 1910, p. 151

Distribution géographique

Bénin (Dirsh, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Burkina Faso** (Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Cameroun** (Dirsh, 1970) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1970 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976, 1983 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Guinée** (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Oyidi, 1977, 1978) - **R. centrafricaine** (Dirsh, 1970) - **Sénégal** (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1969a) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1962, 1970 • *mat. exam.*) - **Togo** (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Kirby, 1910 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **AO** (Jago, 1996a • Lecoq, 1978b, 1980b)



Comme indiqué plus haut, la confusion éventuelle avec *B. cryptica* rend la plupart de ces signalisations à confirmer.

L'espèce est également citée du Congo, du sud-Soudan et d'Ouganda.

Iconographie

Habitus (im.: Mestre, 1988 ♀) - **Autres morph.** (Jago, 1996a • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1996a)

Bio-écologie

Berengueria cryptica Jago, 1996

Berengueria cryptica Jago, 1996a, p. 74-75, 76, figs. 9-10.

Holotype mâle, Togo, Katchanke, NHM Londres

Étym. *cryptica*, cryptique, caché, discret


Citations bibliographiques

Berengueria cryptica

- Jago, 1996a, p. 73-76, figs. 9-10
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 ~ 2006, p. 22, 77, 1 carte
- Mestre *et al.*, 2001, p. 324

Distribution géographique

Bénin (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Cameroun** (Jago, 1996a) - **Côte d'Ivoire** (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Nigeria** (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **R. centrafricaine** (Jago, 1996a) - **Sénégal** (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006)



Togo (Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006)

La signalisation du Togo de Mestre *et al.* (2001) est en fait à rapporter au Bénin.

Iconographie

Habitus () - **Autres morph.** (Jago, 1996a) - **Anat.** (génit. ♂ : Jago, 1996a)

Bio-écologie

Aucune information.

Berengueria sp.

Citations bibliographiques

- Dnopherula* sp. nov. near *rotundifrons*
- Fishpool & Popov, 1984, p. 409-410
- Dnopherula rotundifrons* (Err. dét., espèce d'Afrique centrale)
- Medler, 1980, p. 39
 - Otte, 1995b, p. 147
 - Oyidi, 1977 ~ 1978

Distribution géographique

Bénin (Fishpool & Popov, 1984) - **Nigeria** (Medler, 1980 • Oyidi, 1977, 1978) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984)